



COLLECTION OF WILLIAM SCHAUS

0

PRESENTED
TO THE
NATIONAL MUSEUM
MCMV

			*			
		Ç 5				
	The state of the s					
			· ·			
				30		
		9.1				
		4				
					-6-	
			•		-	
	Water Control				1	
		A state	- 4			
			- 1			
				44.70		
			1.			4
		Washington and				
		*				
			~			
			1.9		*	
A W. Leading						
		-				
						2.0
		•				
	0.0					
		*				
		- 1 _{Ve}				
ENTRE DE LOS				•		

						*	
						*	
				*			
			-				
					1		
	•						
. 00							*
						13	
•							
					0		
4							
= -							
			*	•			
			A.				
						. 4	
			•				
			T.				
					•		
					*		
	5.	4.0					

atranes

DE

UITLANDSCHE KAPELLEN

WAERELD-DEELEN ASIA, AFRICA EN AMERICA,

BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN

DOOR DEN HEER

PIERCRAMER

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN, LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

II. DEEL. BESCHRYVING VAN PLAAT XCVII—CXCII.

PAPILLONS EXOTIQUES

DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLÉS ET DÉCRITS

PAR

MR. PIERRE CRAMER.

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE ET MEMBRE DE LA SOCIETE

CONCORDIA ET LIBERTATE

A AMSTELDAM.

DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVES ET ENLUMINES SOUS SA DIRECTION.

TOME SECOND. DESCRIPTION DES PLANCHES XCVII-CXCII.

A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE.

A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD.

M D C C L X X I X.

1479

199626

	•				
				-	
* 1					
		4.5			
i (2)			*		
0.0	Y				

DE

UITLANDSCHE KAPELLEN

VOORKOMENDE IN DE DRIE

WAERELD-DEELEN ASIA, AFRICA EN AMERICA,

BY EEN VERZAMELD EN BESCHREEVEN

DOOR DEN HEER

PIETERCRAMER,

DIRECTEUR VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP TE VLISSINGEN, LID VAN HET GENOOTSCHAP

CONCORDIA ET LIBERTATE

TE AMSTELDAM.

ONDER DESZELFS OPZIGT ALLEN NAAR HET LEVEN GETEKEND, IN HET KOPER GEBRAGT EN MET NATUURLYKE KOLEUREN AFGETEKEND.

II. DEEL. DE PLAATEN XCVII—CXCII.

PAPILLONS EXOTIQUES

DES TROIS PARTIES DU MONDE

L'ASIE, L'AFRIQUE ET L'AMERIQUE.

RASSEMBLES ET DÉCRITS

PAR

MR PIERRE CRAMER

DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ ZELANDOISE DES SCIENCES A VLISSINGUE ET MEMBRE DE LA SOCIETE

CONCORDIA ET LIBERTATE

A AMSTELDAM.

DESSINES SUR LES ORIGINAUX, GRAVÉS ET ENLUMINÉS SOUS SA DIRECTION.

TOME SECOND. LES PLANCHES XCVII CXCII.


A AMSTELDAM, CHEZ S. J. BAALDE.

A UTRECHT, CHEZ BARTHELEMY WILD.

MDCCLXXIX.

[1777]





VAN

DE

PAPILLONS UITLANDSCHE KAPELLEN. EXOTIQUES.

PLAAT XCVII.

PLANCHE XCVII.

Fig. A. B. Conspicillator. Deze zeldzame Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. De pooten-zyn dik en elk met een donker de zonderlinge tekening, welke op't midden van ieder bovenvleugel een zeer natuurlyke aftekening van een Bril vertoont, heeft men ze den byngam van Brildrager of Gebrilde gegeven.

In het Kabinet van zyne Doorlug-TIGE HOOGHEID, DEN HEERE PRINCE VAN Orange bevinden zig twee van deze Nagt-Kapellen, welker bovenvleugels in kleur met onze afbeelding verschillen, als zynde die donker-loodkleurig, doch voor 't overige in alles volmaakt overeenkomstig met deze uit myne Verzameling: misschien is het gemelde onderscheid der kleur aan de Manuetjes eigen, want onze afgebeelde is een Wyfje. Zy woonen op Amboina.

Houttuin. Nat. Hist. 1 D. XI. St. pag. 644. Pl. 92. Fig. 8. II. DEEL.

Fig. A. B. Conspicillator. re Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Les pattes sont épaisses & garnies d'une épine de couleur geelkleurigen doorn gewapend. Wegens jeaune obscure. On lui a donné le nom de Porte-Lunettes, à cause du rare dessein qui représente sur le milieu de chaque aîle supérieure une forme très naturelle de Lunettes.

> Dans le Cabinet de son Altesse Se-RENISSIME, MONSEIGNEUR LEPRINCE D'O-RANGE se trouvent deux de ces Phalênes, dont les aîles supérieures different pour la couleur de notre Figure, celles-là étant d'un mine de plomb obscur, mais pour le reste en tout parfaitement conformes à celle de ma Collection. Cette disférence de couleur se trouve peut-être uniquement dans les Mâles, car notre Figure est une Femelle. Elles se trouvent à Amboine.

> Houttuin, Nat. Hist. 1 Deel XI. St. pag. 644. Pl. 92. Fig. 8.

Fig. C. Lelex. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig; de zuiger is gekruld, en de pooten, naar maate van het lyf, zeer lang. Van onder hebben de vleugels de zelfde kleur en tekening als van boven, te weten bleekgeel, glanzig en eenigzints doorschynend. Men vindtze met de drie naaftvolgende foorten in Surinamen.

Fig. D. Tages. De witte vlakken op de vleugels van dit zwarte Nagt-Kapelletje zyn helder doorschynend; het heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugels evencens als van boven.

Fig. E. Ufeus. Het schynt my toe, die van de evengemelde Figuur. Surinamen in stilstaande wateren wassen; misschien op een soort der Plompen *, water Planten aan verscheide soorten van Rupfen tot voedzel verstrekken.

* Nymphea. † Lemna. | Potamogeton.

Fig. C. Lelex. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes; la trompe est roulée & les pattes sont, à proportion du corps, fort longues. En-dessous les aîles ont la même couleur & le même dessein qu'au-dessus, savoir un jaune pâle, luisant & tant soit peu transparent. On la trouve avec les trois especes suivantes à Suriname.

Fig. D. Tages. Les taches blanches sur les aîles de cette Phalêne noire sont fort transparentes. Elle a des antennes. filiformes & une trompe roulée. dessous les aîles sont les mêmes qu'audessus.

Fig. E. Useus. Il me semble que cette dat dit Nagt-Kapelletje een verschillende petite Phalêne est une espece variée de la foort van Fig. D. is. Om dat de witte Figure D. parce que les taches blanches doorschynende vlakken op 't midden der transparentes sur le milieu des aîles sont vleugels meer bandswyze, en bovendien plus en forme de bandes & que d'ailleurs nog twee witte met zwart geringde stip- il se trouve encore deux petits points jes op de bovenvleugels geplaatst zyn. blancs, bordés de noir, sur les aîles su-Ook is de grondkleur meer donkerbruin périeures. Le fond est pareillement plus dan zwart, en de pooten langer, dan in brun-obscur que noir, & les pattes sont Men plus longues que celles de la ditte Figure. heeft my berigt dat de Rupsen van deze On m'a informé que les chenilles de ces Uiltjes huishouden op Planten, welken te Phalênes se nourissent de Plantes, qui croissent à Suriname dans des lacs, peutêtre sur une espece des Nymphæa, Lem-Kroos †, Fontein-Kruid | enz. Welke na, ou Potamogeton enz. plantes aquatiques qui servent de nourriture à plusieurs sortes de chenilles.



Fig. F. Suëro. In tekening zyn de vleugels van onder in dit Nagt-Kapelletje niet onderscheiden, maar de grondkleur is minder donkerbruin, dan het agterste gedeelte der vleugels van boven. sprieten heeft het draadvormig, en den formes & sa trompe est roulée. zuiger gekruld.

PLAAT XCVIII.

Fig. A. Maja. Deze Nagt-Kapel ger is niet zigtbaar; het witte halvemaanswyze vlakje op de bovenvleugels is eenigzints doorschynend. Van onder zyn de vleugels eveneens getekend, maar een weinig meer graauw dan van boven, en zelve doorschynend gelyken.

De Heer Drury heeft het Wyfje doen afbeelden, en zegt in de Beschryving van het zelve, dat ze in Nieuzv-York worden gevonden: deze is getekend naar een Mannetje, 't welk berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen in Virginien gevangen.

Drury Tom. II. Tab. 24. Fig. 3. Maja. Fig. B. C. Halefus. De Blaauwe

Fig. F. Suëro. En-dessous les aîles de cette petite Phalêne ne different point dans le dessein, mais le fond est d'un brun plus obscur, que la partie postérieure des De aîles au-dessus. Ses antennes sont fili-

PLANCHE XCVIII.

Fig. A. Maja. Les antennes de cette heeft de sprieten sterk gepluimd, de zui- Phalêne sont fort plumacées & la trompe n'est pas visible; la petite tache blanche en forme de demi-Lune sur les aîles supérieures, est tant soit peu transparente. Les aîles ont au-dessous le même dessein, mais elles sont un peu plus minide dunte der wieken veroorzaakt dat de- mes qu'au-dessus, & la minceur des ailes fait qu'elles paroissent transparentes.

Monsieur Drury a fait dessiner la Femelle, & dans la description qu'il en donne il dit qu'on les trouve à la Nouvelle-York. Celle-ci représente un Mâle du Cabinet du très noble Monsieur J. C. Sylvius van Lennep, & qui a été pris avec tous les autres Papillons de cette Planche, en Virginie.

Drury, Tom. II. Tab. 24. Fig. 3. Maja. Fig. B. C. Halesus. La couleur bleue kleur op de bovenvleugels van dit fraaye des aîles supérieures de cette belle clopor-Schildrupspagetje, heeft den glans als te ou Tortue, a un éclat de Satin. Il y Satyn. By de agterste tippen der onder- a vers les points postérieurs des aîles des-

vleugels zyn vier goudglanzige vlakjes, met welke de onderzyde derzelven op de gemelde plaats in een dubbelde rye, en twee diergelyke kleine naby de gewrigten insgelyks gesierd is.

Fig. D. E. Diana. Deze ongeöogde Nimph-Kapel heeft op ieder vleugel
by Fig. E. twee Paarlemoeragtige vlakken, en veertien halvemaans wyze vlakken van gemelden luifter, verfieren de
onderranden der agtervleugels. De voorfte pooten zyn kort en zonder Nagels,
even gelyk alle my bekende Kapellen,
welke met Paarlemoeragtige vlakken op
de vleugels praalen.

Fig. F. G. Marcellus. Deze Pagie-Kapel behoort onder de Grieksche Ridders (Pap. Eq. Achiv.) Zy berust met de veorgaanden in het laatstgenoemde uitmuntende Kabinet.

PLAAT XCIX.

Fig. A. Sypilus. De sprieten van deze Bastert-onrust zyn draadvormig. Op het agterste gedeelte van het lyf zyn vier ryen van blaauwe blinkende stippen geplaatst. Van onder zyn de vleugels niet onderscheiden met de bovenzyde derzelve. De Wel Eerw. Heer E. F. Alberti heeft my deze met de naastvolgende Figuur ter aftekening geleend, en zy waren beiden in Surinamen gevangen.

dessous, quatre petites taches dorées, dont la surface inférieure de ces aîles sur la ditte place est ornée, dans une double raye, tandis qu'on apperçoit encore deux petites taches semblables vers les jointures.

Fig. D. E. Diana. Cette Nymphe aveugle a fur chaque aîle de la Figure E. deux taches de nacre de perle, & quatorze taches en forme de demi-lunes du même lustre, ornent les bords inférieurs des aîles postérieures. Les pieds de devant sont courts & sans onglets, comme tous les Papillons qui me sont connus, qui ont des taches de gris de perle sur les asles.

Fig. F. G. Marcellus. Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs (Pap. Eq. Achivi). On le trouve avec les précédens dans le riche Cabinet dont nous venons de parler.

PLANCHE XCIX.

Fig. A. Sypilus. Les antennes de ce Sphinx-bélier sont filisormes. Il y a sur la partie postérieure de l'abdomen quatres rayes de points bleus luisants. Le dessous des asles ne differe en rien de la surface supérieure. Monsieur le Ministre E. F. Alberti, m'a prêté cette Figure avec la suivante pour les saire dessiner, & on les a prises tous les deux à Surinamen.



,			
		- 1	
			,
	N.		

Fig. B. Scyton. Deze Bastert - Onrust heeft draadvormige sprieten. ondervleugels zyn op't midden doorschynend. Van onder zyn de wieken eveneens als van boven.

Fig. C. D. Elathea. Dit klein Dag-Kapelletje behoort onder de witte Danaüssen. (Pap. Dan. Candidi.) Men vindtze in Zuid en Noord-Amerika. Ik heb deze uit de Virginien ontvangen.

Rösel, Insect. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 4. Fig. E. F. Cipris. Deze Oranjekleurige Dag-Kapel heeft van onder op ieder met zwart gerand zyn. Heer Linnæus. Men vindtze in Suri- les trouve à Suriname. namen.

Fig. G. H. Cymodoce De bovenzyde der vleugelen van deze ongemeene supérieure des aîles de ce beau Papillon Dag-Kapel praalt met een blaauwen en brille d'un reflet bleu & pourpré. Pour purperkleurigen weerschyn. Wegens de gedaante der vleugels komt zy overeen met de Actorion *, en dewyl de randen der wieken ongekarteld zyn, zou ze volgens de verdeeling van den Ridder Linnœus onder de bonte Danaüs-Kapellen (Pap. Dan. Festivi) behooren. heeft of gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Zy berust in 't Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en was uit de Oostindiën aangebragt.

* Zie Pl. XLIX. Fig. C. D.

Fig. B. Scyton. Ce Sphinx bélier a des antennes filiformes. Les aîles inférieures sont transparentes à la partie intermédiaire. En-dessous les aîles sont comme au-dessus.

Fig. C. D. Elathea. Ce petit Papillon appartient aux Danaides blanches (Pap. Dan. Candidi.) On les trouve dans l'Amérique septentrionale & méridionale. J'ai reçu celui-ci de la Virginie.

Röfel, Infect. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 4. Fig. E. F. Cipris. Ce Papillon couleur d'Orange a sur chaque aile au-desvleugel twee zilveragtige vlakjes, welken fous deux petites taches argentées, qui Zy behoort on- font bordées de noir. Il appartient aux der de Pap. Dan. Candidi. van den Pap. Dan. Candidi de Mr. Linnæus. On

> Fig. G. H. Cymodocé. La partie la forme des aîles il ressemble entierement à l'Actorion * & puisque les bords sont dentelés, il appartiendroit, d'après la division de Monsieur le Chevalier Linnæus, aux Danaides-bigarrées (Pap. Dan. Festivi) Il n'a ou n'employe que quatres pattes ambulantes. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers, qui l'a reçu des Indes Orientales.

^{*} Voyez la Planche XLIX. Fig. C.D. A_3

PLAAT C.

Fig. A. B. Somniculofa. De sprieten van deze Nagt Kapel zyn met zeer syne en byna onzigtbaare hairtjes bezet: De afbeelding is naar een Wysje, waarschynlyk hebben de Mannetjes de sprieten meer gepluimd. De zuiger is op het bloote oog niet blykbaar. De kop is klein (in evenredigheid der groote van het lys) en zodanig onderwaarts naar de Borst gebogen, dat men op het eerste gezigt denzelven niet gewaar wordt. Zy behoort onder de Zydespinsters (Phal. Bombyces) en is my uit Surinamen toegezonden.

Fig. C. Corytus. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze Dikkop-Kapel, (Pap. Pleb. Urb.) is met bruine glanzige hairtjes bedekt: de overige zwarte grondkleur heeft een donker paarfehen weerfehyn, en de witte vlakken zyn glasagtig doorfehynend. Van onder ziet men alle de gemelde kleuren. Men vindtze in Surinamen, en deeze is my ter afbeelding door den Eerw. Heer E. F. Alberti geleend.

Fig. D. Arinas. Deze wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapel heeft op den zwarten grond van 't lyf en der vleugelen een donkerblaauwen weerfchyn. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels heeft een zilveragtigen glans, en is eenigzints doorfchynend. Zy be-

PLANCHE C.

Fig. A. B. Somniculosa. Les antennes de cette Phaléne sont garnies de poils très minces & presque imperceptibles. La Figure représente une Femelle; les Mâles ont peut-être les antennes plus plumacées. On ne sauroit appercevoir la trompe à l'œil. La tête est petite, à proportion de la grandeur du corps, & tellement inclinée vers la poitrine, qu'à la premiere vue on ne l'apperçoit pas. Elle appartient aux Fileuses (Phal. Bombyces) & m'a été envoyée de Suriname.


Fig. C. Corytus. Le corps avec une partie des aîles, vers les jointures, de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urb.) est couvert d'un poil brun luisant. Le reste du fond noir est d'un chatoyant de pourpre foncé. Au-dessous se présentent toutes les mêmes couleurs. On les trouve à Suriname, & celui-ci m'a été prêté par Mr. le Ministre E. F. Alberti, pour le saire desjiner.

Fig. D. Arinas. Ce Plebeien noble, dont les deux surfaces sont de la même couleur, a un chatoyant bleu-soncé sur le fond noir du corps & des aîles. La tache transversale blanche, en sorme de bande, sur les aîles de-dessus, est d'un lustre argenté & tant soit peu transparen-



,		
,		
	•	

,	



rust in de laastgemelde Verzameling, en is uit Surinamen.

Fig. E. F. Ulrica. Dit vierpootig Gras-Kapelletje heeft op het lyf en de vleugels, van boven, een blaauwen weerfchyn, welke naar de randen der wieken ligter van kleur wordt: wanneer men de Kapel met den kop naar het licht gekeerd houdt, dan verandert het blaauw in bruinagtig paarsch. Zy valt in Surinamen, en berust in de voorgemelde Verzameling.

PLAAT CI.

Fig. A. B. Cocyta. Dit Dag-Kapelletje gelykt, van boven, cenigzints naar de Liriope, welke op de Eerste Plaat by Fig. C. D. is afgebeeld: maar van onder is zy van de laatstgemelde zeer onderscheiden. Mogelyk is de volgende het Wyfje.

Fig. C. Cocyta. Van boven is dit Kapelletje ten eenemaal gelyk aan Fig. A. Zy behooren onder de vierpootigen, worden in Surinamen gevonden, en berusten in de Verzameling van den Heer M. Houttuin, Med. Doctor.

Fig. D. E. Dolon. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige fprieten en een gekrulden zuiger. Van boven heerscht over de vleugels een bleeke paarsche weerschyn. Deze afbeelding is naar een Wyste. On le trouve dans la Collection susmentionnée & vient de Suriname.

Fig. E. F. Ulrica. On voit fur le corps & fur le dessus des aslès de cette Nymphe à quatre pieds, un Chatoyant bleu, qui devient plus clair vers les bords des aslès, mais lorsque l'on incline le Papillon avec la tête vers la lumiere, le bleu se change en pourpre brunâtre. On la trouve à Suriname, & elle appartient à la Collection précédente.

PLANCHE CI.

Fig. A. B. Cocyta. Ce petit Papillon ressemble en-dessus en quelque sorte à la Liriope, qui est représentée sur la Planche premiere, Fig. C. D; mais au-dessous il en dissere beaucoup. Le suivant en sera peut-être la Femelle.

Fig. C. Cocyta. Au-dessus ce petit Papillon ressemble entierement à la Figure A. Ils appartiennent aux tétrapedes, se trouvent à Suriname, & sont de la Collection de Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine.

Fig. D. E. Dolon. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessus les aîles brillent d'un chatoyant violet pale. Cette Figure repréfente une Femelle & la suivante un Mâle.

je, en de volgende naar een Mannetje gemaakt.

Fig. F. Dolon. Op de bovenzyde der wieken is dezelfde paarsche weerschyn, dien wy by het Wyfje hebben aangemerkt, en van onder is er geen onderscheid in kleur noch tekening met Fig. E. Zy behoren onder de Phal. Notuæ, worden in Surinamen gevonden, en berusten in de laatstgenoemde Verzameling.

Fig. G. Penelëa. Van boven is deze geöogde Nimph-Kapel effen bruin van kleur, met twee donkerbruine of byna zwarte ronde vlakjes aan de tippen van ieder voorste wiek. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te lopen. Zy is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

PLAAT CII.

Fig. A. Tedea. De zeldzame gedaante der ondervleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde vierpootig Kapelletje, brengt het zelve onder het gezin dier foorten, van welke wy reeds eenige afbeeldingen hebben gegeven *. Men vindtze in Surinamen. Deze is nevens de overigen op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

* Zie Pl. XLVIII. Fig. C. en Pl. LXIII. Fig. C.


Fig. F. Dolon. On voit ici le même chatoyant violet pâle sur le dessus des alles, que nous avons indiqué dans la Femelle, & en-dessous il n'y a aucune différence dans la couleur ni dans le dessein avec la Figure E. Elles appartiennent aux Phal. Noctuæ, se trouvent à Suriname & sont de la Collection susmentionnée.

Fig. G. Penelëa. La couleur du-desfus de cette Nymphe à yeux est d'un brun simple, avec deux petites taches d'un brun obscur ou presque noires aux pointes de chaque aîle antérieure. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

PLANCHE CII.

Fig. A. Tedea. La rare forme des aîles inférieures de ce petit Papillon tétrapede, dont les deux furfaces ont la même couleur, le range dans la Famille de ces Especes dont nous avons déjà donnés quelques Figures *. On les trouve à Suriname, & celui-ci est dessiné, comme tous les autres Papillons de cette Planche d'après les Originaux du Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

* Voyez les Planches XLVIII. Fig. C. & LXIII. Fig. C.



-	•

	,




Fig. B. Gyges. De sprieten van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Nagt-Kapel, zyn ongemeen lang, en met korte hairtjes bezet. De witte vlakken hebben een zilveragtigen glans. Wegens de gedaante der pooten en het lyf, zou men mogen besluiten dat dezelve uit een Spanrups voortkomt. Zy wordt in Surinamen gevonden.

Fig. C. D. Bisaltide. Deze Dag-Kapel heeft, wat de gedaante der vleugels betreft, veele overeenkomst met de Cymodocé †. Het is een vierpootige Kapel, welke in Surinamen wordt gevonden. † Zie Plaat XCIX. Fig. G. H.

Fig. E. F. Epione. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De tekening der bovenvleugels gelykt naar die der zogenaamde Weeskinders van welke er een op de XXXIII.ste Plaat by Fig. B. is afgebeeld. Zy worden in Noord-Amerika, te Nieuw-York, en in de Virginien gevonden.

Drury, Tom. I. Tab. 23. Fig. 2. Epione. Drury Tom. I. Tab. 23. Fig. 2. Epione.

PLAAT CIII.

Fig. A. B. Paris. Deze ongemeen schoone Pagie, welke door den Heer Linnæus onder de zogenaamde Trojaansche II. DEEL.

Fig. B. Gyges. Les Antennes de cette Phalêne, dont les deux surfaces des aîles ont la même couleur, sont extraordinairement longues & garnies d'un poil menu. Les taches blanches ont un lustre argenté. On pourroit conclure de la forme des pattes & du corps qu'elle naît d'une Chenille Arpenteuse. On la trouve à Suriname.

Fig. C. D. Bisaltide. Ce Papillon, quant à la forme des aîles, ressemble beaucoup à celui que nous avons nommés Cymodocé †. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve à Suriname.

† Voyez la Planche XCIX. Fig. G. H.

Fig. E. F. Epione. Les antennes de cette Phalène sont filiformes & la trompe est roulée. Le dessein des aîles supérieures ressemble à celui des Lichenées, dont nous avons donné une Figure sur la Planche XXXIII. Fig. B. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle York & en Virginie.

PLANCHE CIII.

Fig. A. B. Paris. Le fond noir des aîles de ce Page, d'une rare beauté, que Mr. Linnæus a rangé parmi les ChevaRidder-Kapellen geplaatst is, heeft den zwarten grond der vleugels, van boven, met een ontelbaare menigte van groene goudglanzige ziertjes als bedekt. De hemelfchblaauwe vlak op de ondervleugels verandert, naar maate dat het Licht op de zelve valt, in helder groen met een blaauwen weerschyn. Zy worden in China gevonden.

Linn. Syft. Nat. pag. 745. n. 3. Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C. 3. Fig. 1. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 1. Drury, Tom. I. Tab. 12. Fig.

Fig. C. Bianor. Deze Pagie-Kapel is in de Kabinetten der Liefhebbers van Infecten veel zeldzaamer, dan de voorgaande. De grondkleur der wieken van boven is donkerbruin met groenglanzige ziertjes op dezelven verspreid. Van onder zyn de vleugels in kleur noch tekening niet onderscheiden van Fig. B. Deze afbeelding is gemaakt naar een, welke berust in de Verzameling van den Eerw. Heer E. F. Alberti. En myn Neef, de Heer Anthoni van Rensselaar, Willemsz. bezit mede een van deze fraaye Kapellen, welke dezelve, gelyk dezen, onder meer andere Insecten uit China heeft ontvangen.

Fig. D. E. Puera. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige sprieten en een Antennes filisormes & dont la trompe

liers Troyens, est couvert en-dessus d'une multitude infinie d'Atomes verts, & d'un lustre doré. La tache bleue-celeste sur les aîles inférieures change, selon la position du Papillon contre la lumiere, en verd clair avec un chatoyant bleu. On les trouve en Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 745. n. 3. Pap. Eq. Trojan. Knorr, Del. Nat. Tab. C. 3. Fig. 1. Clerck, icon. Tab. 13. Fig 1. Drury, Tom. I. Tab. 12. Fig. 1. 2.

Fig. C. Bianor. Ce Page se trouve bien plus rarement dans les Cabinets des Amateurs d'Insectes, que le précédent. Le fond des aîles en-dessus est d'un brunobscur, avec des Atomes verts-luisants, qui y sont parsemés. En-dessous les ailes ne different en couleur ni en dessein de la Figure B. La Figure que nous donnons ici est faite d'après l'original qui se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti; & mon Neveu, Mr. Anthony van Rensselaar Willemsz., possede pareillement un de ces beaux Papillons, qui l'a reçu, parmi plusieurs autres Insectes, de la Chine.

Fig. D. E. Puera. Cette Phalêne às

	·	
 ·		•
	•	







gekrulden zuiger, behoort onder de *Phal.* Noctuæ. Het is uit Surinamen, en berust in de Verzameling van den Hr. L. Juliaans.

Fig. F. Hemes. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens gekleurde Dikkop-Kapelletje, zyn doorschynend. Het is uit Surinamen, en my ter afbeelding geleend uit de Verzameling van den Wel Ed. Gestr. Heer Van de Velde.

Fig. G. Admirabilis. De sprieten van dit fraaye Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, de zuiger is gekruld, en het grootste gedeelte van het lyf is bedekt met rozenroodkleurige hairtjes. Van onder zyn de vleugels van dezelfde kleur en tekening als van boven. Het is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heer H. Schultz, Med. Doctor te Utrecht.

PLAAT CIV.

Fig. A. Crantor. Deze Pylstaart is van onder op de vleugelen in tekening niet onderscheiden, maar de kleuren zyn min levendig dan op de bovenzyde derzelven. De zuiger is lang. Het is een Oostindische en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

est roulée, appartient aux Phal. Noctuæ. Elle est de Suriname, & se trouve dans la Collection de Mr. L. Juliaans.

Fig. F. Hemes. Les taches blanches des aîles supérieures de ce petit Plebeien noble, dont les deux surfaces ont la même couleur, sont transparentes. Il est de Suriname & m'a été prêté par Mr. Van de Velde.

Fig. G. Admirabilis. Les antennes de cette belle petite Phalêne sont filisormes & la trompe est roulée. La plus grande partie du corps est couverte d'un poil couleur de roses. Au-dessous les aîles ont la même couleur & le même dessein qu'au-dessus. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. H. Schultz, Docteur en Médecine à Utrecht.

PLANCHE CIV.

Fig. A. Crantor. Le dessein du-dessous des aîles de ce Sphinx ne differe point, mais les couleurs n'y sont pas si vives que sur leur surface supérieure. La trompe est longue. Il est des Indes Orientales & se trouve dans le Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

12

F. B. Erotus. De zuiger van dezen Pylstaart is zeer lang. De vleugels hebben van onder dezelfde kleuren als de boven zyde. De Heer B. Vriends, welke my denzelven ter aftekening geleend heeft, weet niet zeker uit welk gedeelte der waereld deze Pylstaart afkomstig is.

Fig. C. Chlorea. De twee voorste pooten van deze Nagt-Kapel zyn ongemeen ruig; de sprieten heeftze draadvormig, en den zuiger gekruld. Van onder is de geheele oppervlakte der vleugelen aschgraauw, of wel van dezelfde kleur als de drie afgebrooken dwarsvlekken op de ondervleugels van boven. Men vindtze in Surinamen.

Fig. D. Fasciata. De sprieten van deze Spanrups Kapel (Phal. Geometra) zyn draadvormig. In gedaante heeft zy veele overeenkomst met het zogenaamde Vlieruiltje (Phal. Geomet. Sambucaria) maar de grondkleur der vleugels, en de bandswyze streepen over dezelven, doen ze genoegzaam van de laastgenoemde onderscheiden. Van onder is zy effen wit van kleur. Zy wordt te Batatekend uit het Kabinet van den Hoog Excellence Mr. le Baron Rengers. Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. Bitias. Van boven zyn de vleugels van dit Schildrups-Pagetje don-

Fig. B. Erotus. La trompe de ce Sphinx est fort longue. Les aîles ont au-dessous les mêmes couleurs qu'au dessus. Mr. B. Vriends qui me l'a prêté ne sauroit dire précisément de quel pais du monde il est venu.

Fig. C. Chlorea. Les deux pattes de devant de cette Phalêne sont extraordinairement velues; ses Antennes sont filiformes & sa trompe est roulée. En-dessous la surface entiere des aîles est d'un gris de cendre ou bien de la même couleur que celle des trois taches transversales decoupées sur le dessus des aîles inférieures. On la trouve à Suriname.

Fig. D. Fasciata. Les Antennes de cette Arpenteuse (Phal. Geometra) sont filiformes. Pour la forme elle a beaucoup de ressemblance avec la souffrée à queue (Phal. Geomet. Sambucaria) mais le fond des aîles & les rayes en forme de bandes qui s'y trouvent, la font assez differer de celle-là. La couleur au-desfous est d'un blanc simple. On la trouve à Batavia, & on l'a dessinée avec la Fivia gevonden, en is nevens Fig. C. ge- gure C., d'après celles du Cabinet de son

Fig. E. Bitias. Au-dessus les aîles de cette petite tortue sont d'un bleu luisant kerblaauw glanzig, de randen zwart, en obscur, les bords sont noirs, & il y a

,				
		•	\$.	
	•			



op het midden der voorsten is een zwart eeltagtig vlakje. Het komt uit Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heer W. van der Vlugt te Haarlem.

Fig. F. Amesis. Dit Argus-Kapelletje heeft van onder op de vleugels dezelfde tekening van bruingeele streepen en vlakken, maar de donkerbruine tekening is daar meer aschkleurig. Men vindtze in Surinamen, en is asgebeeld naar een uit de Verzameling van den Heer B. Vriends.

PLAAT CV.

Fig. A. B. Cassie. Volgens Justrouw Merian, aast de Rups van deze Dag-Kapel op de Cassia-Boomen in de Westindiën. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Mannetje is op de volgende Plaat by Fig. A. afgebeeld. Ik heb deze uit Surinamen ontvangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 110. Pap. Dan. Festivi. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 3. 4. Merian sur. ins. Tab. 32.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Dag-Kapel behoort onder de witte Danaüffen. Zy komt uit China.

Fig. F. Lycimnia. Aan de Mannetjes van deze Dag-Kapellen, ontbreekt van boven op de voorste vleugels die zwarte vlak, welke de Wyfjes aan beide fur le milieu des aîles antérieures une petite tache cornée. Elle vient de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. W. Van der Vlugt à Haarlem.

Fig. F. Amesis. Ce petit Argus a sur le dessous des aîles le même dessein de taches & de rayes d'un brun jeaune, mais le dessein brun-obscur y tire plus sur le gris de cendre. On le trouve à Suriname & on l'a dessiné d'après celui de la Collection de Mr. B. Vriends.

PLANCHE CV.

Fig. A. B. Cassiæ. Selon Madlle. Merian la chenille de ce Papillon cherche sa nourriture sur les arbres de Cassia dans les Indes Occidentales. Il n'a que quatre pattes ambulantes. Nous représentons le Mâle sur la Planche suivante, Fig. A. J'ai reçu celui-ci de Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 767. n. 110. Pap. Dan. Festivi. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 3.4. Merian. sur. inf. Tab. 32.

Fig. C. D. Ænippa. Ce Papillon appartient aux Danaïdes blanches. Il vient de la Chine.

Fig. E. F. Lycimnia. Les Mâles de ce Papillon n'ont point fur le desfus des aîles antérieures cette tache noire, que les Femelles ont sur les deux surfaces des dit-

zyden der gemelde vleugels naby den buitenrand hebben. Ook missen de eerstgemelden meestal de geele ronde vlakjes aan de onderranden der agtervleugels. Zy behooren onder de ligtkleurige of witte Danaüs-Kapellen. Men vindtze in Surinamen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. Tab. 7. Fig. 9. 10. en Tab. 27. Fig. 17. 18.

PLAAT CVI.

Fig. A. Cassia. Van onder is deze Kapel niet onderscheiden in kleur noch tekening der vleugels van het Wysje, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld. Ik geloof ook niet dat de donker-oranje kleurige dwarsband op de bovenvleugels alleen maar aan de Mannetjes eigen is, want ik heb van beide Sexe gevonden, welke den gemelden band even gelyk deze naar de buiten randen der voorste wieken als uit een gespleeten hebben. Dit Mannetje is getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Strigilis. Het lyf van dezen Pylftaart is van onder eveneens gekleurd als van boven: en de vleugelen hebben daar dezelfde tekening, maar de grondkleur is ten eenemaal gelyk aan die der


tes aîles, vers le bord extérieur. Les premiers ont pareillement pour la plus grande partie le défaut des petites taches rondes & jeaunes, aux bords inférieurs des aîles postérieures. Ils appartiennent aux Danaïdes blanches. On les trouve à Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 13. 14. Tab. 7. Fig. 9. 10. & Tab. 27. Fig. 17. 18.

PLANCHE CVI.

Fig. A. Cassiw. La couleur ni le desfein des aîles au-dessous, de ce Papillon, ne disferent en rien de la Femelle, que nous venons de représenter sur la Planche précédente, Fig. A. B. Je ne crois pas non plus que la bande transversale d'un orange obscur se trouve uniquement sur les Mâles, car j'en ai trouvé des deux Sexes, qui ont la même bande, comme celui-ci, vers les bords extérieurs des aîles antérieures, dans une forme sourchue. La Figure de ce Mâle représente celui du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Strigilis. La couleur du dessous du Corps de ce Sphinx est la même que celle du dessus, & les aîles y ont le même dessein, mais le fond ressemble entierement à celui des aîles inférieures, au-



	,

Э			
		, ·	
	•		



ondervleugels op de bovenzyde. Men vindtze op de Eilanden Curacao en Jamaika. De afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Heer M. Houttuin, Med. Doct.

Linn. Mantissa alt. pag. 538. Drury, Tom. I. Tab. 28. Fig. 4.

Fig. C. D. Ægistus. Van deze zwarte met groen gevlakte Pagie-Kapellen, vindt men fommigen, welke de ondervleugels weinig of byna ongestaart hebben: 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyst, want ik heb het zelve aan beiden, naamlyk Mannetjes en Wyfjes waargenomen. Zy komen uit China.

Linn. Syst. Nat. pag. 754. n. 48. Pap. Eq. Achiv. Ægistus?

Fig. E. F. Procris. Deze fraaye Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder Nagels, zy behoort onder de ongeoogde Nimph-Kapellen, en wordt in phes aveugles & se trouve en Chine. China gevonden.

Edwards. av. Tab. 299.

PLAAT CVII.

Fig. A. Rivulofa. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. Van onder hebben de vleugels op een aschkleurigen grond, een bruinen golfswyzen dwarsstreep, en aan dessus. On le trouve aux Isles de Curacao & de Jamaique. Il est dessiné d'après l'original du Cabinet de Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine.

Linn. Mantissa alt. pag. 538. Drury, Tom. I. pag. 28. Fig. 4.

Fig. C.D. Ægistus. On trouve quelques especes de ces Pages noirs, tachetés de verd, dont les aîles inférieures sont peu ou point du tout à queues, ce qui n'indique pourtant pas une marque distinctive du Sexe, car je l'ai remarqué dans les Mâles aussibien que dans les Femelles. Ils sont de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 754. n. 48. Pap. Eq. Achiv. Ægistus?

Fig. E. F. Procris. Les pattes antérieures de ce beau Papillon sont courtes & sans onglets. Il appartient aux Nym-

Edwards. av. Tab. 299.

PLANCHE CVII.

Les antennes de la la Fig. A. Rivulofa. cette Phalêne sont plumacées; la trompe est imperceptible. Au-dessous les aîles ont sur un fond gris de cendre, une raye transversale brune & ondée, & une tavindtze in Surinamen.

Drury, Tom. II. Tab. 14. Fig. 5. het Wyfje.

Fig. B: Speciofa. Deze ongemeene Nagt-Kapel heeft de sprieten met korte hairtjes bezet. De zuiger is op het bloote oog onzigtbaar. Van onder zyn de vleugels bleek paarsch-roozen kleurig, en op het midden der voorsten ziet men het zelfde zwarte met wit gevulde teken, 't welk eenigzints naar de Letter Y gelykt. ·Zy behoort onder de zogenaamde Atlas-Uilen (Phal. Attaci) is uit Surinamen, en beruft in het Kabinet van den Heer B. Vriends.

Fig. C. Hylæus. Deze Pylstaart is met een opgerolden zuiger voorzien. Van onder is de Borst en het agterlyf wit, de pooten en de vleugels zyn bruin, ieder met twee bleeke golfswyze streepen voorzien, welken van de eene tip naar de andere uitloopen. Men vindtze in Nieuw-York. Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Drury, Tom. II. Tab. 26. Fig. 3. Hylæus.

Fig. D. Nessus. Deze Onrust-Pylstaart met gehakkelde wieken, heeft een lan-

de gewrigten een donkere vlak. Men che obscure vers leurs bases. On la trouve à Suriname.

> Drury, Tom. II. Tab. 14. Fig. 5. La Femelle.

> Les antennes de Fig. B. Speciofa. cette rare Phalêne sont garnies d'un poil menu; la trompe ne s'apperçoit pas à l'œil. Au-dessous les aîles sont d'un violet pâle couleur de rose, & on voit sur le milieu des antérieures la même marque noire, couverte de blanc, qui resressemble en quelque sorte à la lettre Y. Elle appartient aux Phalênes Atlas (Phal. Attaci) & vient de Suriname. Elle est du Cabinet de Mr. B. Vriends.

Fig. C. Hylæus. Ce Sphinx est pourvu d'une trompe roulée ou en spirale. Audessous la poitrine & l'Abdomen sont de couleur blanche; les pattes & les aîles font brunes, ayant chacunes deux rayes pâles ondées, qui vont de l'une pointe à l'autre. On le trouve à la Nouvelle-York. Celui-ci est dessiné d'après un Original du Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Drury, Tom. II. Tab. 26. Fig. 3. Hylæus.

Fig. D. Nessus. Ce Sphinx-Epervier à aîles échancrées, a une trompe longue

	,
· ·	













gen opgerolden zuiger. Van onder zyn roulée. Au-dessous les aîles ont à peude vleugels byna van dezelfde kleur en près la même couleur & le même dessein tekening als van boven. Zy komt uit de qu'au-dessus. Il vient de la Virginie & Virginien, en berust in het laatst ge- se trouve dans le Cabinet susmentionné. noemde Kabinet.

Fig. E. Glauca. Het lyf en een gedeelte der vleugels by de gewrigten, van deze wederzyds even eens gekleurde Nagt-Kapel, is schoon helder blaauw en glanzig: het overige der zwarte kleur heeft een donkerblaauwen weerschyn. De sprieten zyn gepluimd, en de zuiger spiraalvormig. Zy is uit Surinamen.

Fig. F. Macarea. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder is de grond der vleugels bleekbruin, met een fmalle dwarsstreep van de eene tip naar de andere, en de donker bruine vlakjes welke van boven te zien zyn, hebben daar dezelven met wit gerand. Men vindtze in Surinamen.

CVIII. PLAAT

Fig. A. B. Nobilis. De witte vlakken op de vleugelen van Deze Dikkop-Kapel, zyn doorschynend, en de goudgeele hairtjes, waarmede het lyf bedekt is, als mede de grond der vleugels, van de laatstgemelde kleur, zyn glanzig,'t welk gevoegd by de zwarte tekening en vlak-

II. DEEL.

Fig. E. Glauca. Le corps & une partie des aîles, vers leurs bases, de cette Phalêne dont les deux surfaces ont la même couleur, font d'un bleu clair & luisant; le reste de la couleur noire est d'un chatoyant bleu-obscur. Les Antennes sont plumacées & la trompe est en spirale. Elle est de Surinamen.

Fig. F. Macarca. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Au-dessous le fond des aîles est d'un brun pâle, avec une raye transversale étroite de l'une pointe à l'autre; & les petites taches d'un brun-obscur qui se présentent au-dessus, y sont bordées de blanc. la trouve à Suriname.

PLANCHE CVIII.

Fig. A. B. Nobilis. Les taches blanches sur les aîles de ce Plebeien noble sont transparentes, & le poil jeaune doré dont le corps est couvert, comme le fond des aîles, de la derniere couleur sont lustrés, ce qui étant joint au dessein noir & aux petites taches de la même couleur, don-

jes, aan deze Kapel een edel aanzien geeft, onder de zogenaamde *Pap. Pleb. Urbicolæ*. Deze afbeelding is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Heer *L. Juliaans*: een Mannetje derzelve berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Fig. C. D. Micalia. Deze zeldzaame ongeöogde Nimph-Kapel, gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Van onder hebben de vleugels op den donkeren grond een paarschen weerschyn. Het is eene Westindische, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.


Fig. E. F. Carinenta. De baardfprietjes van deze Dag-Kapel zyn ongemeen lang, en regt vooruitsteekende, vertoonende zig dezelven, als in de gedaante van een scherpen Doorn, voor aan
den kop der Kapel geplaatst. Zy behoort onder de vierpootige, en ongeoogde Nimph-Kapellen. De Heer L.
Juliaans heeft my dezelve ter af beelding
geleend, met berigt dat ze in Surinamen
was gevonden.

nent un grand éclat à ce Papillon, parmi les Pap. Pleb. Urbicolæ. Cette Figure représente un Mâle de la Collection de Mr. L. Juliaans. On en trouve un Mâle dans le Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Fig. C. D. Micalia. Cette très rare Nymphe aveugle n'a que quatre pattes ambulantes. Au-dessous les aîles ont sur le fond obscur un reflet violet. Elle est des Indes Occidentales & se trouve dans le Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. E. F. Carinenta. Les antennules de ce Papillon sont extraordinairement longues, & s'avancent dans une direction droite, ayant la forme d'une épine piquante, placée devant la tête du Papillon. Il est tétrapede & appartient aux Nymphes aveugles. Mr. L. Juliaans me l'a prété, en me mendant qu'il a été pris à Suriname.

3			
		,	
	•		



PLAAT CIX.

Fig. A. B. Patroclus. Deze zeldzame gestaarte Kapel, heeft geene, aan het end geknopte, maar draadswijze sprieten, hierin overeenkomstig met die van den Orontes *, Leilus +, Sloanus **; en meer anderen, welker afbeeldingen in 't vervolg zullen worden gegeeven. De Heer Linnaus, heeft deze foort onder zyne zogenaamde Grieksche Ridder-Kapellen geschaard, en in tegendeel eene andere foort, welke met deze eenige overeenkomst heeft, met de benaaming van Lunus, by de Atlas-Uilen, (Phal. Attac.) geplaatst, welke egter even zo wel als deze onder de Dag-Kapellen behoort.

In het Kabinet van Zyne Doorl. Hoogheid, den Heere Prince van Orrange, beruft eene verscheidenheid van dezen *Patroclus*, welke op een der Molukkische Eilanden, met meerder zeldzame Insecten was gevangen. Deze is uit *China* afkomstig.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 24. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Pl. 47. Fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 37. Fig. 1. d'Aubenton, Planch. enlum. 17. La Chauve Souris. Drury, 1 Tab. 7. Fig. 1. en Tab. 8. Fig. 1.

* Zie I. D. Pl. LXXIV. Fig. A. B. en Pl. XCV. Fig. C. E. II. DEEL.

PLANCHE CIX.

Fig. A. B. Patroclus. Ce rare Papillon à queue n'a point d'Antennes boutonnées, mais filiformes, semblables à celles de l'Orontes * & du Leilus †, Sloanus ** & plusieurs autres, que nous représenterons dans la suite. Monsieur Linnæus a rangé cette espece parmi ses Chevaliers Grecs, tandis qu'au contraire il place une autre sorte, qui ressemble tant soit peu à celui-ci, parmi les Phalênes-Atlas (Phal. Attac.) sous le nom de Lunus, qui est cependant, aussi bien que celui-ci, du rang des Papillons diurnes.

Il y a une variété de ce Patroclus au Cabinet de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange, que l'on a trouvé avec plusieurs autres rares Insectes, dans une des Isles Molucques. Celui-ci est venu de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 749. n. 24. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Pl. 47. Fig. 15. 16. Clerck, icon. Tab. 37. Fig. 1. d'Aubenton Planch enlum. 17. La Chauve Souris. Drury, 1 Tab. 7. Fig. 1. & Tab. 8. Fig. 1.

* Voyez I. Partie Pl. LXXIV. Fig. A. B. & Planche XCV. Fig. C. E. D

Fig. C. D. Bella. Dit fraaie Nagt-Kapelletje, heeft draadvormige sprieten, en een opgerolden zuiger. De Mannetjes hebben meestal de grondkleur der boven vleugels donker-geel of Oranjekleurig, daar de Wyfjes, gelyk deze afgebeelde, dezelve rood hebben. Zy houden de vleugels, in een rustenden stand, om het lyf geslagen, even eens gelyk de Mot-Uiltjes gewoon zyn dezelven te draagen; 't welk misschien den Hr. Linnæus heeft aanleidinge gegeeven, om ze onder de Motten (Phal. Tineæ) te plaatfen: Doch dan zouden de Phal. Ornatrix, Rubricollis, Quadra, de Complana, en de hier volgende Figuur, met even zo veel recht onder het laatstgemelde geslacht behooren: en egter heeft zyn Ed. deze genoemden onder de Phal. Noctuæ geplaatst. Men vindtze in Noord-Amerika, te Nieuw-York, en op het Eiland Jamaika.

Linn. Syst. Nat. pag. 884. n. 348. Phal. Tinea. Drury, Tom. I. Tab. 24. Fig. 3. Fig. E. F. Lotrix. Van deze Nagt-Kapelletjes, vindt men eenigen, welker ondervleugels minder zwartgevlakt zyn, het welk geen kenmerk der Sexe aanwyst: alleen is het agterlyf aan de Mannetjes dunner, en aan het end met een hairagtig kwastje voorzien. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Zy worden op de Kust van Coromandel, te Tran- les trouve à la Côte de Coromandel, à

Fig. C. D. Bella. Cette belle Phalêne a des Antennes filiformes & une trompe en spirale. Le fond des aîles supérieures des Mâles est pour l'ordinaire d'un jaune obscur ou Orange, tandis que les Femelles, comme celle que nous représentons ici, ont ce fond rouge. les portent les aîles autour du corps, lorsqu'elles se reposent, justement comme les Phalénes Teignes ont coutume de les porter; ce qui a peut-être donné lieu à Mr. Linnæus de les placer parmi les Phalênes Tineæ. Mais alors on pourroit à aussi juste titre ranger les Phal. Ornatrix, Rubricollis, Quadra, Complana & la Figure suivante, parmi la derniere Famille, & non-obstant cela il a place toutes celles que nous venons de citer au rang des Phal. Noctue. On les trouve dans l'Amérique-Méridionale, à la Nouvelle-York & dans l'Isle Jamaique.

Linn. Syft. Nat. pag. 884. n. 348. Phal. Tineæ. Drury, Tom. I. Tab. 24. Fig. 3. Fig. E. F. Lotrix. On trouve parmi ces Phalênes quelques-unes dont les aîles inférieures sont moins tachetées de noir, ce qui n'est point une marque distinctive du Sexe: seulement le bout du Corps est plus mince dans les mâles, & pourvu d'une touffe velue. Les Antennes sont filiformes & la trompe est roulée. On

	•	



quebar, en op het Eiland Cyprus ge- Tranquebar & dans l'Isle de Cypres. vonden.

PLAAT CX.

Fig. A. B. Lais. De groene streepen op den zwartbruinen grond der vleugels, van deze ongeöogde Nimph-Kapel, zyn glanzig; zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Het Eiland Java is haar geboorteland, en zy was digt by Batavia gevangen. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer J. C. Sylvius van Lennep.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 7. Fig. 23. 24.

Fig. C. Drusilla. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel, behoort onder de witte Danaüssen, en is met de overigen op deze Plaat afgebeelden, uit de Verzameling van den Heer C. Stoll. Zy komt van Batavia.

Fig. D. Poppea. De vleugels van deze witte Danaüs-Kapel zyn ongemeen dun en teder; van onder zyn dezelven eveneens gekleurd, behalven dat de zwarte randvlakken daar veel kleiner zyn, dan op de bovenzyde. Zy is van de Kust van Guiné, aan de Sierra Leona.

Fig. E. F. Paulina. Deze witte Danaüs-Kapel wordt op de Kust van Coromandel, te Tranquebar, en op het Eiland Java, by Batavia gevonden.

PLANCHE CX.

Fig. A. B. Lais. Les rayes vertes du fond brun noir des aîles de cette Nymphe aveugle, sont luisantes. Elle n'a que quatre pattes ambulantes. Sa Patrie est l'Isle de Java, & on l'a prise tout près de Batavia. Elle se trouve au Cabinet de Mr. J. C. Sylvius van Lennep.

Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 23. 24.

Fig. C. Drusilla. Ce Papillon, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes blanches, & se trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche dans la Collection de Mr. C. Stoll. Il est de Batavia.

Fig. D. Poppea. Les aîles de cette Danaide blanche sont extraordinairement minces & tendres; elles ont audessous la même couleur, à l'exception que les taches noires des bords y font plus petites que sur la surface supérieure. Elle est de la Côte de Guinée, à la Sierre Leona.

Fig. E. F. Paulina. Cette Danaide blanche se trouve à la Côte de Coromandel, à Tranquebar, & dans l'Isle de Java, près de Batavia.

 D_2

PLAAT CXI.

Fig. A. Achelous. De sprieten van deze Nägt-Kapel zyn ongepluimd; het is een Wyfje, waarschijnlyk zullen de Mannetjes dezelven gepluimd hebben. De zuiger is niet zigtbaar. Van onder is de kleur der vleugelen bleek-aschgraauw, en de dwarsstreep is donker asch-kleurig; op het midden der voorste wieken is een witte stip, en op de agtersten ziet men een dergelyk vlakje, met een zwarte stip in 't midden geplaatst. Men zou ze onder de Atlas-Uilen (Phal. Attac.) kunnen plaatsen. Zy is uit de Westindiën, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere H. Schultz, Med. Doctor.

Fig. B. C. Dolylas. Dit Schildrups-Pagetje, is van boven op de vleugels eenigzints glanzig en de twee eeltagtige ronde vlakken zyn blinkend. Het komt uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Heere Professor Luchtmans.


Fig. D. E. Apaftus. De witte bandswyze dwarsvlak op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urb.) is doorschynend. De kop met het Lyf en een gedeelte der vleugelen by het gewricht is met groene glanzige hairtjes bezet. Van onder is de groene kleur en tekening op de agtervleugels mede glanzig, en het overige gedeelte aan beide zyden derzelven, heeft een donkerPLANCHE CXI.

Fig. A. Achelous. Les antennes de cette Phalêne ne sont point plumacées; c'est une Femelle; il est vraisemblable que les Mâles les ont plumacées. La trompe n'est pas visible. Au-dessous la couleur des aîles est d'un minime pale, & la bande transversale est d'une couleur de cendre obscure; il y a sur le milieu des ailes de devant un point blanc, & l'on voit une petite tache semblable avec un point noir au milieu, sur les aîles postérieures. On pourroit les ranger parmi les (Phal. Attac.) Elle est des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection de Mr. H. Schultz, Docteur en Medécine.

Fig. B. C. Dolylas. Cette Cloporte est tant soit peu luisante sur le dessus des aîles, & les deux taches rondes cornées sont lustrées. Elle vient de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. le Professeur Luchtmans.

Fig. D. E. Apastus. La tache transversale en forme de bande sur les aîles supérieures de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urb.) est transparente. La tête, le corps & une partie des aîles vers les bases, sont garnis de poils verts-luisants. Au-dessous la couleur verte & le dessein des aîles postérieures en sont pareillement luisants; & le reste de leurs deux surfaces, est d'un chotoyant bleu-obscur. Ils vien-






•			
			1000
	<i>.</i> •		45
	•		,
			,
			V.
		·	
	•	•	

.

	0			
		•		



blaauwen weerschyn. Zy komen uit Surinamen, en deze berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer IV. van der Meulen.

Fig. F. G. Æropus. Deze bruine, en met een donkergeelen band van boven over de vleugelen, getekende Dag-Kapel, heeft de voorste pooten kort, en in de gedaante van een kwastje aan de borst geplaatst. De Heer Linnæus betrektze onder zyne bonte Danaiissen. Zy wordt op Amboina gevonden, en berust in het laatst gemelde uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Linn. Syst. Nat. pag. 768. n. 128. Pap. Dan. Festiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 9. Tab. 9. Fig. 3. 4. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 1. 2.

PLAAT CXII.

Fig. A. B. Belus. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Kapel, heerscht een groene weerschijn: volgens de verdeeling van den Hr. Linnæus zou ze onder de Grieksche-Ridders behooren. Men vindtze in Surinamen, en zy berust mede in het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Fig. C. Crassus. Van boven zyn de vleugelen meer donkergroen van kleur, dan de voorgaande, doch dezelven praalen met een heerlyken glans. Vanönder is op debovenvleugels dezelfde donkernent de Suriname & celui-ci est du Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. F.G. Æropus. Ce Papillon brun, E qui a une bande d'un jaune obscur sur le dessus des aîles, a les pieds de devant courts & appliqués contre la Poitrine en forme de touffe. Mr. Linnæus le range parmi les Danaïdes bigarrées. Ils viennent d'Amboine & se trouvent pareillement au riche Cabinet de Mr. W. van der Meulen, dont nous venons de faire mention.

Linn. Syst. Nat. pag. 768. n. 128. Pap. Fig. 3.4. Clerck. icon. Tab. 39. Fig. 1. 2.

PLANCHE CXII.

Fig. A. B. Belus. Il y a fur le dessus des aîles de ce Papillon un chatoyant vert. d'Après la division de Mr. Linnæus il appartiendroit aux Chevaliers-Grecs. Il est de Suriname & se trouve de même au Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. C. Crassus. Les aîles sont au-desfus d'un vert plus obscur que celles du précédent, mais elles brillent d'un lustre admirable. Il y a sur le dessous des aîles supérieures la même tache d'un jaunegeelkleurige vlak, als van boven, doch voor 't overige niet onderscheiden met Fig. B. Zy is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Wel Ed. Heer J. G. Schutt, Med. Doct.

Fig. D. E. Orfita. Op den bruinen grond van de bovenzyde der vleugelen dezer zeldzame geöogde Nimph-Kapel, is een fraaye violet-kleurige weerschijn, welke ook plaats heeft aan de onderzyde by de blaauwe oogswyze vlakken, en de binnenranden der ondervleugels; maar wanneer de lichtstraalen van den kop naar het agterlyf vallen, dan vertoont zig de geheele oppervlakte op de laatst gemelde zyde der vleugelen als met een donker roozen-roode-kleurigen weerfchyn.

Fig. F. Orfita. Alhoewel de tekening van onder op de vleugelen onderscheiden is met Fig. E. zo schynt het my egter toe, dat deze het Mannetje van de evengemelde Figuur is. Van boven zyn de vleugels eveneens gekleurd als Fig. D. en van onder heeft dezelve ook dien schoonen roozen-kleurigen weerschyn. De voorste pooten zyn in beiden kort en zonder nagels. De Hooggeleerde Heer Professor Luchtmans is de bezitter van deze fraaye Kapellen, en heeft dezelven nit Bengalen ontvangen.


Fig.F.G. Amabilis. Dit ongemeen fraai Spanrups-Kapelletje heeft draadvormige te a des Antennes filiformes & une trom-

Obscur que sur le dessus, mais pour le reste aucune difference de la Figure B. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Medécine.

Fig. D. E. Orfita. Il y a un beau chatoyant violet sur le fond brun du dessus des aîles de cette rare Nymphe à yeux. qui se trouve aussi sur le dessous, près des taches bleues oeillées, & vers les bords inférieurs des aîles de dessous; mais lorsque les rayons de la lumiere donnent de la tête vers l'Abdomen, la surface entiere dudit coté des aîles représente un chatoyant comme d'une couleur de rose obscure.

Fig. F. Orfita. Quoique le dessein du dessous des aîles differe de la Figure E., il me semble pourtant que celui-ci est le Mâle de la Figure susmentionnée. Audessus les aîles ont la même couleur de la Figure D. & au-dessous elle a pareillement ce beau chatoyant couleur de Rose. Les pattes de devant de tous les deux sont courtes & sans onglets. Mr. le Professeur Luchtmans est le possesseur de ce beau Papillon & l'a reçu de Bengale.

Fig. G. Amabilis. Cette belle clopor-



fprieten, en een gekrulden zuiger; van onder zyn de vleugels effen wit, uitgezonderd, dat de tippen der voorsten vaalzwart zyn. Het is uit *Surinamen*, en berust in het laatstgemelde Kabinet.

PLAAT CXIII.

Fig. A. Lycidas. De groene kleur op het lyf, als mede op de boven en ondervleugels, is glanzig. Van onder is zy in kleur of tekening niet onderscheiden met Fig. B. op de voorgaande Plaat CXII. dan dat deze op elke bovenvleugel drie geele Pylswyze vlakken heeft.

Fig. B. Numitor. Deze verschilt van de volgende, dat dezelve op 't midden van elke ondervleugel een ry van vyf donker-geele driehoekige vlakken heeft.

Fig. C. Erymanthus. Indien deze Kapel niet het Lyf, gelyk de Fig. B. zwavelgeel van kleur had, daar die van Fig. A. het zelve donkergroen en glanzig heeft, dan zou men ze voor eene verscheidenheid van de laatstgemelde kunnen houden, egter zyn het beiden Wyfjes. De onderzyde der vleugels komt benevens die van de Fig. B. volmaakt overeen met die op de voorgaande CXII. Plaat afgebeeld: en ze zyn allen uit Surinamen.

Fig. D. Chorebus. Op de bovenvleu-

pe roulée. Au-dessous les aîles sont d'un blanc simple, à l'exception que les pointes des antérieures sont d'un noir fauve. Elle est de Suriname, & se trouve au Cabinet susmentionné.

PLANCHE CXIII.

Fig. A. Lycidas. La couleur verte du corps, de même que des aîles supérieures & inférieures, est luisante; au-dessous elle ne differe ni en couleur ni en dessein de la Figure B. de la Planche precèdente CXII. qu'en ce que celle-ci a sur chaque aîle supérieure trois taches jaunes en forme de sléches.

Fig. B. Numitor. Celle-ci differe de la suivante en ce qu'elle a sur le milieu de chaque aîle inférieure une raye de cinq taches triangulaires d'un jaune obscur.

Fig. C. Erymanthus. Si ce Papillon n'avoit pas le corps, comme la Figure B. d'un jaune de souffre, tandis que celui de la Figure A. est d'un vert obscur E luisant, on pourroit le faire passer pour une variéte du dernier, cependant tous les deux sont des Femelles. Le dessous des aîles est parfaitement semblable, comme celui de la Figure B. à celui que nous avons représenté sur la Planche CXII. E ils sont tous de Suriname.

Fig. D. Chorebus. Il y a fur les aîles

gels van dit Nagt-Kapelletje is een paarschagtige weerschyn. De sprieten zyn draadvormig, en het heest een gekrulden zuiger. Het is uit Surinamen.

Fig. E. Alfus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleekgeel van kleur. De afbeelding is naar een Wysje, 't welk my uit Surinamen is toegezonden.

Fig. F. Hilaria. Dit Spanrups-Kapelletje met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugels van onder, effen geel, met aan de tippen der voorsten een bruine boogswyze vlak, maar het oogswyze vlakje wordt men daar niet gewaar. Het is uit Surinamen.

Fig. G. Diaphana. Dit Nagt-Kapelletje heeft den grond der vleugelen doorfchynend; op de onderzyde zyn de geele streepen, en zwarte stippen bleek van font d'une couleu
kleur; de sprieten zyn draadvormig, en font filisormes &
de zuiger is gekruld. Zy valt aan de la trouve à la Sie
Sierra Leona op de Goudkust van A- d'or de l'Afrique.
frika.

PLAAT CXIV.

Fig. A. B. Decius. Deze zeldzame en gestaarte Kapel, heeft by den witten dwarsband over de vleugelen, een violet-blaauwen weerschyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke in gedaante der

fupérieures de cette Phalêne un chatoyant violet. Les antennes sont filisormes, & elle a une trompe roulée. Elle est de Suriname.

Fig. E. Alfus. Les antennes de cette Phaléne sont plumacées & la trompe est en spirale. Au-dessous les aîles sont d'un jaune pale. Cette Figure représente une Femelle qui m'a été envoyée de Suriname.

Fig. F. Hilaria. Les aîles de cette tortue à antennes filiformes & la trompe roulée, font au-dessous d'un jaune simple, avec une tache brune en forme d'Arc aux pointes des aîles antérieures, mais on n'y apperçoit pas la tache oeillée. Elle est de Suriname.

Fig. G. Diaphana. Le fond des aîles de cette Phalêne est transparent. Audessous les rayes jaunes & les points noirs sont d'une couleur pâle. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. On la trouve à la Sierra Leona, sur la Côte d'or de l'Afrique.


PLANCHE CXIV.

Fig. A. B. Decius. Ce rare Papillon à queue a un chatoyant violet bleu près de la bande transversale blanche, qui se voit sur les aîles. C'est un Papillon tetrapede, qui a de la ressemblance avec



	va.		
	•		
•			
1.0			
g			
	0		
		*	
		6.5	

	•	
*	•	



der vleugels overeenkomst heeft met den Philoctetes en Laërtes †. Zy is van de forme des aîles. Il est de la Côte de Kust van Guinée, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heere A. Gevers.

Zie I. Deel Pl. XX. Fig. A. + Pl. LXX. Fig. C. D.

Fig. C. D. Sibilla. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt in Europa, in Nederoostenryk, en Zwitzerland ook gevonden. Zy behoort onder die maar vier pooten gebruiken om mede te loopen. Zy is te Smirna gevangen, en berust in het laatstgemelde Kabinet.

Linn. Syst. Nat. pag. 781. n. 146. Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 1. 2. Rösel inf. Tom. III. Tab. 70. Fig. 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. Deze behoort ook onder de ongeöogde Nimph-Kapellen, en die welke men vierpootige noemt. Haar woonplaats is op de Kust van Guinée.

PLAAT CXV.

Fig. A. B. Zenobia. Deze Nagt-Kapel kan met recht, wegens de ongemeene sierlyke tekening aan beide zyden der vleugelen, een der schoonsten genoemd II. DEEL.

le Philocietes & le Laërtes † quant à la Guinée & se trouve au Cabinet de Mr. A. Gevers.

Voyez la I. Partie Pl. XX. Fig. A. † Planche LXX. Fig. C. D.

Fig. C. D. Sibilla. On trouve aussi cette Phalêne aveugle en Europe, dans la Basse - Autriche & dans la Suisse. Elle appartient à celles qui n'ont que quatre pattes ambulantes. On l'a prise à Smirne & elle se trouve au Cabinet susmentionné.

Linn. Syft. Nat. pag. 781. n. 146. Pap. Nimph. Phalerat. Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 1. 2. Röfel, inf. Tom. III. Tab. 70. Fig. 1. 2. 3.

Fig. E. F. Ophione. Celle-ci appartient pareillement aux Nymphes aveugles & à celles que l'on nomme quadrupedes. Sa demeure est à la Côte de Guinée.

PLANCHE CXV.

Fig. A. B. Zenobia. C'est à très juste titre que l'on peut nommer ce Papillon ci une des plus belles Phalênes, quant au dessein extraordinairement beau des deux worden. Zy is tot nog toe in de Kabinetten zeldzaam, en de eenigste welke ons is voorgekomen. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger gekruld. Men heeft ze in Surinamen gevonden, en zy berust thans in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heere Baron Rengers.

Fig. C. Modesta. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en het heeft een gekrulden zuiger. Onder zyn de vleugelen van dezelsde bruinekleur als van boven, doch zonder die donker-roode vlak aan de tippen der voorsten. Het is uit Surinamen, en bevindt zig in de Verzameling van den Heere B. Vriends.

Fig. D. Pritanis. Deze is mede eene draadsprietige Nagt-Kapel, welke een gekrulden zuiger heeft. De vleugelen zyn van onder aschkleurig, byna als de bleeke randen van boven, en langs de buitenranden loopt een golfswyze zwarte tekening. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. Osiris. Deze zwarte en op de vleugels geelgevlakte Nagt-Kapel, is van onder van dezelfde kleur, de sprieten heeft zy draadvormig, en is met een gekrulden zuiger voorzien. Zy is mede uit Surinamen, en in het Kabinet van den Heere Bernard Vriends.


furfaces des aîles. Jusqu'ici elle est fort rare dans les Cabinets, & celle-ci est la seule que nous avons trouvée. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. On l'a trouvée à Suriname & elle est maintenant au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.


Fig. C. Modesta. Les antennes de cette Phaléne sont filiformes & sa trompe est roulée. Au dessous les aîles sont de la même couleur brun qu'au-dessus, mais sans la tache rouge-obscure aux pointes des antérieures. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. B. Vriends.

Fig. D. Pritanis. Celle-ci est pareillement une Phalêne à antennes siliformes, qui a une trompe roulée. Les aîles sont au-dessous d'une couleur minime, presque comme les bords pâles au-dessus, & îl s'étend le long des bords extérieurs un dessein noir ondoyant. Elle est de Suriname.

Fig. E. Osiris. Cette Phalêne noire & qui est tachetée de jaune sur les aîles, est au-dessous de la même couleur. Ses antennes sont filisormes & elle est pourvue d'une trompe roulée. Elle est pareillement de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. B. Vriends.

	-	
. •		
		,
		1
·		














Fig. F. Ofinia. Dit Dag-Kapelletje, zou wegens de ongekartelde randen der vleugelen, onder de bonte Danaüssen behooren: het is een vierpootige gelyk alle de zogenaamde Gras-Kapellen. Zy komt uit Surinamen, en berust in het laatstgenoemde Kabinet.

PLAAT CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. Deze witte Danaüs-Kapel woont in de Westindiën, op Essequebo en Demerary, en is met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog-Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. C. Molphea. De onderzyde der vleugelen is gelyk aan Fig. B. Men zou ze voor het Wyfje van de evengemelde aanzien, indien de vleugelen niet ongekarteld, en geheel gaaf van rand waren. Zy wordt mede te Essequebo gevonden.

Fig. D. E. Arcadia. Dit is een vierpootige geöogde Nimph-Kapel, en gebruikt maar vier pooten om mede te loopen. Haar woonplaats is Batavia.

Fig. F. Retorta. Van deze Nagt-Kapel heeft Clerck eene afbeelding gegeven, welke in de grondkleur merkelyk

Fig. F. Ofinia. Ce Papillon appartiendroit, par les bords non-dentelées des aîles, aux Danaides blanches. Ilest tetrapede, comme tous les Papillons que l'on nomme Nymphes. de Suriname & se trouve au Cabinet susmentionné.

PLANCHE CXVI.

Fig. A. B. Amathonte. La demeure de cette Danaide blanche est dans les Indes-Occidentales, à Essequebo & Demerary & on l'a fait dessiner avec tous les autres Papillons de cette Planche d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. Molphen. Le dessous des atles ressemble à celui de la Figure B. On la feroit passer pour la Femelle de la susmentionnée, si les aîles n'étoient point sans dentelures & n'eussent point des bords entiers. On la trouve aussi à Essequebo.

Fig. D. E. Arcadia. C'est une Nymphe à yeux quadrupede, qui n'a que quatre pattes ambulantes. Elle demeure à Batavia.

Fig. F. Retorta. Clerck a représente une Phalene, qui differe beaucoup dans le fond: ses aîles étant d'un jaune verschilt: als zynde daar de vleugels sale. Il semble que ce Papillon a tiré krulden zuiger. Van onder zyn de & à Tranquebar. vleugels effen bruin. Men vindtze in Bengalen, op de Kust van Coromandel, en te Tranquebar.

vuilgeel. Wegens eene zonderlinge te- son nom du rare dessein qui représente keninge, welke op het midden van ie- sur chaque alle supérieure la forme d'un der bovenvleugel, de gedaante van een Retort. Elle a des antennes filiformes Retort vertoont, schynt het dat deze & une trompe roulée. Au-dessous les Kapel den bynaam heeft gekreegen. Zy aîles sont d'un brun simple. On la trouheeft draadvormige sprieten, en een ge- ve à Bengalen, à la Côte de Coromandel

. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 2. 3.

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 2. 3.

PLAAT CXVII.


PLANCHE CXVII.

Fig. A. Laocoon. Dit Mannetje heeft gepluimde sprieten; maar geen zigtbaaonderscheiden van het Wyfje by de volgende Figuuren B. C. afgebeeld. Van onder zyn de vleugelen gelyk aan de bovenzyde derzelven, maar een weinig meer roodroozenkleuriger, en de ondervleugels in 't midden naar de gewrichten effen geel.

Fig. B. C. Laocoon. Deze is naar een Wyfje afgebeeld, welke de sprieten de Atlas Uilen (Phal. Attac.) van Linnaus, en worden in Bengalen gevonden. De Heer Professor Luchtmans heeft ze my ter aftekening geleend.

Fig. A. Laocoon. Ce Mâle a des antennes plumacées; mais une trompe imren zuiger. In groote is het merkelyk perceptible. Pour la grandeur il differe beaucoup de la Femelle, représentée dans les Figures B. C. Au-dessous les aîles ressemblent entierement à leur surface supérieure, mais elles sont d'une couleur de rose plus rouge, & les aîles inférieures sont au milieu vers les jointures d'un jaune simple.

Fig. B. C. Laocoon. Cette Figure. représente une Femelle, dont les aîles draadvormig heeft. Zy behooren onder font filiformes. Elles appartiennent aux Phalênes Atlas (Phal. Attac.) de Linnæus & se trouvent à Bengalen. Mr. le Professeur Luchtmans me l'a prétée pour la faire dessiner.



•	
3	

			·
		·	




Fig. D. Misenes. Dit Argus-Kapelletje heeft de vleugelen van boven bruin, doch op de buitenranden der voorsten een witte stip. Het is uit Surinamen en berust in het Kabinet van den Heer 3. G. Schutt, Med. Doctor.

Fig. E. Lycabas. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugels blaauwven, op het midden van ieder bovenvleugel is een eeltagtige blinkende roode vlak. Het is uit Surinamen, en in het evengemelde Kabinet.

Fig. F. G. Lagus. Op de bovenzyde der vleugels, heerscht een blaauwe glans. Het zou onder de zogenaamde blaauwe Argus-Kapelletjes kunnen geplaatst worden, want 't heeft, even als die, zes volmaakte pooten. Het valt in Surinamen, en is in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

PLAAT CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. Deze Pylstaart is gemeen lang.

Fig. D. Misenes. Le dessus des aîles de cet Argus est brun, mais il a sur les bords extérieurs des antérieures un point blanc. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Médecine.

Fig. E. Lycabas. Les aîles de cette petite Tortue sont au-dessus d'un lustre glanzig, met zwarte randen om dezel- bleu, avec des bords noirs à l'entour; il y a sur le milieu de chaque aîle supérieure une tache cornée ronde & luisante. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet susmentionné.

> Fig. F. G. Lagus. Sur le dessus des aîles domine un éclat bleu. On pourroit le ranger parmi les Argus bleus ayant comme celui-là six pattes entieres. On nous l'a apporté de Suriname & il est de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

PLANCHE CXVIII.

Fig. A. Hydaspus. Ce Sphinx est le een der grootsten, welken my onder dat plus grand que je connoisse. La trompe geslacht bekend zyn. De zuiger is on- est extraordinairement longue. Le mi-De ondervleugels zyn lieu des aîles inférieures est un peu transop het midden eenigzints doorschynend. parent. Toutes les aîles sont au-dessous Van onder zyn alle de vleugelen asch- d'un brun tirant sur le minime. On en graauwagtig bruin. Men vindt eene ver- trouve une variété * qui n'ont point les vlakken, op het agterste gedeelte van het lyf, ontbreekt; misschien zyn de laatsten de Mannetjes. Want deze afgebeelde is naar een Wyfje. Men vindtze in Surinamen.

Merian fur Inf. Tab. 38. * Zie Houttuin Nat. Hist. I. D. XI. St. pag. 432. Pl. 90. Fig. 2.

Fig. B. C. Chrysippus. Onder deze tekening niet onderscheiden. De Mannetjes zyn op de ondervleugels minder zwart gevlakt dan dit afgebeelde gekarteld zyn. Deze wordt in China op den.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 119. IV. Tab. 6. Fig. 11. 12. Edwards, av. Tab. 189. Seligman, uitl. vog. Tom. VI. Seligman. Tom. 6. Tab. 84. Tab. 84.

scheidenheid * aan welken de zes witte six taches blanches sur la partie postérieure du Corps; peut-être que ces derniers en sont les Mâles, car la Figure que nous donnons ici représente une Femelle. On les trouve à Suriname.

> Merian. Sur. Inf. Tab. 38. * Voyez Houttuin, Hift. Nat. Part. I. Tom. XI. pag. pag. 432. Pl. 90. Fig. 2.

Fig. B. C. Chrysippus. On trouve Kapellen vindt men verscheidenheden, parmi ces Papillons des variétés qui sont welke byna geheel bruin zyn, doch in presque entierement brunes, mais qui ne disferent point dans la couleur. Les aîles inférieures des Mâles sont moins tachetées de noir, que celles de la Femelle Wysse. De Heer Linnaus betrekt ze que nous représentons ici. Mr. Linnaus onder zyne bonte Danaüssen, wegens les place au rang des Danaïdes bigarde weinig gekartelde randen der vleuge- rées, à cause des bords peu dentelées des len; egter vindt men eenige soorten van aîles; cependant on trouve quelques esde zo genaamde kaneelkleurige Kapel- peces des Papillons couleur de canelle, len, welker vleugelranden wel degelyk dont les bords des aîles sont visiblement dentelées. Celui-ci se trouve à la Chine de Kust van Coromandel, te Tranquebar sur la Côte de Coromandel, à Tranquebar en meer plaatsen in de Oostindiën gevon- & dans plusieurs autres lieux des Indes Orientales.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 119. Pap. Dan. Festiv. Seba, Schatk. Tom. Pap. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 11.12. Edwards, av. Tab. 189.




Fig. D. E. Crispus. Dit Argus-Kapelletje is het Wyfje van de volgende Fig. F. het verschilt maar in de tekening der roode glanzige grondkleur op het midden der bovenzyde van de vleugelen.

Fig. F. Crispus. Dit Mannetje heeft van onder de zelfde kleur en tekening, als het Wyfje by Fig. E. Men vindtze in Surinamen, en zyn my door den Heer M. Houttuin, Med. Doct. ter afbeelding geleend.

Fig. G. Formosus. Van boven is dit Schildrups-Pagetje op de vleugelen bruin, met een ligt-blaauwen weerschijn. vergulde streepen en vlakken staan eenigfints verheven, byna als die by de zogenaamde goud-dropjes, of Pap. Cupido van Linnæus. Dit zeldzaame Diertje is van Surinamen, en berust in de Verzameling van den Heere J. G. Schutt, Med. Doct.

PLAAT CXIX.

Fig. A. Vesta. Deze gestrekte of Parnas-Kapel gelykt veel naar de Erato welker ondervleugels mede rood gestreept zyn; maar in de plaatsing en tekening der geele vlakken op de bovenvleugels onderscheid zig deze met de

Fig. D. E. Crispus. Cet Argus est la Femelle de la Figure suivante F.; il ne disfere que dans le dessein du fond rouge luisant sur le milieu de la surface supérieure des aîles.

Fig. F. Crispus. Ce Mâle à au-dessous la même couleur & le même dessein de la Femelle, Fig. E. On les trouve à Suriname, & Mr. Houttuin, Docteur en Médecine me les a prêtés pour les faire dessiner.

Fig. G. Formosus. Le dessus des ailes de cette Tortue est de couleur brune avec un chatoyant bleu-clair. Les rayes dorées & les taches sont un peu élevées, à peu près comme celles des Pap. Cupido de Mr. Linnæus. Ce rare petit Insecte est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. J. G. Schutt, Docteur en Médecine.

CXIX. PLANCHE

Fig. A. Vesta. Ce Papillon à aîles oblongues ressemble beaucoup à l'Erato, dont les ailes inférieures ont pareillement des rayes rouges; mais celui-ci en differe visiblement dans la position & le dessein des taches jaunes sur les aîles sulaatstgemelde zeer blykbaar. Van onder périeures. Le-dessous des aîles ne diffezyn de vleugelen met de bovenzyde niet re en couleur ni en dessein de la surface verschillend in kleur noch tekening. Zy supérieure. Il est du rang des Papillons behoort onder de vierpootige Kapellen, tétrapedes & se trouve à Suriname. en wordt in Surinamen gevonden.

Fig. B. C. Rhanis. Dit aartig gekleurde Spanrups - Kapelletje heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger; het is uit de Westindiën, en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.


Fig. D. E. Etheocles. Deze franie Kapel is onder die zeldzaame foorten te rekenen, welker afbeeldingen op de .IIIde, en XXXVIIste Plaaten te zien zyn. Op de bovenzyde der vleugelen heerscht een blaauwagtige, doch by den witten dwarsband een groene weerschyn; de twee voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is gevangen op de Kust van Guiné by de Sierra Leona, en berust thans in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. F. G. Itys. Wegens de gedaante der vleugelen komt deze Kapel overeen met den Actorion * en de Cymodoce †. Zy behoort mede onder de vierpootige, is uit Surinamen, en berust in de laatstgemelde Verzamelinge.

Fig. B. C. Rhanis. Cette petite Phalêne Arpenteuse, de couleur très rare, a des Antennes filisormes & une trompe roulée. Elle est des Indes Occidentales & se trouve au Cabinet de son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. E. Etheocles. On peut placer ce beau Papillon parmi les rares especes, que nous avons représentés sur les Planches III. & XXXVII. Il domine sur le dessus des aîles un chatoyant bleuâtre, mais près la bande transversale blanche un reslet vert. Les deux pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Il est venu de la Côte de Guinée, près de Sierra Leona & se trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

F. G. Itys. Par la forme des aîles de ce Papillon il ressemble à l'Actorion * & à la Cymodoce †. Il est pareillement tétrapede & de Suriname. On le trouve dans la Collection susmentionnée.



PLAAT CXX.

Fig. A. Polita. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugels met het Lyf, een zelfde kleur, te weten, ligt zee-groen, met een roozen-roodkleurigen weerschyn, en de vleugels zyn eenigfints doorfchynend. Zy behoort onder de Phal. Noctuæ van den Heer Linnaus, en is aan de Sierra Leona op de Goudkust van Afrika sur la Côte d'or de l'Afrique. gevonden.

Fig. B. Astur. De onderzyde der boven vleugelen van deze Nagt-Kapel (Phal. Noctua.) is eveneens, met bruine en witte tekening gelyk dezelve van boven, in de afbeelding zig vertoonen. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men vindtze in Surinamen.

Fig. C. D. Statira. Deze Danaüs-Kapel heeft het grootste gedeelte der vleugelen, van boven, zwavel-geel en naar de zwarte buiten-randen derzelven witagtig; van onder, hebben alle de vleugelen een fierlyken glans. Zy worden op de Kust van Coromandel, en te Tranquebar gevonden. En deeze bevind zig in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

II. DEEL.

PLANCHE CXX.

Fig. A. Polita. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Au-dessous les aîles ont la même couleur avec le corps, qui est d'une aigue marine claire, avec un chatoyant rouge couleur de rose & les aîles sont tant soit peu transparentes. partient aux Phal. Noctue de Mr. Linnæus & on l'a trouvé à la Sierre Leona,

Fig. B. Aftur. Le dessous des aîles supérieures de cette Phalène (Phal. Noctua) est du même dessein brun & blanc, que l'on voit sur le dessus de notre Figure. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. On la trouve à Suriname.

Fig. C. D. Statira. La plus grande partie des aîles en-dessus de cette Danaide, est d'un jaune de soussire, mais du coté des bords noirs elles sont blanchâtres. Au-dessous toutes les aîles ont un beaulustre. On les trouve sur la Côte de Coromandel & à Tranquebar, & celle - ci est de la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. E. F. Eubule. Veele verscheidenheden worden van deze geele Westindische Kapellen gevonden, of dezelven alle uit verschillende Rupzen voortkomen is ons onbekend. De witte vlakken op de ondervleugels by Fig. F. zyn zilverglanzig.

Linn. Syst. Nat. pag. 764. n. 102. Pap. Dan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 19, 20. en Tab. 38. Fig. 17, 18. Edwards. av. Tab. 304.

Fig. E. F. Eubule. On trouve beaucoup d'especes variées parmi ces Papillons jaunes des Indes Occidentales. Nous ne saurions determiner s'ils naissent tous de Chenilles différentes. Les taches blanches des aîles inférieures de la Figure F. sont d'un lustre argenté.

Linn. Syst. Nat. pag. 764. n. 102. Pap. Dan., Cand. Seba, Tom. IV. Tab. 23. Fig. 19, 20. & Tab. 38. Fig. 17, 18. Edwards av. Tab. 304.

A)			



PLAAT CXXI.

Fig. A. B. Ulysses. Het Lyf en een gedeelte der vleugelen by de gewrigten, is versierd met een groenagtig glinsterend Stof of Dons: en de blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen heeft een Satynagtigen glans; de bruine Lancetswyze vlakken, die op de voorste vleugels in de blaauwe schieten, bestaan uit lange donsagtige hairtjes, welken men met het bloote oog gewaar wordt, wanneer deze hairties met de punt van eene fpelde, of stompe naalde opgeligt worden. Het is eene van die Pagies of gestaarte Kapellen, welke onder de Grieksche Ridders behoort. Zy worden in de Molukkische Eilanden gevonden. Deze is van Amboina.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 21. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 46. Fig. 9, 10. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 1.

Fig. C. D. Tytia. Deze Kapel behoort onder de vierpootigen, en wegens
de byna ongekartelde vleugelranden, by
de bonte Danaüs-Kapellen (Pap. Dan.
Festiv.) Men vindtze in Surinamen,
zy is met de naastvolgende getekend uit
de verzameling van den Wel Eerw. Heer
E. F. Alberti.

Fig. E. F. Aceste. Is mede een vier-II. Deel.

PLANCHE CXXI.

Fig. A. B. Ulysses. Le corps & une partie des aîles vers leurs jointures est orné d'un duvet verdâtre & luisant; & la couleur bleue du dessus des aîles est d'un lustre satiné; les taches brunes, en forme de Lancettes, qui s'avancent sur les aîles antérieures dans les taches bleues, sont de petits poils farineux, qui s'apperçoivent à l'œil, lorsqu'on les leve avec la pointe d'une épingle ou d'une Aiguille. C'est un Page ou Papillon à queue qui appartient aux Chevaliers Grecs. On les trouve aux Iles Molucques. Celui-ci est d'Amboine.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 21. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 46. Fig. 9. 10. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 1.

Fig. C. D. Tytia. Ce Papillon est tétrapede, & il appartient aux Danaïdes bigarrées (Pap. Dan. Festiv.) par les bords presque sans dentelures des aîles. On les trouve à Suriname. Il est dessiné, avec le suivant, d'après les originaux de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. F. Aceste. Celui-ci est pa-

pootige Kapel; dezelve wordt in Suri- reillement un Papillon tetrapede, qui se namen gevonden.

Linn. Syft. Nat. pag. 782. n. 197. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 43. Fig. 3. Clerck, icon. Tab. 43. Fig. 3.

PLAAT CXXII.

Fig. A. Diomedes. Hoe veel overeen-Pagie heeft, zo schynt zy egter eene byzondere foort uittemaken: op de bovenvleugels ontbreeken die bruine Lancetswyze hairagtige vlakken, welken op van onderen komt zy met dezelve volmaakt overeen.

Linn. Syft. Nat. pag. 749. n. 23. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 47. Fig. 12.

De bleek-Fig. B. C. Eurypylus. groene vlakken op de vleugelen van deze Kapel, zyn in fommigen meer wit, dan in de hier afgebeelde; 't welk egter geen uiterlyk kenmerk der Sexe aanwyst; want ik heb Mannetjes en Wyfjes gezien, welken beiden de gemelde vlakken wit, en anderen wederom van dezelve kleur hadden gelyk hier de afbeelding vertoont.

Linn. Syst. Nat. pag. 754 n. 49.

trouve à Suriname.

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 197. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 43. Fig. 3. Clerck, icon. Tab. 43. Fig. 3.

CXXII. PLANCHE

Fig. A. Diomedes. Quoique ce Pakomst ook deze Kapel met de Ulysses- pillon-ci ait beaucoup de rapport avec le Page-Ulysses, il paroit cependant d'une autre espece. On ne voit pas sur les aîles de-dessus les taches brunes farineuses, en forme de Lancettes, qui se trouvent die der laatstgemelde te zien zyn; doch sur celles du dernier; mais en-dessous il lui ressemble parfaitement.

> Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 23. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 47. Fig. 12.

> Fig. B. C. Eurypylus. d'un verd-pale sur les aîles de ce Papillon, sont plus blanches dans quelques uns que dans celui que nous représentons ici, ce qui n'est pourtant pas une marque distinctive du Sexe; car j'ai vu des Mâles & des Femelles, qui avoient tous les deux ces taches blanches; d'autres au contraire dont les dites taches avoient la même couleur de notre Figure.

Linn. Syst. Nat. pag. 754. n. 49.



7 300 a 7 1	Till and the
,)	



Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. Fig. 2.

Fig. D. E. Sarpedon. De Heer Lin-Ridder-Kapellen geplaatst: terwyl zy vlakken aan de borst heeft, welke zyn HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN O- RANGE. RANGE.

Linn. Syst. Nat. pag. 747. n. 15. Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. 4. 15. 16. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 1. * Zie Voorrede I. D. pag. 10.

PLAAT CXXIII.

Fig. A. Panthous. Deze groote Pap. Eq. Achiv. Clerck, icon. Tab. 28. Fig. 2.

Fig. D. E. Sarpedon. Mr. Linnæus næus heeft deze onder zyne Trojaansche a place celui-ci au rang de ses Chevaliers Troyens; cependant nous trouvons even zo min als de Eurypylus, die roode qu'il y appartient aussi peu que l'Eurypylus, qui a des taches rouges à la poitri-Ed. tot een kenmerk derzelven gesteld ne, & qu'il avoit indiqué pour une marhad *, daartoe behoort. Zy worden in que distinctive. * On les trouve en Chi-China gevonden; doch deze is met de ne; mais celui-ci, comme tous les Pahier op deze Plaat afgebeelde Kapellen pillons de cette Planche, est d'Amboine, uit Amboina afkomstig: en zy berusten in & du Cabinet de Son Altesse Se're'het Kabinet van Zyne Doorluchtige nissime, Monseigneur le Prince d'O-

> Linn. Syst. Nat. pag. 747. n. 15. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 37. Fig. 3. 4. 15. 16. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 1. * Voyez la Preface, P. I. pag. 10.

PLANCHE CXXIII.

Fig. A. Panthous. Monsieur C. Clerck Trojaansche Ridder-Kapel is door den nous a fait connoître ce grand Cheva-Heer Carolus Clerck opgegeven, voor lier Troyen, pour la Femelle d'une espehet Wyfje van eene geheel verschillende ce toute différente, qui n'a pas le moinfoort, welke geene de minste overeen- dre rapport avec lui. Notre Figure rekomst met dezelve heeft. Wy hebben présente une Femelle qui se trouve au Caonze afbeelding ontleend naar een Wyf- binet du très Vénérable Mr. A. Gevers; je, 't welk berust in het Kabinet van den & il y a au Cabinet de son Excellence Wel Ed. Groot Achtb. Heere A. Gevers, Mr. le Baron Rengers un Mâle qui difen de Hoog Welgeb. Heer Baron Ren- fere fort peu dans le dessein, étant seu-

Mannetje, dat in Tekening weinig of niets verschilt, dan dat het zelve een weinig kleiner is. Zy worden in Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk, Tom. IV. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 44. Tab. 44. Fig. 22. 23. Clerck. icon. Fig. 22. 23. Clerck, icon, Tab. 19. Tab. 19.

Fig. B. C. Agyrtus. Dit kleine Kapelletje verschilt van den Pap. Phereclus * alleen in de twee ligt geele dwarsbanden over de Vleugelen naby de gewrigten, by Fig. C. welke banden in de laatstgemelde ontbreeken. Op den donkerbruinen grond der bovenvleugelen, Fig. B. heerscht een Paarschen weerschyn. Het is uit Surinamen en thans in het Kabinet van den Wel Ed. Heer Meulen. IV. van der Meulen.

* Linn. Syst. Nat. pag. 793. n. 248. Pap. Pleb. Rural.

PLAAT CXXIV.

Fig. A. Panthous. Deze afbeelding naastvoorgaande Plaat Fig. A.

Fig. B. C. Hecabé. Onder deze gee-

gers bezit in deszelfs verzameling een lement un peu plus petit. On les tronve à Amboine.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap.

Fig. B. C. Agyrtus. Ce petit Papillon differe uniquement du Pap. Phéreclus * dans les deux bandes transversales d'un jeaune clair, près les jointures des aîles, de la Figure C., qui ne se trouvent point dans le dernier. Il y a sur le fond brunobscur des aîles supérieures, Fig. B. un chatoyant violet. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. W. van der

* Linn. Syft. Nat. pag. 793. n. 248. Pap. Pleb. Rural.

PLANCHE CXXIV.


Fig. A. Panthous. Cette Figure reis naar de Onderzyde der Kapel, op de présente le dessous du Papillon de la Planche précédente, Fig. A.

Fig. B. C. Hecabé. On trouve beaule Danaus-Kapellen vindt men veele ver- coup de variétés * parmi ces Danaides scheidenheden *, welken de boven vleu- jaunes, qui ont les aîles supérieures plus gels breeder, of smaller, met zwart ge- larges ou plus étroites, bordées de noir, rand hebben, en van onder, veel min- & qui, en-dessous, sont moins tachetées & der gevlakt en gestipt zyn dan deze hier pointillées que celle que nous représentous



•	,	•		•	
•					
		•			
		·			
•					
			2		

.



afgebeelde. De Mannetjes zyn gemeen- ici. Les Mâles sont d'ordinaire plus pegevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. * Zie I.D. pag. 31. Plaat XX. Fig. K. L.

PLAAT CXXV.

Fig. A. B. Pyrene. Deze Kapel is het Mannetje van de volgende Figuur C. Ik heb ze beiden uit China ontfangen; maar zy worden ook op de Kust van Coromandel, te Tranquebar gevonden.

Fig. C. Pyrene. Van onder ontbreeken aan dit Wyfje die bruine ringswyze met wit gevulde vlakken, welken op de vleugelen der Mannetjes by Fig. B. te zien zyn, doch de grondkleur is daar effen geel of Citroenkleurig.

Linn. Syst. Nat. pag. 762. n. 86. Pap. Dan. Cand. Drury Tom. I. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. D. Daucus. De Zuiger van de-

lyk kleiner, en van onder enkel geel tits, & en-dessous d'un jeaune simple, van kleur, zonder eenige Tekening; doch sans aucun dessein; mais ils ont sur le zy hebben op het midden van elke ag- milieu de chaque aile postérieure, pour la tervleugel meestal een donkergeel of plus grande partie, une petite tache d'un oranjekleurig Vlakje. Zy worden in jeaune-obscur ou couleur d'Orange. On China, en op de Kust van Coromandel, les trouve en Chine & à la Côte de Coromandel.

> Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 96. Pap. Dan. Cand. * Voyez P. I. pag. 31. Planche XX. Fig. K. L.

PLANCHE CXXV.

Fig. A. B. Pyrene. Ce Papillon est le Mâle de la Figure suivante C. Je les ai reçu tous les deux de la Chine; mais on les trouve aussi à la Côte de Coromandel, à Tranquebar.

Fig. C. Pyrene. On ne trouve point sur le-dessous de cette Femelle, ces taches brunes en forme d'anneaux, remplies de blanc, qui se voyent sur les ailes des Mâles, de la Figure B.; mais le fond y est d'un jeaune simple ou couleur de citron.

Linn. Syst. Nat pag. 762. 11. 86. Pap. Dan. Cand. Drury, Tom. I. Tab. 5. Fig. 2.

La Trompe de ce Fig. D. Daucus. zen Pylstaart is lang. Van onder is het Sphinx est longue. En-dessous le Corps Lyf met de Pooten graauw van kleur; & les pattes sont grises; les aîles d'un de Vleugels ligtbruin; op de voorsten brun clair; sur celles de devant, la banschynt de witte, en op de agtersten de de transversale blanche, & sur celles de G 3

roode dwarsstreep door. Men vindt ze in Noord-America, te Nieuwjork, in de Virginien en op het Eiland Jamaika.

Houttuin Nat. Hist. I. D. pag. 438. Pl. XC. Fig. 4.

Fig. E. Celerio. Deze Pylstaart heeft veele overeenkomst met die Europische, welke by Frisch * en Rösel zyn afgebeeld. De Zuiger is lang en opgerold. Van onder zyn de Vleugels in de grondkleur aschkleurig, en met bruingeele stippen bezet. Op de Kust van Coromandel, te Tranquebar, en aan de Kaap de goede Hoop schynen zy zeer gemeen te zyn.

* Frisch ins. XIII. Tab. 1. Fig. 2. ** Rösel ins. Tom. IV. Tab. 8. Linn. Syst. Nat. pag. 800. n. 12. Sphinx. Celerio.

Fig. F. Caicus. Van onder is deze Pylstaart met het Lyf en de Vleugelen bleekrood, eenigzints naar het bruine hellende; de Zuiger is lang. Hy behoort nevens de twee voorgaanden onder de zogenaamde echte Pylstaarten *, en wordt in Surinamen gevonden.

* Zie Voorrede I. Deel pag. 13.

Fig. G. Dentatus. Alhoewel de Randen der Vleugelen van dezen Pylstaart merkelyk getand zyn, zo heeft hy egter een langen opgerolden Zuiger: 't welk in de Europische Pylstaarten, welken de derriere, la dite bande rouge, se fait le plus appercevoir. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle York, à la Virginie & sur l'Île de Jamaïque.

Houttuin, Nat. Hift. P. I. pag. 438. Pl. XC. Fig. 4.

Fig. E. Celerio. Ce Sphinx ressemble beaucoup à ceux de l'Europe qui ont été représentés par Frisch * & Rösel **. La Trompe est longue & en spirale. Endessous les aîles sont dans le fond de couleur de cendre & pourvues de pointes d'un jeaune brunâtre. Ils paroissent être fort communs à la Côte de Coromandel, à Tranquebar & au Cap de bonne Esperance.

* Frisch, ins. XIII. Tab. 1. Fig. 2.

** Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 8. Linn.


Syst. Nat. pag. 800. n. 12. Sphinx Celerio.

Fig. F. Caicus. En-dessous le Corps & les aîles de ce Sphinx sont d'un rouge pâle, tirant un peu sur le brun; la trompe est longue. Il appartient avec les deux précédens, parmi les vrais Sphinx* & on le trouve à Suriname.

* Voyez la Preface. P. I. pag. 13.

Fig. D. Dentatus. Quoique les bords des aîles de ce Sphinx sont visiblement dentelées, il a cependant une trompe longue roulée, ce qui se voit fort peu dans les Sphinx de l'Europe, qui ont les bords

		,			
•		•			
	ŷ.				
	•				
,				787	
			,		
·					
,					



Vleugelranden uitgefneden of getand hebben, weinig plaats heeft; gelyk zulks in den Geöogden- * Gehakkelden- ** en Linden-Pylstaart, † blykbaar is. Men vindt deze te Coromandel, en ze is getekend naar een uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

** Sph. Populi. * Sph. Ocellatus. + Sph. Tilia.

PLAAT CXXVI.

Fig. A. Cluentius. Deze Pylstaart is maar zonder eenige andere tekening. De rieure, mais sans aucun autre dessein. zuiger is zeer lang. De Wel Ed. Heer La trompe est fort longue. Mr. G. J. G. J. Schutt heeft ze uit Surinamen ont- Schutt, l'a reçu de Suriname. fangen.

Fig. B. Hippodamia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is kort. Van onder hebben de vleugelen dezelfde tekening, maar de kleuren minder levendig dan op de bovenzyde. Men heeft ze in Surinamen gevangen, en zy berust nevens de twee volgenden in de uitmuntende verzameling van den Wel Ed. Heer G. J. Schutt Med. Doctor.

Fig. C. D. Eurimedia. De bleekgeele vlakken op de vleugelen zyn eenigzints

des aîles découpées ou dentelées; chose évidemment claire dans le Sphinx le demi Paon. ‡ Le Sphinx à aîles dentelées ‡‡ & le Sphinx du Tilleul 1. Cette espece se trouve à la Côte de Coromandel. & il est représenté d'après celui du Cabines de Son Excellence Mr. le Baron Rengers. ‡ Sph. Ocellatus. ‡‡ Sph. Populi. ‡ Sph. Tiliœ.

CXXI. PLANCHE

Fig. A. Cluentius. Ce Sphinx est la het Wyfje van dien, welke reeds op Femelle de celui que nous avons déjà re-Plaat LXXVIII. Fig. B. is afgebeeld. presente sur la Planche LXXVIII. Fig. Van onder zyn de vleugelen in de grond- B. En dessous le fond des aîles est le kleur gelyk aan de bovenzyde derzelven, même avec celui de leur surface supé-

> Fig. B. Hippodamia. Les antennes de cette Phalène sont plumacées; la trompe est courte. En dessous les aîles ont le même dessein, mais les couleurs y sont moins vives que sur le dessius. prise à Suriname, & elle se trouve avec les deux suivantes dans la riche Collection de Mr. G. J. Schutt, Docteur en Medécine.

Fig. C. D. Eurimedia. Les taches d'un jeaune pâle des aîles sont un pers

doorschynend, en de witte stippen aan de onderranden derzelven by Fig. D. min of meer blinkende. Zy behooren onder de vierpootigen, en wegens de langwerpige vleugelen, onder de zogenaamde Parnas-Kapellen (*Pap. Heliconii*). Zy is uit *Surinamen*.

Fig. E. Crocos. Deze Nagt-Kapel heeft gepluimde sprieten en een korten zuiger. Van onder is het lyf met de vier agterste pooten, wit; en de vleugelen bleekroozen roodkleurig. Men vindt ze in Surinamen.

Fig. F. Daunus. De witte vlakken en stippen op de vleugelen van deze eenkleurige Dikkop-Kapel (Pap. Pleb. Urbicol.) zyn eenigzints doorschynend. Op den binnengrond ziet men een donker paarschen weerschyn. Zy word in Surinamen gevonden, en berust in de verzameling van den Wel Ed. Heer P. Boddaert.

PLAAT CXXVII.

Fig. A. B. Melanippus. Deze Kapel heeft de voorste pooten kort en zonder nagels, gelyk de reeds afgebeelden * en alle my bekende soorten der kaneelkleurige Kapellen. Zy wordt op de Kust van Coromandel, te Tranquebar gevonden.

* Zie Plaat XXVIII. Fig. B. C. en

transparentes, & les points blancs de leurs bords inférieurs, de la Fig. D. plus ou moins luisants. Elle est têtrapede & appartient, par les aîles oblongues, au rang des Muses (Pap. Heliconii). Elle est de Suriname.


Fig. E. Crocos. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe courte. En-dessous, le corps & les quatres pattes postérieures sont blanches, & les aîles sont d'un rouge de roses pâle. On les trouve à Suriname.

Fig. F. Daunus. Les taches blanches & les points blancs des aîles de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urbicol) dont les deux surfaces ont la même couleur, sont un peutransparentes. On voit sur le fond brun un chatoyant violet pâle. On les trouve à Suriname, & celui-ci est de la collection de Monsieur P. Boddaert.

PLANCHE CXXVII.

Fig. A. B. Melanippus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & sans onglets, comme celles que nous avons déja représentés * & toutes les Especes des Papillons de couleur de Canelle qui me sont connues. On le trouve à la Côte de Coromandel, à Tranquebar.

* Voyez la Planche XXVIII. Fig. B. C.



•		
	•	
	•	

	,				
•					
					·
= p					
			·		
		4			
			•		



Plaat CXVIII. Fig. B. C.

Fig. C. D. Mulciber. De bovenvleugels van deze Kapel, hebben een heerlyken blaauwen weerschyn, welke naar maate men dezelve keert, zig licht of donker blaauw vertoont. Zy behoort onder de vierpootigen, en bonte of sierlyke Danaüs-Kapellen. Zy wordt in China en Coromandel gevonden.

Fig. E. F. Alcippus. Deze Kapel heeft, wat de Tekening betreft, veele overeenkomft met den Chrysippus welke op Plaat CXVIII. Fig. B. C. is afgebeeld, alleen onderscheid ze zig in de aan beide zyden witgevlakte ondervleugels. Men vindtze op de Kust van Guiné, aan de Sierra Leona.

PLAAT CXXVIII.

Fig. A. Polidorus. De onderzyde der vleugelen van deze Pagie, is gelyk hier de Afbeelding dezelve van boven vertoont. Aan de Borst der Kapel zyn wederzijds vier Carmouzyn-roode hairige vlakken geplaatst; waardoor zy onder de Trojaansche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus behoort. Wy hebben dit Mannetje uit het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers afgebeeld. En de volgende Fig. B. is naar een Wysje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer P. Luchtmans. II. Deet.

C. & la Planche CXVIII. Fig. B. C.

PAPILLONS EXOTIQUES.

Fig. C. D. Mulciber. Les aîles supérieures de ce Papillon ont un très excellent chatoyant bleu, qui change en bleu clair ou obscur, selon la position qu'on lui donne. Il est tétrapede & appartient aux Danaïdes bigarrées. On le trouve en Chine & à Coromandel.

Fig. E. F. Alcippus. Ce Papillon, quant au dessein, a beaucoup de ressemblance avec le Chrysippus, qui est représenté sur la Planche CXVIII. Fig. B. C. Il se distingue seulement par les alles inférieures dont les deux surfaces sont tachetées de blanc. On le trouve à la Côte de Guinée, à la Sierre Leona.

PLANCHE CXXVIII.

Fig. A. Polidorus. Le dessous des aîles de ce Page est comme la Figure le représente ici. Il y a sur la poitrine du Papillon, de l'un & de l'autre coté, quatre taches d'un rouge Cramoisi & farineuses; ce qui le fait ranger parmi les
Chevaliers Troyens de Mr. Linnæus.
Nous avons représenté ce Mâle d'après
celui du Cabinet de son Excellence Mr.
le Baron Rengers, & la Figure suivante B. représente une Femelle de la Collection de Mr. P. Luchtmans. Le dessein
des taches blanches & rouges des aîles

 \mathbf{H}

te Tranquebar, Bengalen en Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 10. Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 33. Fig. 2.

Fig. C. Anubus. De zuiger van dezen Pylstaart is lang. Het lyf en de vleugelen, van onder, hebben een geelagtige graauwe kleur. De Hooggeleerde Heer P. Luchtmans heeft my dezen ter aftekeninge geleend, en ik ben onlangs verzekerd geworden, dat zig deze foort in Surinamen onthoudt, doordien de Wel Ed. Heer IV. van der Meulen een onder meer andere fraaye Insecten sectes, de ce Païs-là. van daar heeft ontfangen.

Fig. D. Levida. De sprieten van de-


Deze heeft de Tekening der witte en roo- inférieures de ce Papillon-ci, est au desde vlakken op de ondervleugels, van bo- sus justement comme notre Figure nous le ven eveneens, zo als hier de Afbeelding montre. Il y a une variété de ces Paaanwyst. Men vindt eene verscheiden- pillons, dont les aîles inférieures sont heid van deze Kapellen, welker onder- peu ou presque point du tout à queue. vleugels weinig of byna niet gestaart zyn. On les trouve à la Côte de Coromandel, Zy worden op de Kust van Coromandel, à Tranquebar, à Bengalen & à Amboine.

> Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 10. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 23. Fig. 2.

Fig. C. Anubus. La Trompe de ce Sphinx est longue. Le Corps & les aîles ont, au-dessous, une couleur grise jeaunâtre. Mr. le Professeur P. Luchtmans m'a prêté celui-ci pour en faire le dessein, & on m'a assuré depuis peu que cette espece se trouve à Suriname, puisque Mr. W. van der Meulen, en a reçu un, parmi plusieurs autres beaux In-

Fig. D. Levida. Les antennes de cetze loodkleurige Nagt-Kapel zyn draad- te Phalêne couleur de plomb, sont filivormig; mogelyk hebben de Mannetjes formes; peut-être les Mâles les ont ils dezelven gepluimd, want deze Afbeel- plumacées; car cette Figure représente ding is naar een Wyfje. Van onder zyn une Femelle. Au-dessous les aîles sont de vleugelen van dezelfde kleur en Te- de la même couleur & du même dessein. kening. Wegens de gedaante zou men On pourroit juger de la forme qu'elle kunnen besluiten, datze uit een Span- naît d'une Chenille Arpenteuse. Elle rups voortkomt. Zy is uit Surinamen, est de Suriname & se trouve avec les trois

9		



het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Mr. le Baron Rengers. Baron Rengers.

Fig. E. Lacticinia. De Wyfjes van deze wederzyds bruine met wit gevlakte Spanrups-Kapel (Phal. Geomet.) hebben draadvormige sprieten; de zuiger is gekruld. Zy heeft eenige overeenkomst met de Phal. Tripunctaria *. Men vindt deze op de Kust van Coromandel.

* Zie Plaat XX. Fig. E.

kend. Zy wordt op de Kust van Coro- trouve à la Côte de Coromandel. mandel gevonden.

Fig. G. Aulestes. Deze aan beide zy-Plaaten hebben afgebeeld. Zy is uit Su- Fig. A. & LXIII. Il est de Suriname. rinamen.

PLAAT CXXIX.

heeft met de Europische zogenaamde de l'Europe, connu sous le nom de Pa-

en bevindt zig met de drie volgende in suivantes au Cabinet de son Excellence

Fig. E. Lacticinia. Les Femelles de cette Phalêne Arpenteuse (Phal. Geomet.) dont les deux surfaces sont brunes & tachetées de blanc, ont des antennes filiformes; la trompe est roulée. Elle ressemble en quelque sorte à la Phal. Tripunctaria *. On trouve celui-ci à la Côte de Coromandel.

* Voyez la Planche XX. Fig. E.

Fig. F. Carinenta. Van onder zyn + Fig. F. Carinenta. Le dessous des aîde vleugelen dezer Spanrups-Kapel wei- les de cette Phalêne Arpenteuse differe nig van de bovenzyde derzelven onder- peu de leur surface supérieure. Les anscheiden. De sprieten van dit Wysje tennes de cette Femelle sont filisormes & zyn draadvormig, en de zuiger krultrek- la trompe en forme de spirale. On la

Fig. G. Aulestes. Ce Papillon, dont den der vleugelen eveneens gekleurde les deux surfaces des aîles ont la même Dag-Kapel behoort tot die soorten van couleur, appartient à ces Especes, dont welken wy reeds eenigen op de XLVIIIste nous avons représenté quelques-unes sur Fig. C. LVIIIste, Fig. A. en LXIIIste les Planches XLVIII. Fig. C. LVIII.

PLANCHE CXXIX.

Fig. A. B. Ecclipsis. Dus heeft de Fig. A. B. Ecclipsis. C'est le nom que Heer Linnaus deze Danaüs-Kapel ge- Mr. Linnaus a donné à cette Danaïde, noemd, welke eenige overeenkomst qui a quelque rapport avec un Papillon Citroen-Kapel (Pap. Rhamni). Zy is pillon Citron. (Pap. Rhamni). On l'a

op het Eiland Jamaika gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 107. Pap. Dan. Cand.

Fig. C. Helcita. Deze Nagt-Kapel met gepluimde sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen, van onder, niet onderscheiden in kleur noch Tekening met de bovenzyde derzelven. De Heer Linnaus heeft ze onder de ligtkleurige Danaüffen geplaatst. Mifschien dat aan de Kapel, welke zyn Ed. uit het Kabinet van Haare Majesteit de Koninginne van Zweeden heeft beschreeven, de sprieten hebben ontbrooken: 't welk ook blykt uit de Afbeelding die de Heer Car. Clerck daarvan heeft gegeven, want daar zyn de sprieten weggelaten, en maar door stippen aangewezen. Zy vallen op de Goudkust van Afrika, aan de Sierra Leona.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 94. Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 4.

Fig. D. Macaria. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder ziet men op de vleugelen dezelfde Tekening, maar de kleuren minder sterk dan op de bovenzyde. Zy is uit Surinamen en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll:

Fig. E. Juturna. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten, en een gekrul-

l'a prise à l'Île de la Jamaïque.

Linn. Syft. Nat. pag. 765. n. 107. Pap. Dan. Candid.

Fig. C. Helcita. Le dessous des aîles decette Phalêne, dont les antennes sont plumacées & dont la trompe est roulée, ne differe en couleur, ni en dessein de leur surface supérieure. Mr. Linnæus l'a rangé parmi ses Danaïdes claires. Peut-être que le Papillon dont il a donné une description, & qui se trouvoit au Cabinet de sa Majesté la Reine de Suede, n'a pas eu les Antennes, ce qui est évident de la Figure que nous en a donné Mr. C. Clerck, dans laquelle les Antennes ne se voyent pas, étant seulement indiquées par des points. On les trouve à la Côte d'or de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 94. Pap. Dan. Cand. Clerck, icon. Tab. 39. Fig. 4.

Fig. D. Macaria. Les Antennes de cette Phalêne sont filisormes & la trompe est roulée. On voit sur le dessous des aîles le même dessein, mais les couleurs y sont moins sortes que sur le dessus. Elle est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. E. Juturna. Le dessous du Corps, des pattes & des aîles de cette Phalêne



den zuiger, heeft het lyf met de pooten en de vleugelen, van onder, aschkleurig. Zy is uit Surinamen, en berust met de op deze Plaat volgende, in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer en Mr. Cornelis van Lennep, Commissaris der Stad Amsterdam. *.

Fig. F. Orodes. Van onder zyn de vleugelen van deze met draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger voorziene Nagt-Kapel, geheel effen graauw van kleur. Men heeftze in Surinamen gevonden.

PLAAT CXXX.

Fig. A. Laodamia. De bovenvleueen witten dwarsband; de agtersten zyn in de grondkleur mede bruin, met roode ronde vlakken by de gewrigten, en witten band over de bovenvleugels ten **LXXVII.** Ook gelykt zy veel op de Am-Het is eene vierpootige phinome † Kapel, welke in Surinamen wordt gewonden, en my door den Wel Ed. Heer

à Antennes filiformes & à trompe roulée, sont d'un gris de cendre. Elle est de Suriname, & se trouve, avec le suivant de cette Planche, au Cabinet de Monsieur C. van Lennep, Commissaire de la Ville d'Amsterdam *.

Fig. F. Orodes. Le dessous des aîles de cette Phalêne à Antennes filiformes & à trompe roulée, est entierement d'un gris simple. On l'a trouvée à Suriname.

PLANCHE CXXX.

Fig. A. Laodamia. Les aîles supégels zyn, van onder, donkerbruin met rieures sont au-dessous d'un brun-obscur, avec une bande transversale blanche. Les aîles postérieures sont dans le fond pareillement brunes, avec des taaan de onderranden; of behalven den ches rondes & rouges vers les jointures & vers les bords inférieurs; & outre la eenemaal gelyk aan Fig. F. op Plaat bande blanche des ailes supérieures, entierement semblables à la Figure F, de la Planche LXXVII. Il ressemble pareille: ment beaucoup à l'Amphinome +. C'est un Papillon tétrapede qui se trouve à Suri-

^{*} Deze Heer is thans Bezitter van die uitmuntende Verzameling, van wylen deszelfs Heer Broeder, den Heere J. C. Sylvius van Lennep.

^{*} Ce Monsieur là possede actuellement la riche Collection de son Frere, seu Mr. J. C. Sylvius. van Lennep.

M. Houttuin, Med. Doctor ter aftekening is geleend.

† Zie Plaat LIV. Fig. E. F.

Fig. B. C. Phætufa. Dit is een vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke in Surinamen zeer gemeen is. De Wyfjes zyn gemeenlyk bleeker van kleur, dan dit hier afgebeelde Mannetje.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 180. Pap. Nymph. Phalerat. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 17. 18. Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 2. Fig. 1.

Fig. D. Areos. Deze Nagt-Kapel, met gepluimde sprieten en een gekrulden zuiger, heeft van boven op de vleugelen een paarschen weerschyn, en van onder dezelfde Tekening; maar de grond is aschkleurig. Zy is van het Eiland St. Thomas in de Westindiën, en berust met de twee volgende soorten in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. Lepida. Deze heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger; van onder dezelfde Tekening en kleuren, behalven dat de groene band over

name & que Mr. M. Houttuin, Docteur en Medécine, m'a prêté pour le faire dessiner.

† Voyez la Planche LIV. Fig. E. F.


Fig. B. C. Phœtusa. Cest une Nimphe aveugle à quatre pieds, qui est fort commune à Suriname. Les Femelles sont ordinairement d'une couleur plus pâle, que le Mâle dont nous donnons ici la Figure.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 180. Nymph. Phalerat. Seba, Tom. IV. Tab. 28. Fig. 17. 18. Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 2. Fig. 1.

Fig. D. Areos. Il y a sur le dessus des aîles de cette Phaléne à antennes plumacées & à trompe roulée, un chatoyant violet, & au-dessous le même dessein; mais le fond est couleur de cendre. Elle est de l'Île de St. Thomas aux Indes Occidentales, & se trouve avec les deux Especes suivantes dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. Lepida. Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Audessous se voit le même dessein & les mêmes couleurs, outre que la bande verte

		3		
			·.	
	0			



Zy is uit Bengalen.

Fig. F. G. Tolumnia. De blaauwe vlak op de agtervleugels is glanzig, en op den overigen bruinen grond heerscht een paarschen weerschyn; 't welk ook plaats heeft by Fig. G. alwaar de ligtblaauwe streepen een schoonen glans, en het overige gedeelte der vleugelen den gemelden weerschyn hebben. Het is eene vierpootige Gras-Kapel, welke onder de geöogde Nymphen behoort. Zy wordt op het Eiland St. Thomas in de Westindiën gevonden.

PLAAT CXXXI.

Fig. A. Aconyta. Deze Nagt-Kapel korten zuiger. De vleugelen zyn van onder effen bruin van kleur. De afbeelding is naar een Wyfje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer P. Luchtmans, 't welk zyn Ed. uit Bengalen had ontfangen. Ik heb Mannetjes derzelven gezien, welken de sprie-Spinners, welke in den rustenden stand, res, & les tiennent directement contre

de bovenvleugels daar meer in't geel valt. des aîles supérieures y tire plus sur le jeaune. Elle est de Bengale.

> Fig. F. G. Tolumnia. La tache bleue des aîles postérieures est luisante, & il domine sur le reste du fond brun un chatoyant violet; ce qui se voit de même dans la Figure G. où les rayes d'un bleu clair ont un beau lustre, & où le reste des aîles brille du dit chatoyant. C'est une Nimphe tétrapede, qui appartient aux Nimphes à yeux. On la trouve à l'Ile de St. Thomas, aux Indes Occidentales.

PLANCHE CXXXI.

Fig. A. Aconyta. Cette Phalêne a des heeft gepluimde sprieten, en een zeer antennes plumacées & une trompe sort courte. Les aîles sont au-dessous d'un brun simple. La Figure représente une Femelle de la Collection de Mr. le Professeur P. Luchtmans, qui l'a reçu de Bengale. Jen ai vu des Mâles; dont les antennes sont plus plumacées, & dont la couleur du corps & des aîles est d'un ten sterker gepluimd, en de kleur van jeaune brunâtre, mais celles là viennent 't Lyf, en der vleugelen, bruinagtig- de Coromandel. Elles appartiennent à geel hebben, doch die komen van Coro- ces Phalénes Fileuses, qui, lorsqu'elles mandel. Zy behooren onder die Zyde- se reposent, avancent les aîles inférieusde ondervleugels vooruitschuiven, en la place sur laquelle elles se reposent, vlak houden tegens de plaats waarop zy Eikenblad *. De Bramen-Uil. ** De Pynboom-Uil + en meer anderen.

comme celles qu'on nomme La feuille morzitten: gelyk het zogenaamde verdorde te * la minime à bande, la Crête de Cocq & plusieurs autres.

- * Phal. Quercifolia. ** Phal. Rubi. + Phal. Pini.
- * Phal. Quercifolia.
- Fig. B. Lyncida. Van onder heeft deze witte Danaüs-Kapel de randen der Zy is uit Surinavleugelen ligtbruin. men, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Lyncida. Les bords du dessous des aîles de cette Danaïde blanche sont d'un brun clair. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. Monycha. In het zelfde Kabinet bevindt zig ook deze met draadvormige sprieten, en gekrulden zuiger voorziene Nacht-Kapel. Van onder zyn de vleugelen niet onderscheiden met de boven zyde, dan dat aldaar ontbreekt die witte wollige, met vyf zwarte stippen bezette vlak aan de gewrigten der bo-Men vindtze op de Kust venvleugels. van Coromandel.

Fig. C. Monycha. Cette Phalêne à antennes filiformes & à trompe roulée, se trouve au Cabinet susmentionné. Audessous les aîles ne different de la surface supérieure, qu'en ce qu'il ne se voit point aux jointures des aîles supérieures cette tache blanche laineuse, garnie de cinq points noirs. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. D. Mineus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de schubbetjes gesierd.

Fig. D. Mineus. Les antennes de cette Phalêne sont plumacées, & la tromzuiger is zeer klein. Het lyf is als met pe est fort petite. Le corps paroit être goud-glanzige Hairtjes, en de blaauwe orné de petits poils d'un lustre doré, & vlakken op de vleugelen met dergelyke les taches bleues des aîles de petites écail-De wieken zyn les semblables. Les aîles sont très for-

zeer sterk, gelyk die van de Uil uit de Willigen, Hout-Rups. (Phal. Cossus.) Misschien komt ook deze uit eene dergelyke Rups voort, welke in het Houtgewas hun voedzel zoeken. Zy is van Batavia, en met de twee volgende in het laatstgemelde Kabinet.

Fig. E. Cleopatra. De onderzyde der vleugelen van deze geele Danaüs-Kapel, is zwavel-geel, een weinig naar het groene hellende. In het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain geboore Schmith, is nevens het Mannetje ook een Wyfje van deze Kapellen, welke laatste geheel block gool, en naast komt by de Wyfjes van de Inlandsche Citroen-Kapel (Pap. Rhamni) alleen daarvan verschillende, dat dezelve op elke vleugel, een donkergeele of oranje kleurige ronde vlak heeft, in grootte als by de hier afgebeelde op de ondervleugels te zien is. Zy worden te Smirna, en Constantinopolen gevonden: ook heeft men ze in Hongaryen ontdekt, en my is verzekerd dat er voor eenige Jaaren een in de Baronnie van Breda was gevangen.

tes, comme celles de la Phal. Cossus; peut-être celle-ci doit elle son existence à une Chenille semblable, qui cherchent leur nouriture dans le Bois. Elle est de Batavia & se trouve avec les deux suivantes au dit Cabinet.

Fig. E. Cleopatra. Le dessous des ailes de cette Danaïde jeaune, est d'un jeaune de souffre, tirant un peu sur le verd. Il y a au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Schmith, outre le Mâle, aussi une Femelle de ces Papillons, dont le dernier est entierement d'un jeaune pâle, & approche le plus la Femelle du Pap. Citron de l'Europe, tandis que la différence consiste uniquement dans une tache ronde jeaune, obscure ou couleur d'orange, qui se voit sur chaque aîle, de la grandeur de celle qui se trouve sur les aîles inférieures de notre Figure. On les trouve à Smirne, & à Constantinople. Austi les a-t-on decouvert en Hongrie, & on m'a assuré qu'on en a pris une dans la Baronnie de Breda, il y & quelques années.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 105. Pap. Dan. Cand. II. DEEL.

Linn. Syst. Nat. pag. 765. n. 105% Pap. Dan. Cand.

Fig. F. Palemon. De vleugelen en het Lyf dezer Dikkop-Kapel, (Pap. Pleb. Urbicol.) zyn by de gewrigten met donkergroene glanzige hairtjes bezet. De overige blaauwe grond-kleur heeft een donker groenagtigen weerschyn. Van onder is alles donkerblaauw, met den gemelden weerschyn. Zy komt uit Surinamen.


Fig. G. Peripheta. Deze wederzyds eveneens gekleurde Nagt-Kapel heeft gepluimde sprieten, en een zeer korten De vuilwitte vlakken op de vleugelen zyn doorschynend, en geven wegens de daardoor loopende, kleine, onregelmaatige streepjes, aan de gemelde vleugelen het aanzien als door zekere Mot-Rupsjes * (welke op de Appelen Peeren - Boomen huishouden) uitgegeten, of doorknaagde bladeren. dat ik deze Nagt-Kapel deed afbeelden, waren de vleugelen nog toegevouwen, en hier door ontdekten wy, dat het Infect in den rustenden stand, de bovenvleugels dakswyze houdt, en de ondersten vlak vooruitschuift, gelyk het hier voorgemelde verdorde Eikenblad. (Phal. De Hooggeleerde Heer Quercifolia). P: Luchtmans is de Bezitter van dit

Fig. F. Palemon. Les aîles & le corps de ce Plebeien noble (Pap. Pleb. Urbicol.) sont garnis, vers les jointures, de petits poils d'un verd-obscur & luisant. Le reste du fond-bleu est d'un chatoyant verdâtre obscur. Au-dessous tout est d'un bleu-obscur & du même chatoyant. Il vient de Suriname.

Fig. G. Peripheta. Cette Phalêne dont les deux surfaces ont la même couleur, a des antennes plumacées & une trompe fort courte. Les taches d'un blanc sale sur les aîles sont transparentes, & donnent aux dites aîles, par les petites rayes irrégulières qui les traversent, une forme semblable à des feuilles rongées par certaines Tignes * qui se tiennent sur les Pommiers & les Poiriers. Lorsque je n'avois pas encore fait dessiner ce Papillón, les aîles étoient encore pliées, & par cela nous decouvrimes, que, dans une position tranquile, cet Insecte tient les aîles supérieures en forme de toiet & avance directement les inférieures, comme la Phalêne Quercifolia, dont nous venons de faire mention. Mr. le Professeur P. Luchtmans est en possession de ce rare Insecte & il m'a zeldzaame Infect, en heeft my berigt fait savoir qu'il l'a reçu des Indes Occi-

ès	·	













dat het zelve uit de Westindiën was gedentales. komen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 37. Fig. 9. 10. & Tab. 57. Fig. 10. 11.

* Zie Naturforscher, 5de Stuk pag. 1. Tab. 1. Die Minier raupe.

Seba, Tom IV. Tab. 37. Fig. 9. 10. & Tab. 57. Fig. 10. 11.

* Voyez Naturforscher, Tom. V. p. 1. Tab. Die Minier raupe.

PLAAT CXXXII

CXXXII. PLANCHE

Fig. A. B. Laothoë. Op de ondervleugels by Fig. B. heeft deze geöogde Nymph-Kapel een paarschen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is my uit Surinamen toegezonden.

Fig. A. B. Laothoë. Il ya sur les aîles inférieures de cette Nymphe à yeux, Fig. B. un chatoyant violet. Les pieds de devant sont courts & sans onglets. On me l'a envoyé de Suriname.

Fig. C. D. Cymela. Dit vierpootig bruine geöogde Gras-Kapelletje, is berustende in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep: en is aan de Kaap de Goede Hoop gevangen.

Fig. C. D. Cymela. Cette petite Nymphe brune à yeux se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep, & a été prise aus Cap de bonne Esperance.

Fig. E. Celadon. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. Op de bovenvleugels is een donker paarsche weerschyn: en op de ondersten, als mede op het Lyf

Fig. E. Celadon. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il y a sur les aîles supérieures un chatoyant violet, & il domine sur les inférieures & sur le corps, sur la cou-

nog een groenagtigen weerschyn. Van weerschynen nog sterker gezien worden. de in het Kabinet van den Heer B. Vriends.

heerscht over de blaauwe en violet-kleur leur bleue & violette, encore un chatoyant verdâtre. Au-dessous les aîles ne onder zyn de vleugelen in kleuren noch different ni en couleur ni en dessein des Tekening niet onderscheiden met de bo- surfaces supérieures, qu'en ce que lesvenzyden, dan dat aldaar de gemelde dits chatoyans s'y voyent plus clairement. Elle est de Suriname & se trouve avec la Zy is uit Surinamen en met de volgen- suivante au Cabinet de Mr. B. Vriends.

Fig. F. Drancus. Deze Pylstaart heeft genaamde Echte Pylstaarten. Zy is uit des Indes Orientales. de Oostindiën.

Fig. F. Drancus. Ce Sphinx a une een langen opgerolden zuiger, en be- trompe longue roulée & appartient à la hoort onder de tweede afdeeling, of zo- section ou Sphinx vrais. Il est

		·
•	· .	




PLANCHE CXXXIII.

Fig. A. B. Constantia. Deze geoögde Nimph-Kapel heeft eenige overeenkomst met de Pap. Leda; maar verschilt merkelyk in grootte met dezelve, ook loopt de geelagtige vlak byna over de geheele breedte der bovenvleugels, daar die zig in de laatstgenoemde maar by de Tippen, alwaar de oogswyze vlakjes op de gemelde vleugels geplaatst zyn, bepaalt. De voorste pooten, (hoewel byna zo lang als de vier agtersten,) zyn stomp en Zy · is afgebeeld naar zonder nagels. eene, welke in het Kabinet van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere PRINCE VAN ORANGE EN NASSAU, uit de Molukkische Eilanden was gezonden.

Fig. C. Geminia. De Heer Clerck, heeft deze Spanrups-Kapel onder de benaaming van Phal. Sambucaria afgebeeld: moogelyk om dat de gestalte der vleugelen met het zogenaamde Vlieruiltje groote overeenkomst heeft. Ook schynt de Heer Linnaus deze twee voor een zelfde soort te houden, want in de Beschryvinge van het gemelde Insect, haalt zyn Ed. de hier onder genoemde af beelding van Clerck aan. Nogthans komt het my voor, dat ze eene geheele verschillende foort is. De sprieten der Mannet-II. DEEL.

PLANCHE CXXXIII.

Fig. A. B. Constantia. Cette Nymphe à yeux a quelque ressemblance avec le Pap. Leda, mais elle en differe beaucoup par la grandeur. La tache jeaunâtre s'etend aussi presque sur toute la largeur des aîles, supérieures, au lieu que celle qui se voit sur les mêmes aîles de la derniere, ne se borne qu'à leurs pointes, là où les petites taches oeillées sont placées. Les pattes antérieures (quoique à peu près aussi longues que les quatre de derriere) sont obtuses & sans onglets. Nous la représentons d'après celle qui se trouve au Cabinet de Son Altesse Serenissi-ME, MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORAN-GE ET DE NASSAU, & qui a été envoyée des Iles Molucques.

Fig. C. Geminia. Monsieur Clerck a représenté cette Phalêne Arpenteuse fous le nom de Phal. Sambucaria. Peutêtre à cause de la grande ressemblance qu'il y a dans la forme des aîles avec celles de la Souffrée à queue. Il semble aussi que Monsieur Linnæus les estime tous les deux être de la même espece; car dans la Description dudit Insecte, il cite la Figure de Monsieur Clerck, que nous indiquerons ci-dessous. Cependant j'aime à croire que celle ci est d'une espece toutà-fait différente. Les antennes des Mâles jes zyn merkelyk gepluimd. De grond font visiblement plumacées. Le fond des der vleugelen aan beide zyden is wit. De twee bruine dwarsstreepen, welke van boven op de voorste vleugels geplaatst zyn, ontbreeken aan de onderzyde derzelven; doch voor het overige is zy daar ten eenemaal gelyk aan de bovenzyde, volgens de afbeelding. Zy wordt in Amboina gevonden, en berust in het gemelde Hoogvorstelyk Kabinet.

Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 3. 4.

Fig. D. Lactinea. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Het lyf is van onder wit met zwarte ringen. De vleugelen hebben van onder dezelfde witte kleur, alsmede den bloedrooden buitenrand aan de voorsten, en de zwarte vlakjes op de agtervleugels. Zy is van Batavia, en met de twee volgende getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. Alciphron. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen eveneens, doch de voorsten met drie zwarte stippen bezet. Zy is van de Kust van Coromandel te Trancquebar.

Fig. F. Eugenia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Parnas-Kapel, gelykt cenigermaate naar de Pap. Calliope;

deux Surfaces des aîles est blanc. deux bandes transversales brunes, placées sur le dessus des aîles de devant, ne se voyent point sur le dessous, mais pour le reste elle y est entierement conforme à la surface supérieure, d'après la Figure. Elle vient d'Amboine & se trouve au Cabinet dudit Prince.

Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 3. 4.

Fig. D. Lactinea. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & la Trompe est roulée. Le corps est blanc au-dessous avec des anneaux noirs. Les aîles ont en-dessous la même couleur blanche, comme aussi le bord extérieur d'un rouge de sang aux aîles artérieures, & les petites taches noires sur les postérieures. Elle est de Batavia & dessinée avec les deux suivantes d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence, Monsieur le Baron Rengers.

Fig. E. Alciphron. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. En-dessous les aîles sont comme en-dessus, mais les antérieures ont trois points noirs. Elle est de la Côte de Coromandel à Tranquebar.

Fig. F. Eugenia. Cette Muse dont les deux Surfaces ont la même couleur, ressemble en quelque sorte au Pap. Calliope; doch dezelve onderscheid zig het meest mais elle en differe le plus par les aîles in de zwarte en maar met één bruinroo- inferieures noires, qui n'ont qu'une seule



de vlak getekende ondervleugels. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Zy woont in *Surinamen*.

PLAAT CXXXIV.

Fig. A. Dydimaon. Van boven heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen bruin van kleur met een blaauwen weerschyn. Het is uit Surinamen, en berust met alle de overigen, op deze Plaat afgebeelden, in het ryke Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. B. Cocalus. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten en gekrulden zuiger, verschilt van de Phal. Materna, voornaamelyk in 't gemis van de zwarte ronde vlak op het midden der ondervleugels, en in de breede randen om dezelven van de gemelde kleur. Van onder zyn de voorste vleugels zwartagtig graauw met geel vermengd, en op het midden derzelve is een witte vlak; de agterste zyn gelyk aan de bovenzyde. Zy is uit Oostindiën.

. Fig. C. Amphix. Van onder zyn de vleugelen bleek-aschkleurig, met een breeden zwartbruinen rand om dezelven. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy behoort nevens Fig. B. onder de Phal. Noctuæ. Zy woont op de Kust van Coromandel.

Fig. D. E. Aconthea. Deze behoort

tache d'un brun rouge. Les pattes antérieures sont courtes, & sans onglets. Elle demeure à Suriname.

PLANCHE CXXXIV.

Fig. A. Dydimaon. Le dessus des alles de cette petite Cloporte est d'une couleur brune avec un restet bleu. Elle est de Suriname & se trouve avec tous les autres Papillons de cette Planche au riche Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Cocalus. Cette Phaléne qui a des antennes filiformes & une trompe roulée, differe de la Phal. Materna, principalement dans le défaut de la tache ronde noire fur le milieu des aîles inférieures, & des larges bords autour d'elles de la même couleur. En-dessous les aîles antérieures sont d'un minime noirâtre, mêlé de jeaune, & il y a sur leur milieu une tache blanche. Les postérieures sont conformes à la surface supérieure. Elle est des Indes Orientales.

Fig. C. Amphix. En-dessous les aîles sont d'un gris de cendre pâle, avec un bord brun-noir qui les entoure. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. Elle appartient avec la Figure B. aux Phal. Noctuæ. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. D. E. Aconthea. Celle-ci appar-K 2 onder de vierpootigen, en ongeöogde Nymph-Kapellen. Zy wordt met de volgende te *Batavia* gevonden.

Fig. F. G. Aconthea. De witte bandswyze Tekening op de beide zyden der vleugelen, doen deze Kapel wel eenigzints onderscheiden van de voorgaande Fig. D. E. doch wegens de grondtekening der vleugelen, komt het my zeer waarschynelyk voor dat zy het Wysje van de evengemelde is.

PLAAT CXXXV.

Fig. A. Remus. Het is deze Kapel of Trojaansche Ridder, welke de Heeren Linnæus en Clerck, voor het Mannetje van den Panthous * hebben opgegeven: Doch hoe veele waarschynlykheid die opgave heeft, blykt daaruit, dat deze afbeelding naar een Wysje gemaakt is, 't welk nevens het Mannetje berust in het Kabinet van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 18. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 45. Fig. 17. 18. 19. 20.

* Zie pag. 39. Pl. CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.

Fig. B. C. Octavia. De voorste pooten van deze ongeöogde Nymph-Kapel

tient aux têtrapedes & aux Nymphes aveugles. On la trouve avec la suivante à Batavia.

Fig. F. G. Aconthea. Le dessein blanc, en forme de bande, des deux surfaces des aîles, font bien differer ce Papillon en quelque sorte de la précédente, Fig. D. E; mais le fond des aîles me porte à juger avec beaucoup de vraisemblance, que c'est la Femelle du Papillon précédent.

FLANCHE CXXXV.

Fig. A. Remus. C'est ce Papillon-ci ou Chevalier Troyen que Linnæus & Clerck nous ont indiqués pour le Mâle du Panthous *. La vraisemblance de leur opinion est évidente en ce que nous avons fait cette Figure d'après une Femelle, qui se trouve avec le Mâle au Cabinet de Son Altesse Serenissime, Monseigneur le Prince d'Orange & de Nassau.

Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 17. Pap. Eq. Troj. Clerck. icon. Tab. 18. Seba, Tom. IV. Tab. 45. Fig. 17. 18. 19. 20.

* Voyez pag. 39. Planche CXXIII. Pl. CXXIV. Fig. A.

Fig. B. C. Octavia. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont cour-




		•	
	,		
•			
- 200			

	· .	
·		·
		• .



	:		
			-11



UITLANDSCHE KAPELLEN.

zyn kort en ruig, in de gedaante als kwastjes aan de borst der Kapel geplaatst, Zy is aan de Sierra Leona op de goudkust van Africa gevangen, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers.

PLAAT CXXXVI.

Fig A. Remus. De afbeelding is naar de onderzyde der vleugelen van de naaftvoorgaande Plaat. Aan de borst ontbreeken de roode hairagtige vlakken, welde zogenaamde Trojaansche Ridder-Kapellen gesteld heeft. Zy worden op de Molukkische Eilanden Ternaten en Amboina gevonden.

Fig. B. C. Amelia. Op de ondervleugels by Fig. C. heerscht een paarschagtige weerschyn. Zy behoort onder de vierpootigen, en geöogde Nymph-Kapellen. Haar woonplaats is Surinamen, en Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers.

PLAAT CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemnestra. De voorste pooten van deze ongeöogde Nymph-Kapel zyn kort en ruig; de witte vlakken op de vleugelen by Fig. B. hebben een tes & velues, appliquées contre la poitrine du Papillon, en forme de touffes. On l'a prise à la Sierra Leone, sur la Côte d'or de l'Afrique, & elle se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE CXXXVI.

Fig. A. Remus. Cette Figure représente la surface inférieure des aîles de la Planche précédente. On ne voit point à la poitrine les taches rouges en forme de ken Linnæus als een der kenmerken van cheveux dont Mr. Linnæus a fait une des marques distinctives des Chevaliers Troyens. On les trouve aux Iles Molucques. Ternate & Amboine.

Fig. B. C. Amelia. Il domine fur les aîles inférieures de la Figure C un chatoyant violet. Ce Papillon appartient aux tétrapedes & aux Nymphes aveugles. Sa demeure est à Suriname, & il se trouve zy is berustende in het Kabinet van den au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

PLANCHE CXXXVII.

Fig. A. B. Clytemnestra. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & velues; les taches blanches des aîles de la Figure. B. ont un lustre argen-IC 3

langer spatelswyze staarten heeft.

Fig. C. Asylas. De sprieten van dit aartig gestippeld Nagt-Kapelletje zyn ongepluimd, en eindigen in een haakagtig puntje, gelyk die der Pylstaarten, en Dikkop-Kapellen. De zuiger is spiraalvormig. Van onder zyn de vleugelen bleek-aschkleurig met een witagtigestreep op ieder in de lengte geplaatst. Zy is van de Kaap de goede Hoop, en bevindt zig in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. D. Alecto. De zuiger van dezen Pylstaart is lang. Van onder is de borst en het agterlyf met de pooten, van een roestagtige kleur; de vleugelen donker oranje-kleurig, en de randen derzelven ligtbruin. Zy woont in de Oostindiën op de Kust van Coromandel, en te Madras, en bevindt zig met de twee volgende in het laatstgenoemde Kabinet.

Linn. Syst. Nat. pag. 802. n. 20. Sphinx Alecto. Drury Tom. II. Tab. 27. Fig. 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. Deze Pylstaart heeft zyn, van onder, bruingeel, en de vleu- sont en-dessous d'un brun-jeaune, & les

zilveragtigen glans. De Wel Ed. Heer té. Mr. W. van der Meulen l'a recue W. van der Meulen heeft ze uit Suri. de Suriname, & me l'a prêtée pour la namen ontfangen, en my dezelve ter faire dessiner. J'ai vu encore une autre afbeelding geleend. Ik heb nog een an- dont les aîles inférieures avoient des dere gezien, welke aan de ondervleugels queues plus longues en forme de spatule.

> Fig. C. Afylas. Les Antennes de cette petite Phalêne, si joliment pointillée, ne sont pas plumacées & finissent par une petite pointe en forme de crochet, comme celles des Sphinx & des Plebeiens nobles. La trompe est en forme de spirale. Endessous les aîles sont d'un gris de cendre pâle, avec une raie blanchâtre sur cha. cune d'elles, placée au long. Elle est du Cap de Bonne Esperance & se trouve au Cabinet de Son Excellence, Mr. le Ba-1:011 Rengers.

> Fig. D. Alecto. La trompe de ce Sphinx est longue. En-dessous la Poitrine, & l'Abdomen avec les pattes sont d'une couleur de rouille; les aîles d'une couleur d'orange obscure & leurs bords d'un brun clair. Il demeure aux Indes Orientales, fur la Côte de Coromandel, & à Madras, & il se trouve avec les deux suivants au Cabinet susmentionné.

> Linn. Syft. Nat. pag. 802. n. 20. Sphinx Alecto. Drury, Tom. II. Tab. 27. Fig. 4. Alecto.

Fig. E. Chiron. Ce Sphinx a une cen langen zuiger. Het lyf met de pooten trompe longue. Le corps & les pattes



gelen donker-aschkleurig. Zy is van de ailes d'un gris de cendre obscure. Kust van Coromandel.

Fig. F. G. Apidanus. Van boven wordt in Surinamen gevonden.

PLAAT CXXXVIII.

Fig. A. B. Opis. Deze ongeoogde Nymph-Kapel heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorste kort en zonder nagels. Men vindt ze aan de Sierra Leona op de Goud-Kust van Africa.

Drury , Tom. II. Tab. 18. Fig. 5. 6. Opis.

Fig. C. D. Crithea, Dit is even gelyk de voorgaande eene vierpootige ongeöogde Nymph-Kapel, welke aan de gemelde Afrikaansche Kust huishoudt.

Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 5. 6. Crithea.

Fig. E. F. Terea. Heeft de voorste pooten kort, en ongenageld, zy behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen. De afbeelding by den Heer Drury van deze Kapel, is aan de onderzyde der vleugemet eene bruine bandswyze tekening voorzien, dan ons origineel naar 't welk wy de afbeelding ontleend hebben. Veel-

de la Côte de Coromandel.

Fig. F. G. Apidanus. Le dessus des heeft dit Schildrups-Pagetje de vleugelen aîles de cette petite Tortue sont d'un lustre donkerblaauw-glanzig. Van onder hebben bleu-obscur. Elles ont en-dessous un chadezelve een paarschagtigen weerschyn. Het toyant violet. On le trouve à Suriname.

PLANCHE CXXXVIII.

Fig. A. B. Opis. Cette Nymphe avengle n'a que quatre pattes complettes, les deux antérieures étant courtes & sans: onglets. On la trouve à la Sierra Leona, sur la Côte d'or de l'Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 5. 6. Opis.

Fig. C. D. Crithea. C'est ici une Nymphe aveugle à quatre pieds, comme la précédente, qui se trouve pareillement sur la même Côte de l'Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 16. Fig. 5. 6. Crithea.

Fig. E. F. Terea. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Elle appartient aux Nymphes à yeux. La Figure que Mr. Drury a donné de ce Papillon représente le fond de la surface len in de grondkleur bleekgeel, en minder inférieure des aîles d'un jeaune pâle & moins pourvu d'un dessein brun en forme de bandes, que celui de notre original d'après lequel nous donnons cette Figure. Peutligt is dit het uiterlyke onderscheid der être que c'est là la marque extérieure du

Sexe, want de onze is naar een Mannetje getekend. Zy woont mede aan de gemelde Sierra Leona, op de Kust van Afrika.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 3. 4. Terea.

Fig. G. H. Leodice. Deze Kapel behoort onder die vierpootige Kapellen welke de voorsten ruig, en als voelertjes aan de borst geplaatst hebben. De oogswyze vlakjes op de vleugelen, zyn ongemeen klein, egter zyn ze meest allen, ten minsten by Fig. H. met een wit stipje in 't midden voorzien, waardoor ik dezelve onder de geöogde Nymphen zoude plaatzen. Haar vaderland is op de Kust van Guinea.

PLAAT CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. De Heer Linnaus beschryft deze Pagie met korte of weinig gestaarte ondervleugels (alis subcaudatis) daar egter dezelven merkelyk lang gestaart zyn, gelyk zulks uit onze, en uit de afbeelding van den Heer Clerck blykt. Alle de blaauwe vlakken bestaan uit glanzige schubbetjes. Zy worden in Noord-Amerika, te Nieuw-York, en op het Eiland Jamaika gevonden. De Wel Ed. Heer Mr. Houttuin, Med. Doct. heest my dezelve ter afbeelding geleend.

Sexe, car notre Figure représente un Mâle. Ell reside pareillement à la ditte Sierra Leona, sur la Côte de l'Afrique.

Drury, Tom. II. Tab. 18. Fig. 3. 4. Terea.

Fig. G. H. Leodice. Celui-ci appartient aux Papillons tétrapedes, dont les pattes antérieures sont velues & appliquées contre la poitrine en forme d'Antennules. Les taches oeillées des aîles sont extraordinairement petites, cependant elles ont presque toutes, du moins dans la Figure H. un petit point au milieu, ce qui me fait resoudre à le placer parmi les Nymphes à yeux. Il demeure sur la Côte de Guinée.

PLANCHE CXXXIX.

Fig. A. B. Glaucus. Mr. Linnæus a donné la description de ce Page, dont les aîles insérieures sont courtes ou fort peu à queue (alis subcaudatis) tandis qu'elles ont des queues sort visibles, ce qui est évident par notre Figure & par celle de Mr. Clerck. Toutes les taches bleues sont composées de petites écailles luisantes. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale, à la Nouvelle-York & dans l'Isle de la Jamaïque. Mr. M. Houttuin, Dosieur en Medécine, me l'a prêté pour le faire dessiner.



- 3	1007	
		,

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 9. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 24. Fig. 3. 4.

Fig. C. Tarchon. De grondkleur en tekening der vleugelen, op de onderzyde, is meer lichtbruin dan van boven. Het is eene Nagt-Kapel met draadvormige sprieten, en een gekrulden zuiger. Zy berust met de drie volgenden in het Kabinet van den Wel Ed. Heer M. Houttuin. Haar Vaderland is Surinamen.

Fig. D. Pyrgo. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben van onder de kleur als gebrande geele Oker, en de randen der ondervleugels Zy is uit Surinazyn donkerbruin. 111012.

Fig. E. Politia. Deze wederzyds eveneens gekleurde, en aan de ondervleugels gestaarte Spanrups-Kapel, heeft draadvormige sprieten: en de zuiger is gekruld. Zy woont in Surinamen.

Fig. F. Theamis. Van boven hebben de vleugelen dezelfde blaauwe en naar het groene hellende grondkleur, maar de randen derzelven zyn zwart. Het is een zespootig Kapelletje, 't welk onder de Argusjes (Pap. Pleb. Rural.) zou kunnen geplaatst worden. Het is uit Surinamen.

Lin. Syst. Nat. pag. 746. n. 9. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 24. Fig. 3. 4.

Fig. C. Tarchon. Le fond & le dessein de la surface inférieure des aîles est d'un brun plus clair que la surface supérieure. C'est une Phalêne à antennes filiformes & à trompe roulée. se trouve avec les trois suivantes au Cabinet dudit Monsieur Houttuin. Elle demeure à Suriname.

Fig. D. Pyrgo. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & sa trompe est roulée. Les aîles ont en-dessous la couleur de l'Ochre jeaune calcinée, & les bords des aîles inférieures sont d'un brun-obscur. Elle est de Suriname.

Fig. E. Politia. Cette Phalêne arpenteuse dont les deux surfaces ont la même couleur, & dont les aîles inférieures sont à queue, a des antennes filiformes, & la trompe est roulée. Sa demeure est à Suriname.

Fig. F. Theanus. En-dessus les aîles ont le même fond bleu tirant sur le verd; mais leurs bords font noirs. C'est un petit Papillon sixpede, que l'on pourroit ranger parmi les Argus (Pap. Pleb. Rural.) Il est de Suriname.

PLAAT CXL.

Fig. A. B. Helena. Deze franie Trojaansche Ridder-Kapel, heeft de grondkleur der vleugelen donkerbruin met een paarschagtigen weerschyn. De geele vlak op beide zyden der ondervleugels is van van den Hoog Welgebooren Heer Baron Rengers berust een Mannetje, 't welk omtrent een derde gedeelte kleiner dan dit hier afgebeelde Wyfje is. Zy worden op het Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syft. Nat. pag. 747. n. 19. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 45. Fig. 9. 10. 11. en 12. Clerck, icon. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Aufonia. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig. De vleugelen wederzyds graauw paarlemoeragtig, met een bleek puperkleurigen weerschyn. Zy berust in het Kabinet van Mevrouwe 3. J. Chatelain, geb. Schmidt. Het is uit Surinamen.

Fig. D. Flegia. De grondkleur der vleugelen is wederzyds wit, met een paarlemoeragtigen glans, welke naar maate men dezelven keert, een roozenrood kleurige weerschyn aannemen. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Men zou deze met de voorgaande niet oneigen onder de Phal. Pyralides

PLANCHE CXL.

Fig. A. B. Helena. Le fond des atles de ce beau chevalier Troyen est d'un brun-obscur avec un chatoyant qui tire sur le violet. La tache jeaune des deux côtés des aîles inférieures est d'un lustre een satynagtigen glans. In het Kabinet satiné. Il y a au Cabinet de son Excellence Monsieur le Baron Rengers, un Male, qui est presque d'un tiers plus petit que la Femelle que nous représentons ici. On les trouve sur l'Ile d'Amboine.

> Linn. Syst. Nat. pag. 747. n. 19. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 45. Fig. 9. 10. 11. & 12. Clerck icon. Tab. 22. Fig. 1. 2.


> Fig. C. Ausonia. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes. Les deux côtés des aîles d'un minime nacré, avec un chatoyant violet pâle. Elle se trouve au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Schmidt. Elle est de Suriname.

Fig. D. Flegia. Le fond des deux surfaces des aîles est blanc, avec un lustre de Nacre de Perle, qui représentent un chatoyant rouge de rose, selon la position qu'on leur fait prendre. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. Il ne seroit pas fort étrange de placer celui-ci avec le précedent parmi kunnen plaatsen. Zy is uit Surinamen, les Phal. Pyralides. Il est de Suriname



		1-		,		
	•					
				•	,	
		•				
		٠.				
				•		
					•	
	*					
		•	•			
-						
					•	
			•			
	10.00					
				•		
	•			•		

	4
	۰
	-



en berust in de verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. E. F. Inaurata. Deze Bastert-Onrust heeft de sprieten eenigzins gepluimd, of eigenlyk zyn dezelven met korte hairtjes bezet. Het borststuk is aan beide zyden met groene goudglanzige vlakjes gesierd. De pooten zyn geel en pattes sont jeaunes & luisantes. glanzig; het agterlyf, van boven, heeft de vier eerste ringen groen, en de drie agtersten met blaauw glinsterend dons bezet. De geele vlak op de bovenvleugels by Fig. E, is als verguld, en de groene vlakken op alle de vleugelen by Fig. vindt ze in Surinamen.

Sultzer abgekürzte Geschichte der Insection pag. 151. Tab. 20. Fig. 4. Sphinx Ingurata.

PLAAT CXLI.

Fig. A. Hector. Het borststuk en een gedeelte van het agterlyf zyn fluweelagtig zwart. De wederzydsche zwarte grondkleur der vleugelen heeft een Indigo-kleurigen weerschyn. Van onder zyn de vleugelen in tekening gelyk aan de bovenzyde derzelven. Twee boogswyze ryen van carmozyn - roode vlakken verfieren de ondervleugels, bestaande de bovenste rye uit zeven; van welke de twee, die

& se trouve dans la collection de Monsieur le Ministre E. F. Alberti.

Fig. E. F. Inaurata. Ce Sphinx-Belier a des antennes un peu plumacées, mais proprement elles sont garnies de petits poils. Ce corselet est orne de part à autre de petites taches d'un lustre doré. Les quatre premiers anneaux de l'Abdomen en-dessus, sont verts, & les trois derniers sont garnis d'un duvet bleu luisant. La tache jeaune des aîles supérieures, de la Figure E. semble être doré, E les tàches vertes de toutes les aîles de la F. hebben een diergelyken luister. Men Figure F. ont un lustre semblable. On trouve celui-ci à Suriname.

> Sultzer p. 151. Tab. 20. Fig. 4. Sphin* Inaurata.

CXLI. PLANCHE

Fig. A. Hector. Le corselet & une partie de l'Abdomen sont d'un noir de velours. Le fond des deux surfaces des ailes est d'un chatoyant couleur d'Indigo. En-dessous les aîles inférieures sont conformes à leurs surface supérieure. Deux files en forme d'Arc, de taches rouges cramoisi; font l'ornement des aîles inférieures; la premiere file est composée de sept; dont les deux qui se trouvent leplus 't naast aan den binnenrand by het lyf proche du bord inférieur près du corps, geplaatst zyn, gemeenlyk in elkander loo- s'unissent ordinairement. midden zwart, aan de zyden by de gewrigten der vleugelen, als mede het geheele agterlyf, bloedrood. Het is een Pagie, welke de Heer Linnaus onder de Trojaansche Ridder-Kapellen geplaatst heeft. Zy worden op de Kusten van Coromandel en Bengalen, als mede op het Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 2. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 28. Fig. 23. 24. Clerck icon. Tab. 33. Fig. 1. 2. Sulzer abgek. gefch. pag. 141. Tab. 12. Fig. 1. *.

* De Heer Joh. Heinrich Sulzer, Med. Doctor, gaf in 't jaar 1776. in groot Quarto, zyne Abgekürzte Geschichte der Insecten, nach dem Linnwischen System. Het Eerste Deel behelft de Beschryvinge van de in het Tweede Deel zig bevindende XXXII. geillumineerde Platen, van welke er XII. met donsvleugelige Infecten (Lepidoptera) zyn aangevuld: (namentlyk van Pl. XII. tot Pl. XXIII.) Onder dezen bevinden zig 57. afbeeldingen van Uitlandsche, zo Dag- als Nagt-Kapellen, die voor het grootste gedeelte uit een der voornaamste Hollandsche Kabinetten oorspronkelyk zyn. De Heer Sulzer maakt in het Voorberigt van het Eerste Deel eenige, Aanmerkingen over de meeste der beste Werken, welke zedert het midden dezer Eeuw over de Insecten zyn uitgekomen; onder dewelke Hy (in de Noot n.) het onze, de Eer aandoet mede te stellen. Wy

La file infepen. De onderste rye bestaat uit zes vlak- rieure est composée de six taches, qui y ken; doch welke alle aldaar, grooter zyn, font cependant toutes plus grandes que dan op de bovenzyde. De borst is in 't sur la surface supérieure. Le milieu de la poitrine est noir, mais les côtés versles jointures des aîles, de même que l'Abdomen entier, sont d'un rouge de sang. C'est un Page que Monsieur Linnæus a rangé parmi les Chevaliers Troyens. On les trouve sur les côtes de Coromandel & de Bengalen, comme aussi sur l'Ile d'Amboine.

> Linn. Syft. Nat. pag. 745. n. 2. Pap. Eq. Trojan. Seba Tom. IV. Tab. 28. Fig. 23. 24. Clerck icon. Tab. 33. Fig. 1. 2. Sulzer pag. 141. Tab. 12. Fig. 1. *.

> * Monfiuer Joh. Heinrich Sulzer , Docteur en Medécine, publia en 1776. grand in 4to, ses. Abgekürzte Geschichte der Insecten, nach dem Linnwischen, System. La premiere Partie contient la description des XXXII. Planches enluminées qui se trouvent dans la seconde Partie, dont XII. sont remplies d'Insectes à aîles farineuses (Le. pidoptera) savoir depuis la Planche XII. jusqu'à la XXIII. Il se trouve parmi ceux-là 57. Figures de Papillons exotiques, tant Papillons que Phalenes, qui pour la plus grande partie sont sortis d'un des Cabinets les plus renommés de la Hôllande. Monsieur Sulzer à trouvé à propos de placer dans l'Avis de sa Premiere Partie quelques remarques sur la plus grande partie des meilleurs Ouvrages, sur les Insectes, qui ont paru depuis le milieu de ce siecle. Parmi lesquels il nous fait l'honneur de ranger le notre, dans la

Fig. B. Panimon. Van deze Pagies vindt men eenige verscheidenheden, wel-

zyn hier voor aan zyn Ed. den schuldigen Dank verpligt, en zeggen, dat de poogingen welke de Hr. Doctor heeft gelieven te neemen om aan de Insectologic meerder licht by te zetten, altoos zeer hoog te schatten zyn. Egter hebben wy met zyn Ed. teffens (volgens pag. 13. in gem. Voorberigt) gewenscht, dat wy in plaats van zo veele Uitlandsche; meerder Zwitzersche of andere Europische, en wel nog onafgebeelde Insecten, in zyn Werk mogten hebben gevonden, 't welk aan alle Liefhebbers in 't algemeen, en aan de Kenners in 't byzonder, niet alleen meer behaaglyk zoude zyn geweest, maar ook tessens diergelyke Boeken minder kostbaar zoude maken. Voor 't overige kunnen wy den Hr. Sulzer verzekeren. (1) dat wy van het door ons vastgestelde Plan, ten opzigte der schikkinge van de Kapellen op de Plaaten, wegens gegronde redenen, † niet zullen afgaan, maar in de kortheid der Beschryving van ieder Insect, en met zo veel mogelyke getrouwe aanwyzingen der landen en plaatzen van waar dezelven komen, of gevonden worden, zullen blyven voortgaan, waarna zyn Ed. deszelfs opgaven voor een groot gedeelte zoude kunnen verbeteren. (2) Geven wy aan het werk van den Hr. Doctor de volle waarde, latende het zelve aan den Toets van alle waare Kenners over, in hoe verre, de daar in zynde Plaaten naar de kunst geëtst zyn, en de afzetting der kleuren, beneden het Werk van den vermaarden Rösel moeten geschat worden; maar het geen wy niet zonder aantemerken kunnen voorbygaan, is, dat de Hr. Sulzer in deszelfs verdeeling der geslachten van de Dag-Kapellen, by de Pap. Plebii, de woorden Larva Sapius contracta, (waarmede de Ridder Linné de gedaante der Rupsen van deze kleine Fig. B. Pammon. On trouve quelques Variétés parmi ces Pages, qui different

Note (n). Nous lui en temoignons notre reconnoissance, & disons que les peines que Monsieur le Docteur a bien voulu se donner, pour repandre plus de lumiere sur l'Insectologie, méritent à tous éxards l'Estime du Public. Cependant nous eussions souhaité avec lui (d'après la pag. 13. dudis Avis) qu'aulieu de tant de Papillons Exotiques. il nous eut donné dans son Ouvrage plus d'Insectes de la Suisse ou de l'Europe, qui n'ont pas encore été représentés; chose qui généralement auroit éte plus goûtée des Amateurs, & qui en particulier auroit plû davantage aux Connoisseurs, outre que cela rendroit la possession de pareils livres moins conteufe. - Au reste nous assurons à Monsieur Sulzer (i) que nous ne nous detournerons point du plan que nous avons formé d'avance, à l'égard de l'arrangement des Papillons sur les Planches. pour des raisons bien fondées +; mais que nous. continuerons de donner, tout court, la description de chaque Insecte, en indiquant avec toute la fidélité possible, les Païs & les Lieux d'où ils viennent; d'après quoi il pourroit, à beaucoup d'égards, rendre ses Indices plus exacts (2). Nous donnons à l'ouvrage du Docteur l'estime qui lui est du, tandis que nous laissons à tous les véritables connoisseurs à juger de l'execution des Planches, & des enluminations des couleurs; combien il est inférieur à celui du celebre Rosel. Mais ce que nous ne saurions passer sous silence, c'est que Monsieur Sulzer; dans la division des Familles des Papillons, traduit les mots. . . Larva Sæpiuss Contracta, (qui se trouvent auprès les Pap. Plebii. & par lesquels Monsieur Linnaus veut indiquer là forme des chenilles de ces petits Papillons) de là: maniere suivante, ,, Oft Spannenmesser, ce qui veut dire fouvent Arpenteuse ou Geometræ, tandiza

† Zie Voorrede Bladz. 8. 9,.

ke aan de onderzyde der vleugelen min of meer met elkander in vlakken verschillen. Sommige hebben op de gemelde zyde, op de agtervleugels, binnen de witte randvlakken, agt roestkleurige halve maanswyze vlakjes. Anderen hebben behalven deze vlakjes nog naby den uit groote witte vlakken bestaanden band, dwars over de agtervleugels, eenige blaauwe glinsterende vlakjes. Ook vindt men anderen, welken de laatstgemelde vleugels weinig of maar stomp gestaart hebben. Deze hier afgebeelde is wederzyds eveneens getekend. Zy woonen in *China*, op de Kusten van *Coromandel* en *Bengalen*.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 8. Pap. Eq. Trojan. Seba Schatk. Tom.

Kapellen wil te kennen geven,) dus vertaalt: , Oft Spannenmesser, 't welk zeggen wil, vecltyds Spannenmeeters, Spanrupsen, of Landmeeters (Geometræ), daar egter de gemelde woorden van den Ridder eenen geheel anderen zin te kennen geven, en eigentlyk willen zeggen: ,, De Rups veelal kort of ingedrongen, " en het is hierom dat men deze Rupfen wegens hunne gedaante Schildpadjes, Schild-Rupsen, of ook wel Pissebedjes noemt. Wy meenden in 't eerst dat de gemelde woorden ... Oft Spannenmesser" onder de Drukfeilen moesten gesteld worden, doch wy vinden dezelven niet alleen op pag. 134. maar ook op pag. 141. 't welk dan te kennen geeft dat de Hr. Sulzer schynt te gelooven, dat onder de Dag-Kapellen, en wel onder het geslacht der Plebii eenigen gevonden worden, welke uit Spanrupfen voortkomen, waarlyk iets nieuws, 't geen egter nog eerst nader dient bewezen te worden.

tant soit peu dans les taches de la surface inférieure des aîles. Il y en a qui ont sur la ditte surface, sur les aîles postérieures, dans les taches blanches des bords, buit petites taches rouillées, en forme de demi-lunes. D'autres qui, outre ces petites taches, ont encore près de la Bande de grandes taches blanches, au travers des âs les postérieures, quelques petites taches bleues luisantes. On trouve pareillement d'autres, dont les dittes aîles sont fort peu, ou obtusement à queue. Les deux surfaces de notre Figure ont le même dessein. On les trouve en Chine, sur la Côte de Coromandel & à Bengalen.

Linn. Syft. Nat. pag. 746. n. 3. Pap. Eq. Trojan, Seba. Tom. IV. Tab. 27.

que les paroles du Chevalier Linnæus ont un fens tout à fait different; & signifient proprement: "
La chenille ordinairement courte & c'est à cause de cela qu'on nomme ces fortes de chenilles; en vertu de leur forme, Schildpadjes, des Tortues ou Cloportes. A la première vue nous crumes que les mots:, Ost Spannenmesser "apartenoient au nombre des fautes d'Impresson; mais nous les trouvons non-seulement sur la pag. 134. mais aussi sur la pag. 141. ce qui donne à connoître que Monsseur Sulzer semble croire que parmi les Papillons, & même parmi la Famille des Plebii, il se trouve quelques-uns qui doivent leur origine à des Chenilles Arpenteuses. En-esset quelque chose de nouveux que Monsseur, que Monsseur Sulzer aura peine de prouveux.

. ;

IV. Tab. 27. Fig. 21. 22. Tab. 34. Fig. 23. 24, Tab. 41. Fig. 11. 12. D'Aubenton Pl. enl. 43. Fig. 3. l'Echarpe. Clerck icon. Tab. 14. Fig. 2. Kleman, Beitr. Tab. 2. Fig. 2. 3.

Fig. C. D. Trite. Is eene Danaus-Kapel, welke in Surinamen wordt ge-· · vonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 763. n. 97. Pap. Dan. Candid. Seba Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 17. 18.

Fig. E. Alcineone. De vleugelen van deeze geele en witte Danaus-Kapel zyn wederzyds van de zelfde kleuren. De schubbetjes op de vleugelen, welken de breede witte randen aan dezelven uitmaken, zyn niet gelyk de geelen in de lengte geplaatst, te weten van de gewrichten af, en zo vervolgens tot naar de tippen en randen; maar leggen dwars van de buiten, naar de onderranden. Deze byzondere legging der gemelde schubbetjes kan men met het bloote oog gewaar worden, daar de afscheiding der geele van de witte kleur begint. Men trouve sur la Côte de Coromandel & à vindze op de Kust van Coromandel, en ook in Surinamen.

Fig. F. Monusta. De onderzyde der vleugelen van deze witte Danaus-Kapel rieure des aîles de cette Danaide blanche is niet onderscheiden met de bovenzy- ne differe point de la surface opposée. On de derzelven. Zy wordt in China ge- la trouve en Chine. vonden.

Fig. 21. 22. Tab. 34. Fig. 23. 24. Tab. 41. Fig. 11. 12. d'Aubenton. Pl. Enl. 43. Fig. 3. l'Echarpe. Clerck, icon, Tab. 14. Fig. 2. 3. Kleman, Beitr. Tab. 2. Fig. 2. 3.

Fig. C. D. Trite. C'est une Danaïde jeaune, qui se trouve à Suriname.

Linn, Syst. Nat. pag. 763. n. 97. Pap. Dan. Candid. Seba Tom. IV. Tab. 23. Fig. 17. 18.

Fig. E. Alcmeone. Les aîles de cette Danaide jeaune & blanche ont au-dessus la même couleur qu'en-dessous. Les petites écailles sur les alles, qui composent leurs larges bords blancs, ne sont point placées en long comme les jeaunes, savoir depuis les jointures vers les pointes & les bords; mais elles ont une position transversale, depuis les bords extérieurs vers les bords inférieurs. Cette position différente des dittes écailles s'apperçoit à l'oeil, là où commence la separation de la couleur jeaune d'avec la blanche. On la Suriname.

Fig. F. Monusta. La surface infé-

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 80. Pap. Dan. Candid. Kleman. Beitr. Tab. 3. Fig. 3.

PLAAT CXLII.

Fig. A. B. Menestheus. De hemels-blaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugelen van deze Pagie of gestaarte Kapel, bestaan uit glinsterende schubbetjes. Zy behoort onder de grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De afbeelding is naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers. Men vindt ze op de Goud-Kust van Africa aan de Sierra Leona.

Drury Tom. II. Tab. 19. Fig. 1. 2. Menestheus.

Fig. C. Cresus. De sprieten van deze sierlyke Nagt-Kapel, zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De witte vlakjes op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen van dezelfde kleur als de agterste van boven. Zy is uit de Berbices, en berust met de eerstvolgende in het laatstgemelde uitmuntende Kabinet.

Fig. D. Hypanis. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige sprieten. Vanonder verschillen de vleugelen in tekening, maar de kleur is in het algemeen bleeker

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 80. Pap. Dan. Candid. Kleman Tab. 3. Fig. 3.

PLANCHE CXLII.

Fig. A. B. Menestheus. Les taches d'un bleu-celeste sur les deux surfaces des aîles inferieures de ce Page ou Papillon à queue, sont composées de petites Ecailles luisantes. Il appartient au Chevaliers Grecs de Monsieur Linnæus. Notre Figure représente un Original du Cabinet de Monsseur A. Gevers. On le trouve sur la Côte d'Or de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Drury, Tom. II. Tab. 19. Fig. 1. 2. Menestheus.

Fig. C. Cress. Les antennes de cette très belle Phaléne sont filiformes & la trompe est roulée. Les petites taches blanches des aîles supérieures ont un lustre argenté. En-dessous les aîles ont la même couleur des postérieures en-dessus. Elle est des Berbices, & se trouve avec le Papillon qui suit immédiatement, au riche Cabinet dont nous venons de faire mention.

Fig. D. Hypanus. Cette Tortue a des antennes filiformes. En-dessous les aîles ne disserent point en dessein de la surface supériere, en couleur est



•					
@					
- 1					
				•	
•					
				·	
	1500				
•	7062				
	7566				
	775	BATT AV			
			17		
	- 7				
		I = -1			
			-		

dan de bovenzyde. Zy is uit Surina-

Fig. E. Gorgon. Deze Pylstaart heeft een langen gekrulden zuiger. Van onder zyn de vleugelen bruinagtig geel, met een mengeling van donkerbruine bandswyze vlakken. De Mannetjes hebben een breeder hairagtig kwastje aan het agtereinde van het lyf, dan dit hier afgebeelde Wyfje, waardoor dezelve, ongeagt de uitgesneden vleugelranden, onder de zogenaamde Onrusten zoude kunnen geplaatst worden. Haar woonplaats is Surinamen. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen bezit een Mannetje en een Wyfje derzelven in zyne fraaye verzameling van Insecten.

Fig. F. Titan. De Mannetjes van deze Onrust-Pylstaarten hebben aan de punt van 't agterlyf een breed hairagtig kwastje, 't welk aan dit Wyfje ontbreekt; de zuiger is zeer lang. Van onder is het lyf wit, en de vleugelen zyn donkeraschkleurig. In 't algemeen heeft deze Onrust veele overeenkomst met den Sph. Tantalus welke op de LXVIIIste Plaat by Fig E. is afgebeeld. Deze is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en ik ben verzekerd dat zy in Surinamen worden gevonden, door dien de Wel Ed. Heer W. van der Meulen onlangs een paar derzelven onder een menigte andere zeld-H. DEEL.

généralement plus pâle. Elle est de Suriname.

Fig. E. Gorgon. Ce Spinx a une trompe longue roulée. En-dessous les aîles sont d'un jeaune brundtre, avec un melange de taches d'un brun-obscur, en forme de bandes. Les mâles ont une brosse plus large à l'Abdomen, que la Femelle que nous représentons ici, & c'est en vertu de cela, malgré les bords découpés des aîles, qu'on pourroit le placer parmi les Spinx-beliers. Sa demeure est à Suriname. Monsieur W. van der Meulen est en possession d'un Male & d'une Femelle, qui contribuent à la beauté de sa Collection d'Insectes.

Les Mâles de ces Fig. F. Titan. Spinx-beliers ont à la pointe de l'Abdomen une brosse large en sorme de cheveux, qui ne se trouve point à cette Femelle. La trompe est fort longue. Endessous le corps est blanc, & les aîles sont d'un gris de cendre obscur. Ce Sphinx a généralement beaucoup de rapport avec le Sph. Tantulus, que nous avons représenté sur la Planche LXVIII. Fig. E. — Celui-ci est dessiné d'après un Original du Cabinet de Monsieur A. Gevers, & on m'a assuré qu'on les trouve à Suriname, puisque Monsieur W. van der Meulen vient de recevoir, depuis peu parmi un nombre d'autres rares Sphinx,

zaame Pylstaarten van daar heeft ont- un couple de ceux dont nous venons de fangen.

parler, de cette Colonie.

CXLIII. PLAAT

Fig. A. Bicolora. De | sprieten der Mannetjes van deze Nagt-Kapellen zvn met korte hairtjes bezet, maar de Wyfjes hebben dezelve draadvormig. De zuiger is gekruld. De blaauwagtige streepen en vlakken op de vleugelen zyn doorschynend, en over een gedeelte der voorsten, als mede de geheele agtervleugels is een schoone blaauwe weerschyn. Van onder is het lyf wit, en de vleugelen van dezelfde kleuren als de bovenzyde. Zy is uit Surinamen.

Sulzer abgek. Gesch. pag. 161. Tab. 22. Fig. 6. Bicolora.


Fig. B. C. Eupalemon. De grondkleur der vleugelen van boven is fluweelzwart, en de geele dwarsband heeft een satynagtigen glans. Van onder ziet men op de voorste vleugels een bosje zwarte hairtjes op een geelagtigen grond, welke, wanneer de vleugelen in den rustenden stand zyn, door de agtersten bedekt worden. Het is eene vierpootige Kapel, die wegens de ongekartelde vleugelranden onder de Bonte Danaussen van den Heer Linnæus kan geplaatst worden. uit Surinamen.

PLANCHE CXLIII.

Fig. A. Bicolora. Les antennes des Mâles de ces Phalênes sont garnies d'un poil menu, mais celles des Femelles sont filiformes. La trompe est roulée. Les rayes & les taches bleues près des aîles sont transparentes, & sur une partie des antérieures, comme sur toutes les postérieures, se voit un beau chatoyant bleu. En-dessous le corps est blanc, & les aîles y ont les mêmes couleurs qu'en-dessus. Elle est de Suriname.

Sulzer pag. 161. Tab. 22. Fig. 6. Bicolara.

Fig. B. C. Eupalemon. Le fond des aîles en-dessus est d'un noir de velours, & la bande transversale jeaune est d'un lustre satiné. En-dessous se voit sur les aîles de devant une petite touffe de poils noirs sur un fond jeaunâtre, qui, lorsque les aîles sont dans une position tranquile, sont couvertes par les postérieures. C'est un Papillon tétrapede, qui peut se ranger parmi les Danaïdes bigarrées de Monsieur Linnæus, en vertu des Zy is bords non-dentelées des aîles. Il est de Suriname.



		•		
•				
	•			
				•
		•		
			•	

UITLANDSCHE KAPELLEN.

d'Aubenton planch. enlum. 68. Fig. 3. 4. Le Veloute.

De bovenzyde der Fig. D. Eryx. vleugelen van dit Schildrups-Pagetje is in 't midden schoon hemelschblaauw van kleur, en glanzig; de randen derzelven zyn zwart. Het berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer B. Vriends, en woont in Surinamen.

Fig. E. Penthea. Dit vierpootig Dag-Kapelletje heeft op de voorste vleugels, van onder, op een graauwagtigen rossen grond, eenige zwarte vlakjes welken met wit geringd zyn. De agtervleugels verschillen niet met de bovenzyde. Het is uit Surinamen, en bevind zig in de laatstgenoemde verzameling.

Fig. F. Orfa. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De vleugelen zyn dun en doorschynend. Van onder zyn dezelven wit, en de buitenranden met kleine zwarte vlakjes getekend. Zy is mede uit Su- petites taches noires. Elle est pareillerinamen en berust in het evengemelde ment de Suriname & se trouve aussi au Kabinet van den Wel Ed. Heer B. susdit Cabinet de Monsieur B. Vriends. Vriends.

Fig. G. Virbius. De witte vlakjes op de bovenvleugels van dit wederzyds eveneens - gekleurd Dikkop - Kapelletje (Pap. Pleb. Urbicol.) zyn doorschynend. Het is my uit Surinamen toegezonden.

d'Aubenton planch. enl. 68. fig. 3. 4. Le Velouté.

Fig. D. Eryx. La partie intermédiaire du dessus des aîles de cette petite Tortue est d'un très beau bleu-celeste & luisant; les bords en sont noirs. Il est du Cabinet de Monsieur B. Vriends, & sa demeure est à Suriname.

Fig. E. Penthea. Ce petit Papillon tétrapede a sur le-dessous des aîles antérieures, sur un fond roux tirant sur le minime, quelques petites taches noires, qui sont bordées de blanc. Les aîles postérieures ne différent point de la surface supérieure. Il est de Suriname & se trouve dans la collection susmentionnée.

Fig. F. Orfa. Les antennes de cette Phalène sont filisormes & la trompe est roulée. Les aîles sont minces & transparentes. En-dessous elles sont blanches Eles bords extérieures ont un dessein de

Fig. G. Virbius. Les petites taches blanches des aîles supérieures, de ce Plebeien noble, (Pap. Pleb. Urbicol.) dont les deux surfaces sont semblables, sont transparentes. On me l'a envoyé de Suriname.

PLAAT CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. Het is niet mogelyk de schoonheid en gloed der kleuren, waarmede de onderzyde der vleugelen van dit vierpootig Kapelletje is gekleurd, naar behooren aftemaalen. De zwarte zo wel als de blauwe banden veranderen, naar maate men de Kapel keert, in donker of helder blaauw, of groen met een goud en zilveragtigen glans. Het behoort onder het gezin dier Kapellen, van welke wy op Plaat CXXVIII. Fig. G. en meer voorgaande Plaaten reeds de afbeeldingen hebben gegeeven. Haar woonplaats is Surinamen.

Fig. C. D. Sicheus. De blaauwe vlak op de vleugelen by Fig. C. is fatynagtig glanzig. Het is een zogenaamd Schildrups-Pagetje, 't welk in Surinamen zeer gemeen is.

Fig. E. F. Polydecta. Deze Kapel behoort onder de vierpootige en geöogde Nymphen (Pap. Nymph. Gemmat.) Men vindze op de Kust van Coromandel te Trancquebar, en zy berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. G. H. Merione. Deze behoort onder de geöogde Nymph-Kapellen (Pap. Nymph. Phalerati) van den Heer Linneus. Zy gebruikt ook maar vier pooten om mede te loopen. Zy wordt op de Kust van Coromandel gevonden, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Mr. C. van Lennep.


PLANCHE CXLIV.

Fig. A. B. Pyretus. Il est impossible de représenter comme il faut, la beauté & le superbe lustre, dont la surface insérieure des aîles de ce petit Papillon têtrapede est ornée. Les bandes noires comme les bleues se changent, selon la position du Papillon, en bleu-obscur ou clair, ou en vert, avec un lustre doré ou argenté. Il est de la Famille de ces Papillons dont nous avons déjà donné les Figures sur la Planche CXXVIII. Fig. G. & sur plusieurs autres Planches précédentes. Sa demeure est à Suriname.

Fig. C. D. Sicheus. La tache bleue des aîles de la Figure est d'un lustre satiné. C'est un Papillon, connu sous le nom de Cloporte ou Tortue, qui est fort commun à Suriname.


Fig. E. F. Polydecta. Ce Papillon appartient aux Nymphes têtrapedes & ocillées (Pap. Nymph. Gemmat.) On le trouve fur la Côte de Coromandel à Tranquebar, & il est du Cabinet de son Excellence Monsieur le Baron Rengers.

Fig. G. H. Merione. Celui-ci appartient aux Nymphes aveulges (Pap. Nymph. Phalerat.) de Monsieur Linnæus. Il ne se sert aussi que de quatre pattes pour marcher. On le trouve sur la Côte de Coromandel, & il est du Cabinet de Monsieur C. van Lennep.



		•		
•	100			
				+
	•			
	r			
	9			
		٠		
	11			
			· •.	
			The .	
			100	
		P.C.		
,				
		·		

•	·		*	
		-		
			9	<i>:</i>



PLAAT CXLV.

Fig. A. Strix. De Mannetjes van deze Nagt-Kapellen hebben gepluimde sprieten, maar de Wyfjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, hebben dezelven borstelagtig of draadvormig; de zuiger is zeer kort, egter voor het bloote oog zigtbaar. Het lyf is met weinige hairagtige schubbetjes bedekt. De pooten zyn dik en sterk. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de bovenzyde derzelven. De gedaante van deze Nagt-Kapel, komt zeer veel overeen met de Phal. Coffus, welke in Europa zeer gemeen is, en welker Rups zig in den Willigen Boom onthoudt; en wegens deze overeenkomst zou men mogen besluiten, dat de Rups, uit welke de hier afgebeelde Kapel voortkomt, even gelyk de gemelde eene Hout-Rups is: dus zou dan dezelve onder de Zyde - Spinners, (Phal. Bombyces) behooren, en niet by de Bende alwaar de Heer Linnæus ze geplaatst heeft, namenlyk onder deszelfs Phal. Noctuæ, welke draadvormige sprieten, en geen zigtbaren zuiger hebben.

De afbeelding is naar een uit het Kabinet van Zyne Doorlugtige Hoogheid Den Heere Prince van Oranje en Nassau. Zy is van Amboina; maar zy worden ook op het Eiland Java, te Batavia, en aan de Noord-Ooftkust van dit gemel-II. Deel.

PLANCHE CXLV.

Fig. A. Strix. Les Mâles de ces Phalênes ont des antennes plumacées, mais les Femelles, d'après lesquelles cette figure est faite, les ont en forme de brosses, ou filiformes; la trompe est fort courte, mais cependant visible à l'œil. Le cort est couvert de peu de petites écaia farineuses; les pattes sont épaisses fortes. En-dessous les aîles sont entierement semblables à leur surface supérieure. La forme de cette Phalêne ressemble fort bien à la Phal. Cossus, qui est fort commune en Europe, & dont la Chenille se loge sur le Saule; & d'après cette ressemblance on pourroit conclure que la chenille, à la quelle notre Phalêne doit son Existence, comme celui dont nous venons de parler est une Chenilledu bois -- : ainsi elle appartiendroit aux Fileuses (Phal. Bombyces) & non point à cette Famelle où Mr. Linnæus l'a placée, savoir parmi ses Phal. Noctuæ, qui ont des antennes filiformes & une trompe invisible.

Notre Figure représente un original du Cabinet de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange & de Nassau.

Elle est d'Amboine; mais on les trouve aussi sur l'Isle de Java, à Batavia & N de Eiland, te Samarang gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 833. n. 82. Phal. Noct. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 39. Fig. 13. 14. Tab. 57. Fig. 8.9. Clerck, icon. Tab. 51. Fig. 1. 2.

Fig. B. C. Penthesilea. Deze fraaye Kapel behoort onder de vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapellen. Zy is te Batavia gevangen en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. D. E. Harpalyce. De blaauwe vlakken op den bruinen grond der vleugelen, hebben een Purperkleurigen weerfchyn. Het is eene vierpootige Kapel, welke onder de ongeöogde Nimphen kan geplaatst worden. Zy word op de Goudkust van Afrika by de Sierra Leona gevonden, en berust in het laatstgenoemde Kabinet.

PLAAT CXLVI.

Fig. A. Paphia. Van dezen Spiegeldrager vind men eenige verscheidenheden, gelyk op de volgende Plaat by Fig. A. B. is aangewezen. De sprieten zyn in beide Sexe sterk gepluimd of kamvormig, de zuiger is zeer klein; de langwerpigronde witte vlakken op de vleugelen zyn hoornagtig doorschynend. Van onder

& à la Côte Nord-Est de cette Isle, à Samarang.


Linn. Syft. Nat. pag. 833. n. 82. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 13. 14. Tab. 57. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 51. Fig. 1. 2.

Fig. A. B. Penthesilea. Ce beau Papillon appartient aux tétrapedes & parmi les Nymphes aveugles. Il est pris à Batavia & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. D. E. Harpalyce. Les taches bleues sur le fond brun des aîles ont un chatoyant couleur de pourpre. C'est un Papillon tétrapede, qui peut se ranger parmi les Nymphes aveugles. trouve sur la Côte d'or de l'Afrique, à la Sierra Leone, & il est du Cabinet susmentionné.

CXLVI. PLANCHE

Fig. A. Paphia. On trouve quelques variétés de ce Porte-Miroir, comme on l'indique sur la Planche suivante, Fig. A. B. Les antennes des deux Sexes sont fortement plumacées ou à peigne; la trompe est fort petite; les taches oblongues blanches sur les aîles sont cornées transparentes. En-dessous les aîles reszyn de vleugelen in tekening gelyk aan semblent dans le dessein à la Fig. B. sur



·		·	

Fig. B. op de naastvolgende Plaat: maar de grondkleur is in dezen geelagtig graauw, of byna gelyk de onderranden van boven. Zy worden op de Kusten van Coromandel en Bengalen, en op het Eiland Amboina gevonden. Zy berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Infecten in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers.

Linn. Syst. Nat. pag. 809. n. 4. Phal. Attac. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 25. Fig. 8. 9.

Fig. B. Ammon. Dit wederzyds eveneens gekleurde Dag-Kapelletje, zou men op het eerste gezigt aanzien voor de Phal. Jatropharia*, maar wanneer men den Kop, het Lyf, en de geknopte sprieten betracht, dan blykt het ras, dat het eene Dag-Kapel is, welke onder de ligtkleurige Danaüssen (Pap. Dan. Cand.) van den Hr. Linnæus kan geplaatst worden. Haar woonplaats is in Surinamen.

* Zie Pl. CV. Fig. E.

Fig. C. Sperchius. De sprieten van dezen Bastert-Onrust zyn met korte hairtjes bezet; de zuiger is gekruld. De geele vlakken op de vleugelen zyn gouddiergelyke luister hebben de drie groene

la Planche suivante: mais le fond de celui-ci est d'un gris jeaunatre, ou à peu près comme les bords inférieurs au-dessus. On les trouve sur les Côtes de Coromandel & de Bengalen & fur l'Isle d'Amboine. Il est avec tous les autres Insectes de cette Planche, du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Linnæus Syst. Nat. pag. 809. n. 4. Phal. Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 25. Fig. 8. 9.

Fig. B. Ammon. Ce Papillon dont les deux surfaces sont de la même couleur, se feroit prendre à la premiere vue, pour la Phal. Jatropharia * mais lors qu'on examine la tête, le Corps, & les antennes à boutons, on apperçoit d'abord que c'est un Papillon diurne, qui peut se placer parmi les Danaides claires (Pap. Dan. Cand.) de Mr. Linnæus. Sa demeure est à Suriname.

* Voyez la Planche CV. Fig. E.

Fig. C. Sperchius. Les antennes de ce Sphinx-belier sont garnis de petits poils; la trompe est roulée. Les taches jeaunes des aîles sont d'un lustre doré, glanzig en eenigzins doorschynend. Een & tant soit peu transparentes. Les trois rayes vertes sur le corcelet ont un lustre streepen, over het Borststuk, als mede semblable; de même que les anneaux de geele met groen geschaduwde ringen jeaunes, ombrés de vert, de l'abdomen.

van het agterlyf. Van onder is 't lyf met de pooten wit, en die ring welke van boven op het agterlyf rood van kleur is, ziet men aan de eerstgemelde zyde wit, maar van de overige kleur der ringen is naauwlyks iets zigtbaar. De vleugelen zyn niet onderscheiden met de bovenzyde. Men vind nog andere Baftert-Onrusten, welker vleugelen in kleur noch vlakken met dezen niet verschillen, maar zig alleen in de kleur der Ringen aan het agterlyf onderscheiden *. Zy worden aan de Sierra Leona op de Kust van Afrika gevonden.

* Zie Pl. XIII. Fig. D.

Fig. D. E. Amphicede. Is eene vierpootige en ongeöogde Nimph-Kapel, welke op de Kust van Guinea wordt gevonden.

Fig. F. Cajus. De zuiger van dezen Pylstaart is lang; het lyf en de vleugelen zyn van onder donker aschkleurig. Zy woonen op de Kaap de goede Hoop.

Fig. G. Ceculus. Deze Onrust-Pylstaart gelykt veel naar den Sphinx Belis †, vengemelden.

En-dessous le corps avec les pattes sont blanches, & cet anneau qui en-dessus sur l'abdomen est de couleur rouge, est blanc fur la premiere surface; mais on apperçoit fort peu du reste de la couleur des anneaux. Les aîles ne different point de la surface supérieure. On trouve encore d'autres Sphinx-béliers, dont les aîles ne different, ni pour la couleur, ni pour les taches, de celui-ci, mais qui se distinguent uniquement dans la couleur des anneaux à l'abdomen *. On les trouve à la Sierra Leone, sur la Côte de l'Afrique.


* Voyez la Planche XIII. Fig. D.

C'est une Fig. D. E. Amphicede. Nymphe tétrapede & aveugle, qui se trouve à la Côte de Guinée.

Fig. F. Cajus. La trompe de ce Sphinx est longue; le corps & les aîles sont, endessous, d'un gris de cendre obscur. Ils demeurent au Cap de Bonne Espérance.

Fig. G. Ceculus. Ce Sphinx resfemble beaucoup au Sphinx Belis +, maar de geele dwarsband over de onder- mais la bande transversale des aîles invleugels, onderscheid dezen van den e- férieures constitue la différence entre eux. Van onder is de Borst En-dessous la poitrine avec une partie met een gedeelte der vleugelen aan de des aîles, vers les jointures, est de cougewrigten wit van kleur; het agterlyf leur blanche; l'abdomen d'un brun obdonkerbruin, en wederzyds met vier scur, & orné sur les deux surfaces de

,				
		•		
,				
			·	
			•	
•				



witte stippen gecierd; het overige gedeelte der vleugelen is bruin. Men vind ze in Surinamen.

quatre points blancs; le reste des aîles est brun. On le trouve à Suriname.

+ Zie Pl. XCIV. Fig. C.

† Voyez la Planche XCIV. Fig. C.

PLAAT CXLVII.

CXLVII. PLANCHE

Fig. A.B. Paphia. Deze is naar alle waarschynlykheid maar eene verscheidenheid van die op de voorgaande Plaat Fig. A. Wy hebben ze alleen wegens de verschillende grondkleuren der vleugelen doen afbeelden. Beiden zyn Wyfjes. Deze berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep, en is op de Kust van Coromandel te Trancquebar gevangen.

Fig. C. Brunnus. Dit kleine Onrust-Pylstaartje heeft een gekrulden zuiger. De ondervleugels zyn aan de buiten randen uitgesneden. Van onder is het Lyf met de vleugelen van dezelfde bruinroode kleur als de bovenzyde. Het is uit Surinamen, en beruft in het evengemelde Kabinet.

De fprieten Fig. D. Hyroglyphica. van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; de blaauwe streepen op het Lyf en de bovenvleugels zyn glanzig. Van onder hebben de vleugelen een donker graauwe kleur. vindze op het Eiland Curacao; en onze

Fig. A. B. Paphia. Celui-ci est selors toute apparence une variété de la Figure A. de la Planche précedente. Nous ne l'avons fait représenter que pour les sonds différens des aîles. Ce sont tous les deux Celui-ci se trouve au Cades femelles. binet de Mr. C. van Lennep, & on l'a pris sur la Côte de Coromandel à Tranquebar.

Fig. C. Brunnus. Ce petit Sphinxbélier a une trompe roulée. Les aîles inférieures sont vers les bords extérieurs. En-dessous le corps avec les aîles est de la même couleur rouge-brun, comme celle du-dessus. Il est de Suriname, & se trouve au Cabinet susmentionné.

Fig. D. Hyroglyphica. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée; les rayes bleues sur le corps & sur les aîles supérieures sont luisantes. En dessous les aîles ont une couleur minime obscure. On les trouve sur l'Isle de Curação; & notre Figure

 N_3

afbeelding is naar eene uit de Verzameling van den Wel Ed. Heere E. de Marre.

Fig. E. Cenis. Deze Spanrups-Kapel heeft gepluimde sprieten, en een gekrulden zuiger; het lyf en de vleugelen zyn, van onder, niet onderscheiden in kleuren met de bovenzyde. Men vindze in China. En deeze is nevens de volgende afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. F. Caffraria. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de bovenvleugels aschkleurig bruin met bleeke bandswyze vlakken, en de ondervleugels wit met een ligtbruinen rand. Zy is van de Kaap de goede Hoop.

PLAAT CXLVIII.

Fig. A. Paphia. Deze afbeelding is naar een Mannetje der op de twee naaftvoorgaande Plaaten afgebeelde Wyfjes dezer Nagt-Kapellen: in kleur komt deze het meest met die van de CXLVIste Plaat overeen. De sprieten zyn, gelyk in de meeste Mannetjes onder de Zyde-Spinners, breeder gepluimd, dan die der Wyfjes. Van onder hebben de vleugelen dezelsde kleuren als Fig. B. op de voorgaande Plaat. Zy berust in de Ver-


représente un original de la Collection de Mr. E. de Marre.

Fig. E. Cenis. Cette Arpenteuse a des antennes plumacées & une trompe roulée. Le corps & les aîles n'ont en dessous point de dissérence dans les couleurs, avec la surface supérieure. On les trouve en Chine. Et celle-ci avec la suivante sont du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. F. Caffraria. Les antennes de cette Phalène sont filiformes & la trompe est roulée. En dessous les aîles supérieures sont de couleur de cendre brune, avec des taches pâles en forme de bandes, Eles aîles inférieures sont blanches avec un bord brun-clair. Elle est du Cap de Bonne Espérance.


PLANCHE CXLVIII.

Fig. A. Paphia. Cette Figure repréfente un Mâle des Femelles de ces Phalênes qui ont été repréfentées fur les deux Planches immédiatement précédentes: en couleur celui-ci ressemble le plus à celle de la Planche CXLVI. Les Antennes sont comme dans la plus grande partie des Mâles parmi les Fileuses, plus largement plumacées que celles des Femelles. En-dessous les aîles ont les mêmes couleurs de la Figure B. Planche précédente.



		·	
•			
•			
	VIII-		
		·	
(,	
	•		
		•	
		·	·
•			

			•	
	•			
		-		



zameling van den Heer C. Stoll.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 23. Fig. 5.6. Drury, inf. Tom. II. Tab. 5. Fig. 1. Phal. Mylitta.

UITLANDSCHE KAPELLEN.

Fig. B. Picus. De zuiger van dezen fraayen Onrust-Pylstaart is lang; de vleugelen zyn glasagtig doorfchynend. Van onder is de borst wit, het agterlyf bruin, met wit gevlakt. Zy berust in de evengemelde Verzameling, en word op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. C. D. Lydia. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de vleugelen ongemeen dun en byna doorschynend. Zy behoort onder de vierpootigen, en is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heere C. van Lennep, alwaar ze uit Surinamen is aangebragt.

Fig. E. F. Lampetia. Deze vierpootige geöogde Nimph-Kapel is op het Eiland Amboina gevonden, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

PLAAT CXLIX.

Fig. A. Phalaris. Deze Pylstaart heeft de onderzyde der vleugelen byna van dezelfde kleur als van boven; maar de Tekening der blaauwagtige vlakken, en donkerbruine streepen is daar veel minder te zien. De zuiger is lang. Zy worden op de Kust van Coromandel geIl est de la Collection de Mr. C. Stoll.

Seba, Tom. IV. Tab. 23. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. II. Tab. 5. Fig. 1. Phal. Mylitta.

Fig. B. Picus. La trompe de ce beau Sphinx-bélier est longue; les aîles sont vitrées transparentes. En-dessous la poitrine est blanche, & l'abdomen brun. tacheté de blanc. Il est de la même Collection, & se trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. C. D. Lydia. Les aîles de cette Nymphe aveugle sont extraordinairement minces & presque transparentes. Elle appartient aux tétrapedes & sa Figure est empruntée du Cabinet de Mr. C. van Lennep, qui l'a reçue de Suriname.

Fig. E. F. Lampetia. Cette Nymphe tétrapede à yeux est venue de l'Isle d'Amboine, & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

PLANCHE CXLIX.

Fig. A. Phalaris. La partie inférieure des aîles de ce Sphinx est presque de la même couleur du-dessus; mais le dessein des taches bleuâtres, & des rayes brunes obscures, ne s'y apperçoit pas st fort. La trompe est longue. On le trouve à la Côte de Coromandel. Celui-cã vonden, en is ons nevens de overigen op avec les autres Figures de cette Planche

ding geleend, door den Hoog Welgeb. le Baron Rengers. Heer Baron Rengers.

Fig. B. C. Symethus. Dit zespootig Kapelletje kan wegens de eenigzins gestaarte ondervleugels onder de zogenaamde Schildrups-Pagetjes geplaatst worden. Het is in de Oostindiën gevonden.

Fig. D. Morpheus. De zuiger van dezen Pylstaart is lang. De witte stippen op de bovenvleugels hebben een zilveragtigen glans. Van onder is het lyf, de pooten, en de vleugelen aschkleurig. Aan het einde van 't agterlyf is een hairagtig kwastje, gelyk de meesten der zogenaamde Onrust-Pylstaarten. Zy is van de Kust van Coromandel.

Fig. E. Bubastus. Deze Pylstaart is mede van een langen zuiger voorzien. De wite vlak en stip op ieder bovenvleugel is zilveragtig glanzig. Van onder is het lyf, en de vleugelen donker Olyfkleurig met bruine golfswyze dwarsbanden. Zy is van de Kust van Coromandel.

Fig. F. Ancilla. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. Op de bovenvleugels heerscht op den bruinrooden grond, een blaauwagtige waassem. Van onder is het lyf, de pooten en de vleugels in de grondkleur donker geel, maar de bovenvleugels zyn aan de tippen bruin, en over

deze Plaat afgebeelde Insecten ter afbeel- sont du Cabinet de son Excellence Mr.


Fig. B. C. Symethus. Ce petit Papillon sixpede, peut se ranger, à cause des aîles inférieures, peu à queues, parmi les Tortues. On l'a trouvé aux Indes Occidentales.

Fig. D. Morpheus. La trompe de ce Sphinx est longue. Les points blancs fur les aîles supérieures ont un lustre argenté. En-dessous le corps, les pattes & les aîles sont couleur de cendre. Au bout de l'abdomen se voit une petite brosse en forme de cheveux, comme au plus grand nombre des Sphinx-Eperviers. de la Côte de Coromandel.

Fig. E. Bubastus. Ce Sphinx est pareillement pourvu d'une trompe longue. La tache blanche & le point blanc sur chaque aîle supérieure est d'un lustre argenté. En-dessous le corps & les aîles sont de couleur d'Olive obscure, avec des bandes transversales brunes ondées. Il est de la Côte de Coromandel.

Fig. F. Ancilla. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Il domine sur les aîles supérieures, sur le fond brunrouge, une rosée bleuâtre. En-dessous le corps, les pattes & les aîles, sont dans le fond d'un jeaune-obscur, mais les aîles supérieures sont brunes vers les bouts, & une bande transversale

·			
		•	
-			



het midden derzelven loopt een donkerbruine dwarsband, de ondervleugels zyn gelyk aan de bovenzyde * Zy worden op de Kust van Coromandel gevonden.

* Zie Pl. XXX. Fig. B.

Fig. G. Procus. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen in de grondkleur donkergeel met bruinagtige bandswyze vlakken. Zy is uit Surinamen.

PLAAT CL.

Fig. A. B. Nisus. Deze fraaie Dag-Kapel heeft eenige overeenkomst met die, welke op de LXXIVste Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy is getekend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en onlangs heeft Mevrouwe J. J. Chatelain geb. Smith er een onder veele andere zeldzaame Kapellen uit Amboina ontvangen.

Fig. C. Lamia. Op de bovenzyde der vleugelen van deze Dag-Kapel heerscht een blaauwe weerschyn. Van onder is de grond der vleugelen aschgraauw, en aan de buitenranden met langwerpige witagtige ringswyze vlakken gesierd: II. DEEL.

d'un brun-obscur les traverse au milieu, les aîles inférieures ressemblent à la surface supérieure.* On les trouve à la Côte de Coromandel.

* Voyez la Planche XXX. Fig. B.

Fig. G. Procus. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. En dessous le fond des aîles est d'un jeaune-obscur, avec des taches brunâtres en forme de bandes. est de Suriname.

PLANCHE CL.

Fig. A. B. Nisus. Ce beau Papillon a quelque ressemblance avec celui qui est représenté sur la Planche LXXIV. Fig. A. B. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. On l'a dessiné d'après un original du Cabinet de Mr. A. Gevers; & Madame I. I. Chatelain, née Smith en a reçu depuis peu un semblable, parmi plusieurs autres rares Papillons, d'Amboine.

Fig. C. Lamia. Il domine sur le dessus des aîles de ce Papillon, un chatoyant bleu. En-dessous le fond des aîles est d'un gris de cendre, orné aux bords extérieurs, de taches oblongues blanchâtres, en forme d'anneaux : pour le voor 't overige weinig verschillende met reste peu dissérent de la Salomé, qui est

de Salomé, welke op de XIIde Plaat Fig. H is afgebeeld. Zy is uit Surinamen en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Fig. D. Thelebas. Dit Bastert-Onrustje heeft gehairde sprieten en een gekrulden zuiger. De witte vlakken op de vleugelen zyn doorfchynend. Van onder is 't geheele lyf zwart, maar de vleugelen zyn niet onderscheiden met de boven zyde derzelven. Het is op de Kust van Bengalen gevonden, en berust thans in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor P. Luchtmans.

Fig. E. Sicheas. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Wanneer de Kapel de vleugelen in een rustenden stand houd, dan geven de bovensten, wegens de uitgesneden binnenranden, aan dezelve de gedaante van het Kroonvogeltje. (Phal. Ziczac.) Van onder zyn de bovenvleugels effenbruin, de agtersten geel, met bruine randen. Zy is uit Surinamen.


Fig. F. Medufa. De bovenzyde der vleugelen van deze Danaiis-Kapel is wit van kleur, aan de bovensten zwart gerand: en op het midden derzelven een zwarte stip. Zy is op de Kust van Ben- se à la Côte de Bengale. galen gevangen.

représentée sur la Planche XII. Fig. H. Il est de Suriname & se trouve dans la Collection de Mr. C. Stoll.

Fig. D. Thelebas. Ce petit Sphinxbélier a des antennes à cheveux, & une trompe roulée. Les taches blanches des aîles sont transparentes. En-dessous le corps entier est noir, mais les aîles ne different point de leur surface supérieure. On l'a trouvé sur la Côte de Bengale, & il se trouve maintenant dans la Collection de Mr. le Professeur P. Luchtmans.

Fig. E. Sicheas. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. Lorsque le Papillon fait reposer les aîles, alors les supérieures, en vertu des bords inférieurs découpés, lui donnent la forme de la Phalêne Ziczac. En-dessous les aîles supérieures sont d'un brun simple; les postérieures ont des bords bruns. Elle est de Surina-

Fig. F. Medusa. Le dessits des aîles de cette Danaïde est blanc, & les aîles supérieures sont bordées de noir; & sur leur millieu se voit un point noir. On l'a pri-



UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CLI.

Fig. A. B. Merope. Offchoon de randen aan de ondervleugels van deze geele Dag-Kapel merkelyk getand zyn, zo kan dezelve egter onder de ligtkleurige Danaüffen (Pap. Dan. Cand.) van den Heer Linnæus geplaatst worden; het is eene zespootige Kapel, en word op de Eilanden Java en Amboina gevonden. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers.

Fig. C. D. Lea. De blaauwe kleur op beide zyden der vleugelen is glanzig. Zy behoort onder de vierpootige en geöogde Nimph-Kapellen, welke met de twee volgende in de Berbices is gevonden, en nu beruft in het laatstgenoemde Kabinet.

Fig. E. Netrix. De sprieten van deze Spanrups-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld; wegens de lengte van het agterlyf zou men ze voor een Dag-Kapel aanzien. De witte vlak op ieder ondervleugel heeft een zilveragtigen glans. Van onder zyn de vleugelen eveneens als van boven, doch zonder die twee bruine streepjes, welken aan den binnen rand naar het midden, op de bovenvleugels geplaatst zyn.

Fig. F. Marmorata. Deze Spanrups-Kapel heeft draadvormige fprieten, en een gekrulden zuiger. Op de bovenzyPLANCHE CLI.

Fig. A. B. Merope. Quoique les bords des aîles inférieures de ce Papillon jeaune, sont visiblement dentelées, on peut pourtant le placer parmi les Danaïdes claires (Pap. Dan. Cand.) de Mr. Linnæus. C'est un Papillon à six pieds, qui se trouve aux Isles de Java & d'Amboine. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers.

Fig. C. D. Lea. La couleur bleue des deux surfaces des aîles est luisante. Il est du nombre des tétrapedes & des Nymphes à yeux, qui a été trouvée avec les deux suivans aux Berbices, & se trouve maintenant au Cabinet susmentionné.

Fig. E. Netrix. Les antennes de cette Phaléne arpenteuse sont filiformes & la trompe est roulée. d'Après la longueur de l'Abdomen on la prendroit pour un Papillon. La tache blanche sur chaque aîle inférieure a un lustre argenté. Endessous les aîles sont comme au-dessus, mais sans ces deux petites rayes brunes, qui sont placées sur les aîles supérieures, au bord inférieur, vers le milieu.

Fig. F. Marmorata. Cette Phaléne Arpenteuse a des antennes filisormes & une trompe roulée. Il se voit sur le O 2 de der vleugelen is een aartige mengeling van bleekroode, groene, en bruine kleuren. Van onder zyn de vleugelen aschkleurig met bruinagtige dwarsstreepen en stippen.

PLAAT CLIL

Fig. A. Butus. De onderzyde der bovenvleugels van dezen Pylstaart is bleek, en de ondersten donker asch-kleurig, met gryze randen. Zy worden op de Kust van Coromandel gevonden, en deze is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. B. Podalirius. Wy zouden van deze Kapel, welke in Europa zeer gemeen, en onder de benaaming van Konings-Pagie bekend is, geene afbeelding hebben gegeven: indien dezelve niet ook in twee der overige Waereld-Deelen wierd gevonden. De hier afgebeelde is te Smyrna gevangen, en berust in het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain geb. Smith; en in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep bevinden zig twee, welke uit Surinamen gebragt zyn. In kleur verschillen deze weinig en in tekening niets van de Europische, welke by $R\ddot{o}/el$ is afgebeeld.

Linn. Syst. Nat. pag. 751. n. 36.


dessus des aîles un joli melange de couleurs rouges pâles, vertes & brunes. En dessous les aîles sont couleur de cendre, avec des rayes transversales brunatres E des points de la même couleur.

PLANCHE CLII.

Fig. A. Butus. Le dessous des aîles supérieures de ce Sphinx est pâle & les aîles inférieures sont gris de cendre obscur, avec des bords gris. On les trouve à la Côte de Coromandel & celui-ci est du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. B. Podalirius. Nous n'aurions pas représenté ce Papillon, si commun en Europe, & connu sous le nom de Page du Roi, si on ne le trouvoit pas aussi dans deux autres Parties du monde. Celuici est de Smyrne & se trouve au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Smith; & au Cabinet de Mr. C. van Lennep se trouvent encore deux de Suriname. Pour la couleur ils different peu, & pour le dessein en rien de celui de l'Europe, qui aété re présenté par Rösel.

Linn. Syst. Nat. pag. 751. n. 36. Pap. Eq. Achivi. Seba Schatk. Tom. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab.



	77
·	

IV. Tab. 32. Fig. 11. 12. Röfel, inf. Tom. I. Pap. 2. Tab. 2.

Deze Nagt-Kapel Fig. C. Cynira. heeft gepluimde sprieten, en een zeer korten zuiger. Van onder zyn de vleugelen, bleek goel met een menigte van ligtbruine stippen, zonder eenige andere tekening. Zy behoort onder de Zyde-Spinners (Phal. Bomb.) welke de bovenvleugels in een rustenden stand dakswyze houden, en de ondersten vooruitsteken, gelyk de Phal. Quercifolia, en meer anderen. De Wel Eerw. Heer E. F. Alberti heeft ze uit Surinamen ontvangen.

Fig. D. E. Euriteus. De blaauwe van dit Dag-Kapelletje, zyn glanzig; zy zou met de volgende onder de zogenaamde Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis) beide in het Kabinet van den Wel Ed. Meulen & sont de Suriname. Heer W. van der Meulen, en zyn uit Surinamen.

Fig. F. G. Lisias. Deze Kapel heeft van boven op de vleugelen een blaauwen glans, en op de onderzyde derzelven een paarschen weerschyn. Men vind eene verscheidenheid, welke de laatstgemelde surface des aîles couleur de cendre. zyde der vleugelen aschkleurig hebben.

32. Fig. 11. 12. Röfel, inf. Tom. I. Pap. 2. Tab. 2.

Fig. C. Cynira. Cette Phalêne a des antennes plumacées & une trompe fort courte. En-dessous les aîles sont d'un jeaune-pale, avec une multitude de points bruns-clairs, sans aucun autre dessein. Elle appartient aux Fileuses (Phal. Bomb.) qui tiennent les aîles, lorsqu'elles se reposent, en forme de toict, & avancent les inférieures, comme la Phal. Quercifolia & plusieurs autres. Mr. le Ministre E. F. Alberti l'a reçue de Suriname.

Fig. D. E. Euriteus. Les taches bleues vlakken op de bovenzyde der vleugelen, sur le dessus des aîles de ce petit Papillon, sont luisantes. On pourroit le placer avec le suivant, parmi les Argus (Pap. Pleb. Ruralis.) Ils se trouvent tous kunnen geplaatst worden. Zy berusten les deux au Cabinet de Mr. W. van der

> Fig. F. G. Lisias. Ce Papillon a sur le dessus des aîles un lustre bleu, & sur leur dessous un chatoyant violet. On en trouve une variété qui ont la derniere

PLAAT CLIH.

Fig. A. B. Helenus. Deze Trojaanfche Ridder-Kapel of Pagie word in China gevonden; een andere, welke met deze veele overeenkomst heeft, vind men in Amboina, waarvan wy in 't vervolg de afbeelding zullen geven.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 4. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 2. Houttuin, Nat. Hist. I. D. XI. St. pag. 191. n. 4. Pl. 87. Fig. 1.

Fig. C. D. Melite. Deze behoort onder de vierpootige en Parnas-Kapellen. Zy word in Surinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 57. Pap. Helicon. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 17. Fig. 8. 9. Tab. 35. Fig. 5. 6. Clerck, icon Tab 44. Fig 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. Deze Kapel, betreft, met de Melite cenige overeenkomst heeft, is een zespootige en behoort onder de witte Danaüssen. Zvwoont in Surinamen.

PLAAT CLIV.

Fig. A. Assimilis. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening weinig of niets onderscheiden met de boven-

PLANCHE CLIII.

Fig. A. B. Helenus. Ce Chevalier Troyen ou Page se trouve en Chine: un autre qui ressemble beaucoup à celui-ci, se trouve à Amboine, dont nous donnerons la Figure dans la suite.

Linn. Syst. Nat. pag. 745. n. 4. Pap. Eq. Trojan. Clerck, icon. Tab. 13. Fig. 2. Houttuin, Tom. I. Piec. XI. p. 191. n. 4. Pl. 87. Fig. 1.


Fig. C. D. Melite. Celui-ci appartient aux tétrapedes & aux Muses. On le trouve à Suriname.


Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 57. Pap. Helicon. Seba, Tom. IV. Tab. 17. Fig. 8. 9. Tab. 35. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 44. Fig. 9. 10.

Fig. E. F. Licinia. Ce Papillon, qui, welke, wat de gedaante der ondervleugels pour ce qui concerne la forme des aîles inférieures, a quelque rapport avec le Melite, a six pieds & appartient aux Danaides blanches. Il demeure à Suriname.

CLIV. PLANCHE

Fig. A. Assimilis. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. En-dessous les alles différent peu, ou point du tout en couleur ni en dessein, de leur surface su-





	·		
		•	
		·	
	•		
•			
			•
	•	•	
		-	
	•		•

Haar woonplaats is périeure. Sa demeure est en Chine. zyde derzelven. China.

Linn. Syst. Nat. pag. 782. n. 194. Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 1. Drury, inf. Tom. I. Tab. 17. Fig. 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig; de afbeelding is naar een Wyfje, en uit de gedaante zou men mogen oordeelen, dat de Mannetjes gepluimde sprieten hebben. De zuiger is zeer kort. Het geheele lyf is met blaauwe glanzige hairtjes bedekt, en de blaauwe grondkleur der bovenvleugels is mede glanzig. Van onder hebben de vleugelen de zelfde kleur en tekening als van boven, egter zonder eenigen Waarschynlyk komt deze Uil uit eene Houtrups voort, wegens het dikke en gladde agterlyf, en de sterke vleugelen, even gelyk de Phal. Strix. en de Phal. Cossus. Haar woonplaats is op het Eiland Amboina, en de afbeelding is ontleend naar eene uit het Kabinet van Zyne Doorlugtige Hoogheid DEN HEERE PRINCE VAN ORANJE EN NAS-SAU.

Fig. C. D. Calypso. Deze afbeelding is naar het Mannetje van het by de volgende Figuuren E.F. afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaüssen (Pap. Dan. Candidi) en worden op de Kust van Guinea, aan de

Linn. Syft. Nat. pag. 782. n. 194. Pap. Nymph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 16. Fig. 1. Drury, inf. Tom. I. Tab. 17. Fig. 3. 4.

Fig. B. Hyphinoé. Les antennes de cette Phalêne sont filisormes; la Figure représente une Femelle, & on pourroit juger de la forme que les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe est fort courte. Le corps entier est couvert de petits poils bleus luisans, & le fond bleu des aîles supérieures est pareillement lui-En-dessous les aîles ont la même sant. couleur & le même dessein qu'en dessus, mais sans le moindre lustre. Peut-être que cette Phalêne nait d'une Chenille du Bois, en vertu de l'Abdomen épais & uni, & des aîles fortes, comme la Phal. Strix & la Phal. Cossus. Sa demeure est à l'Isle d'Amboine, & la Figure est empruntée du Cabinet de Son Altesse Serenissi-ME MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORAN-GE & DE NASSAU.

Fig. C. D. Calypso. Cette Figure représente le Mâle de la Femelle représentée par les Figures suivantes, E. F. Ils appartiennent aux Danaides claires. (Pap. Dan. Candid.) & se trouvent sur la Côte de Guinée, à la Sierra Leona, &

Sierra Leona, en omtrent het Hollandsche Fort Dellamina gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 3. 4.

Fig. E. F. Calypso. Deze af beelding is naar het Wyfje van de voorige Figuuren C. D.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 9. 10. Drury, inf. Tom. II. Tab. 17. Fig. 3. 4. Calypso.

PLAAT CLV.

Fig. A. B. Orion. De witte dwarsstreep en stip over de voorste vleugels, is doorschynend; aan de Mannetjes ontbreeken de bruine bandswyze vlakken, welken op de ondervleugels by Fig. B. te zien zyn. Zy behoort onder de gestaarte Dikkop-Kapellen (Pap. Pleb. Urbic.) en word in Surinamen gevonden.

Clerck, icon. Tab. 42. Fig. 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. woont in China.

Fig. E. F. Orchamus. Van alle de witagtige geele vlakken, welken op de bovenvleugels dezer Dikkop-Kapel geplaatst zyn, vind men er maar die drie kleinen naast elkander aan den buitenrand naby de tippen, welken doorschynend & dans les environs du Fort Hollandois, Dellamina.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 3.4.

Fig. E. F. Calypso. Cette Figure est d'après la Femelle des Figures precédentes C. D.

Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 9. 10. Drury, inf. Tom. II. Tab. 17. Fig. 3. 4. Calypfo.


CLV. BLANCHE

Fig. A. B. Orion. La bande transversale & la raye blanche sur les aîles antérieures, sont transparentes. Mâles n'ont point les taches brunes en forme de bandes, qui se voyent sur les ailes inférieures, Fig. B. Elle appartient aux Plebeiens nobles à queue (Pap. Pleb. Urbic.) & se trouve à Suriname.


Clerck, icon. Tab. 42. Fig. 5. 6.

Fig. C. D. Lubentina. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. Elle demeure en Chine.

Fig. E. F. Orchamus. De toutes les taches jeaunes blanchâtres, qui sont placées sur les aîles supérieures de ce Ple. bleien noble, on ne trouve que ces trois petites, au bord extérieur, près les pointes, qui sont transparentes; les autres zyn; de overige witte vlakken hebben taches blanches ont un lustre argenté. Il



•.
70.07



een zilveragtigen glans. Zy is uit Surinamen, en getekend uit het Kabinet van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

est de Suriname & dessiné du Cabinet de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

CLVI. PLAAT

Fig. A. C. Lucille. De groene kleur op een gedeelte der boven en ondervleugels by Fig. A. is glanzig, en de zwarte grondkleur van het overige gedeelte der zelven, heeft een donkergroenen weer-Het is eene vierpootige Kapel, fchyn. welke onder de ongeöogde Nimphen behoort. De Hooggeleerde Heer Profesfor P. Luchtmans heeftze van Guinea ontvangen.

Fig. B. Cyparissa. Deze afbeelding is naar het Wyfje, van het in 't Eerste Deel op Plaat XXXIX. Fig. D. E. afgebeelde Mannetje. Van boven zyn de vleugelen eveneens gekleurd als hier by Fig. A. verschillende dus daarin met het evengemelde Mannetje, dat de langwerpige vlak naby de tippen der bovenvleugels niet donkergroen, maar geelagtig gekleurd is. Zy woont aan de Goudkust van Afrika, en is my uit de laatstgemelde Verzameling ter afbeelding geleend.

Fig. D. Phorcus. De witte vlakjes op de bovenvleugels, van deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde Dikkop-Kapel, zyn doorfchynend, maar de witte vlak op ieder ondervleugel be-II. DEEL.

PLANCHE CLVI.

Fig. A. C. Lucille. La couleur verte sur une partie des aîles supérieures & inférieures, Fig. A. est luisante, & le fond noir du reste de ces aîles est d'un chatoyant vert-obscur. C'est un Papillon tetrapede, qui appartient aux Nymphes aveugles. Mr. le Professeur P. Luchtmans l'a reçu de Guinée.

Fig. B. Cyparissa. Cette Figure représente la Femelle, du Mâle que nous avons déjà représenté dans la Premiere Partie, Planche XXXIX. Fig. D. E. Endessus les aîles ont les mêmes couleurs qu'ici la Figure A. differant seulement en cela du Mâle, que la tache oblongue vers les pointes des aîles supérieures, n'est point d'une couleur vert-obscure, mais jeaunâtre. Elle demeure à la Côte d'or de l'Afrique, & m'a été prété de la Collection susmentionnée, pour la faire dessiner.

Fig. D. Phorcus. Les petites taches blanches sur les aîles supérieures de ce Plebeien noble, dont les deux surfaces des aîles ont la même couleur, sont transparentes, mais la tache blanche sur chastaat uit zilveragtige schubbetjes. Zy is met de drie volgende in Surinamen gevonden, en zy berusten alle in het Kabinet van den Heer L. Juliaans.

Fig. E. Eumelus. Deze Dikkop-Kapel heeft, gelyk de voorgaande, de witte vlakken op de bovenvleugels doorschynend. Van onder is de grondkleur der vleugelen weinig verschillende met de bovenzyde, zynde maar alleen de agterste minder donkergeel, en de zwarte aderen niet zo zigtbaar, dan op de gemelde zyde dezer vleugels.

Fig. F. Ceneus. De blaauwe vlakjes op den zwarten grond der vleugelen van dit Argus-Kapelletje (Pap. Pleb. Rural.) zyn glanzig; maar aan de onderzyde is de grondkleur ligtbruin, met bleekblaauwe of byna witte vlakjes bezet.

Fig. G. Mygdon. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen bleek-aschkleurig, zonder eenige tekening.


que aile inférieure, est un amas de petites écailles argentées. On l'a trouvé avec les trois suivans à Suriname & ils sont tous du Cabinet de Mr. L. Juliaans.

Fig. E. Eumelus. Ce Plebeien noble a comme le précédent les taches blanches des aîles supérieures transparentes. Endessous le fond des aîles differe fort peu du dessus; les postérieures étant seulement moins jeaune-obscur, & les veines noires ne sont pas si visibles que sur la ditte surface de ces aîles.

Fig. F. Ceneus. Les petites taches bleues sur le fond noir des aîles de cet Argus. (Pap. Pleb. Rural.) sont luisantes; mais sur le dessous le fond est d'un brun clair, garni de petites taches d'un bleu pâle ou presque blanches.

Fig G. Mygdon. Les antennes de cette Phalêne sont filisormes & la trompe est roulée. En-dessous les aîles sont de couleur de cendre pâle, sans aucun desfein.

•	



PLAAT CLVII.

Fig. A. B. Gambrifius. Op de VIIde Plaat Fig. A. B. is een Kapel afgebeeld *, welke met deze eenige overeenkomst heeft: egter zyn het twee van elkander verschillende soorten, 't welk genoegzaam blykt uit de onderscheiden tekening der geele en blaauw-glanzige vlakken. In het Kabinet van Mevrouwe J. J. Chatelain, geb. Smith, berust een Wyfje, 't welk van dit hier afgebeelde Mannetje in kleur en tekening niet is onderscheiden. Het is eene zespootige Kapel, welke onder de zogenaamde Grieksche Ridders van den Heer Linnaus kan geplaatst worden. Zy worden in Amboina gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. Fig. 7. 8.

* Zie I. Deel bladz. 10.

Fig. C. D. Ænippe. Deze Danaiis-Kapel schynt het Mannetje te zyn van die Kapel, welke op Plaat CV. Fig. C. D. is afgebeeld. Men vindze in China en op het Eiland Java, en zy is met de volgende getekend uit het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heer Baron Rengers.

Fig. E. F. Laodice. De groote donkerkleurige vlak aan de buitenranden der II. Deel.

PLANCHE CLVII.

Fig. A. B. Gambrisius. Nous avons représenté sur la Planche VII. Fig. A. B. un Papillon* qui a quelque rapport avec celui-ci: cependant ce sont deux especes différentes, ce qui est évident par le différent dessein des taches jeaunes & bleues luisantes. Il y a au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Smith, une Femelle, qui ne différe ni en couleur ni en dessein du Mâle que nous donnons ici. C'est un Papillon sixpede, qui peut se ranger parmi les Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. On les trouve à Amboine.

Seba, Tom. IV. Tab. 8. Fig. 7. 8.

* Voyez la I. Part. Pag. 10.

Fig. C. D. Ænippe. Cette Danaide femble être le Mâle du Papillon qui est représenté sur la Planche CV. Fig. C. D. On les trouve en Chine & sur l'Isle de Java, & nous l'avons fait dessiner avec le suivant d'après les originaux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Barone Rengers.

Fig. E. F. Laodice. La grande tache obscure aux bords extérieurs des asses

ondervleugels, is met bruine hairtjes bedekt. Zy behoort onder de vierpootige en geöogde Nimph-Kapellen, en is op de Kust van Guinea gevangen.

PLAAT CLVIII.

Fig. A. Pheridamas. De blaauwe band en vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn van een Satynagtigen glans, met een groenkleurigen weerschyn. Van onder is de grondkleur der vleugelen bleek-aschkleurig, en min of meer glanzig, maar de tekening komt geheel overeen met het Mannetje, 't welk by de volgende Figuur is asgebeeld.

Fig. B. Pheridamas. De bovenzyde der vleugelen is gelijk Fig. A. En dewyl de drie volgende, op die zyde der vleugelen, met de laatst gemelde Figuur niet verschillen, zo hebben wy dezelven ook alleen maar aan de onderzyde doen afbeelden. Deze is het Mannetje van de voorgaande, en word met de overigen in Surinamen gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 18. Fig. 2. 3.

Fig. C. Sysiphus. De Mannetjes hebben de hier afgebeelde zyde der vleugelen, in de grondkleur meer bruinagtig geel, en de donkerbruine vlakken zyn daar bleekbruin, als mede de oogswyze vlakjes aan den onderrand der agtervleuinférieures est couverte de poils longs. Il appartient aux Nymphes à yeux & têtrapedes & on l'a pris sur la Côte de Guinée.

PLANCHE CLVIII.


Fig. A. Pheridamas. La bande bleue & les taches des aîles de ce Papillon sont d'un lustre satiné, avec un chatoyant de couleur verte. En-dessous le fond des aîles est d'un gris de cendre pâle, & tant soitpeu lustré, mais le dessein ressemble entierement au Mâle, représenté par la Figure suivante.

Fig. B. Pheridamas. La surface surpérieure des aîles est comme la Figure A, & puisque les trois suivans ne différent point sur cette surface des aîles de la Figure dont nous venons de parler, nous ne les avons fait représenter que du côté inférieur. Celui-ci est le Mâle de la précédente Figure & on les trouve tous à Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 18. Fig. 2. 3.

Fig. C. Sysiphus. Le fond de la surface des aîles des Mâles que nous représentons ici, est d'un jeaune plus brunâtre, & les taches d'un brun-obscur y sont d'un brun pâle; pareillement les petites taches oeillées au bord inférieur des

		•
		•
1 //		
•		
3	•	
•		
	•	



gels minder zigtbaar dan in dit Wyfje.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 11. 12. Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. 4. Fig. D. Licomedes. De bovenzyde der vleugelen is, gelyk wy gezegd hebben, niet onderscheiden met Fig. A. Zy berust in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor N. L. Burman-

97715.

Fig. E. Demophon. Deze af beelding is naar een Mannetje, 't welke, behalven den blaauwen Satynagtigen band, en de vlakken op de bovenzyde (Fig. A.) nog over den zwarten grond der vleugelen een donker Violetkleurigen weerschyn heeft: verschillende hier in niet alleen, van de Wyfjes, maar deze laatsten hebben aan den onderrand der agter vleugels maar twee groote oogswyze vlakken, daar in tegendeel de Mannetjes daar met drie, benevens nog vier kleine dergelyke vlakjes gesierd zyn. Alle deze Kapellen gebruiken maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort, en zonder nagels. * Zy worden in Susinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 753. n. 47. Pap. Eq. Achiv. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 26. Fig. 15. 16.

* Zie I. Deel Pl. XII. Fig. A. B.

aîles postérieures y sont moins visibles que dans cette Femelle.

Seba, Tom. IV. Tab. 26. Fig. 11. 12. Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. 4.

Fig. D. Licomedes. La surface supérieure des aîles, comme nous venons de dire, ne différe point de la Figure A. Il est de la Collection de Mr. le Professeur N. L. Burmannus.

Fig. E. Demophon. Cette Figure représente un Mâle, qui, outre la bande bleue satinée & les taches sur la surface supérieure (Fig. A.) a encore sur le fond noir des aîles un reflet violet-obscur: differant non seulement en cela des Femelles, mais celles-ci n'ont au bord inférieur des aîles postérieures que deux grandes taches oeillées, tandis que les Mâles y sont ornés de trois grandes taches semblables, & outre cela encore de quatre Tous ces Papillons n'ont que petites. quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & sans onglets, * & on les trouve à Suriname.

Linnæus Syst. Nat. pag. 753.n. 47. Pap. Eq. Achiv. Seba, Tom. IV. Tab. 26, Fig. 15. 16.

^{*} Voyez la I. Part. Pl. XII. Fig. A. B.

PLAAT CLIX.

Fig. A. Crepuscularis. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De onderzyde der vleugelen, in de grondkleur, is ligtbruin met eenige donkerbruine streepswijze tekening en witte vlakken. afbeelding is naar een Mannetje uit de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor P. Luchtmans, en is op de Kust van Bengalen gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 13. Phal. Attac. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 20. Fig. 2.3. Clerck, icon Tab. 53. Fig 1. 2. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 20. Fig. 1. 2.

Fig. B. C. Palatinus. De sprieten van deze Dag-Kapel, komen wegens het haakagtige puntje, waarin dezelven aan 't einde uitloopen, overeen met die Kapellen, welken reeds op Plaat I. Fig. A. B. Plaat XVII. Fig. E. F. en Plaat XVIII. Fig. A. B. zyn afgebeeld. Zy is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van Mevrouwe J.J. Chatelain, geb. Smith. Fig. D. E. Cecilia. Dit: zeldzaam Kapelletje, 't welk de ondervleugels sterk getand, en byna gestaart heeft, kan by de Het is eene vierpootige, en word op de aveugles.


PLANCHE CLIX.

Fig. A. Crepuscularis. Les antennes: de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. Le fond du dessous des aîles est d'un brun clair, avec un dessein brun-obscur, en forme de rayes. E avec des taches blanches. Cette Figure représente un Mâle de la Collection de Mr. le Professeur P. Luchtmans, & il a été pris à la Côte de Bengalen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 13. Phali Attac. Seba, Tom. IV. Tab. 20. Fig. 2. 3. Clerck, icon. Tab. 53. Fig. 1.2. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 20. Figs. I. 24.


Fig. B. C. Palatinus. Les antennes: de ce Papillon ressemblent, quant à la petite pointe en forme de crochet par laquelle elles finissent, à celles de ces Papillons qui ont déjà été représentés sur les Planches I. Fig. A. B. Planche XVII. Fig. E. F. & Planche XVIII. Fig. A. B. Hest de Suriname & se trouve au Cabinet de Madame J. J. Chatelain, née Smith:

Fig. D. E. Cecilia. Ce rare petit Papillon, dont les aîles inférieures sont fortement dentelées & presque à queue, ongeöogde Nimphen geplaatst worden. peut se ranger au nombre des Nymphes C'est: un Papillon tétrapede Kust van Bengalen gevonden. Het be- qui se trouve sur la Côte de Bengale. Il



		•	
	· ·		
		•	
	•		
	. :		
•			
	•		
,			
•			•

	a		
	·		
		·	
	•		
			٠
			Ē
	* ·		
		•	
			,
·			
	,		
	· ·		
		•	_



rust met de volgende in de Verzameling van den Hooggeleerden Heer Professor le Professeur P. Luchtmans. P. Luchtmans.

Fig. F. G. Polycletus. De blaauwe vlak op de boven vleugelen van dit Bastert-Pagetje is glanzig, met een groenen weerschyn. Op de onderzyde Fig. G. is dit Kapelletje zeer fraai, als zynde de zwarte, met rood gevulde streepswyze tekening met blaauwagtige zilverglanzige randen gesierd. Men vindze op de Kusten van Bengalen en Coromandel.

Linn. Syst. Nat. pag. 795. n. 265. Pap. Pleb. Urbicol. Clerck, icon. Tab. 17. Fig. 3. 4.

PLAAT CLX.

Fig. A. Crepufcularis. Deze afbeelvoorgaande Plaat afgebeeld Mannetje. De onderzyde der vleugelen is bleekbruin, met donkere dwarsstreepen, en een witte dwarsband over dezelven, byna gelyk als op de bovenzyde. Zy is getekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers. Men vindtze behalven op de voorheen gemelde Kust van Bengalen, ook in China en het Molukkische Eiland Amboina, van waar cen paar derzelven, met de naastvolgen- rares Insectes.

est avec le suivant de la Collection de Mr.

Fig. F. G. Polycletus. La tache bleue des aîles supérieures de ce petit Sphinxbelier est luisant, avec un chatoyant verd. La surface inférieure Fig. G. est fort belle, le dessein noir en forme de rayes, rempli de rouge, y étant orné de bords bleuâtres argentés. On les trouve fur les Côtes de Bengale & de Coromandel.

Linn. Syft. Nat. pag. 795. n. 265. Pap. Pleb. Urbicol. Clerck, icon. Tab. 17. Fig. 3-4-

CLX. PLANCHE

Fig. A. Crepufcularis. Cette Figure ding is naar het Wyfje van het op de représente la Femelle du Mâle de la Planche précédente. Le dessous des aîles est d'un brun pâle avec des rayes transverfales obscures, & une bande transversale blanche qui les traverse, presque comme sur le dessus. Elle est dessinée d'après l'original du Cabinet de Mr. A. Gevers. On les trouve sur la Côte de Bengale, de même qu'en Chine & sur l'Isle Molucque Amboine, d'où Madame J J. Chatelain, née Smith, en a reçu un cou-Mevrouwe J. J. Chatelain, geb. Smith, ple, avec le suivant & plusieurs autres

Q. 3:

de, en meer andere zeldzaame Insecten heeft ontvangen.

Fig. B. C. Arsinoë. Deze vierpootipaarschkleurigen weerschyn. op het Eiland Amboina en op de West- te occidentale de Sumatra: & elle est dessitekend uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 19. Fig. 7. 8. en Tab. 37. Fig. 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. De voorste pooten van deze, aan de ondervleugels gestaarte Kapel, zyn kort, ruig, en in de gedaante als kwastjes aan de borst der Kapel geplaatst. Zy berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers, en wordt op het Eiland Amboina en op de Kust van Coromandel gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 35. Fig. 13. 14.

PLAAT CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. De blaauwe vlakken op de vleugelen van deze Dag-Kapel zyn glanzig, en de geheele oppervlakte derzelven by Fig. A. heeft op

Fig. B. C. Arsinoë. Cette Nymphe ge en geöogde Nimph-Kapel, heeft op tetrapede & à yeux, a sur le dessous des de onderzyde der vleugelen een bleeken aîles un chatoyant violet pâle. On la Zy word trouve sur l'Isle d'Amboine & sur la Cô-Kust van Sumatra gevonden: en is ge- née d'après un Original du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

> Seba, Tom. IV. Tab. 19. Fig. 7. 8. & Tab. 37. Fig. 11. 12.

Fig. D. E. Varanes. Les pattes antérieures de ce Papillon, dont les aîles inférieures sont à queue, sont courtes & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Il est du Cabinet de Mr. A. Gevers, & se trouve sur l'Isle d'Amboine & sur la Côte de Coromandel.

Seba, Tom. IV. Tab. 35. Fig. 13. 14.


PLANCHE CLXI.

Fig. A. B. Tiridates. Les taches bleues des aîles de ce Papillon sont luisantes, & leur surface entiere, Fig. A. a sur le fond noir un chatoyant bleu-obscur. Les den zwarten grond, een donkerblaauwen pattes antérieures sont courtes & sans weerschyn. De voorste pooten zyn kort onglets. Il est de là famille de ces Paen zonder nagels. Zy behoort onder het pillons qui sont représentés sur les Plangezin dier Kapellen, welken op de IIIde ches III. & XXXVII. On les trouve sur



	•	

		•	
	,		
			•
	•		•
	·		
	•		
		•	
	•		
	·		
		•	
,			
	<i>t</i> -		
			•
			•
	-		
	,		
	v.		



en XXXVIIste Plaaten zyn afgebeeld. Men vindtze op de Eilanden Java en Amboina, en zy is met de overige hier volgende Kapellen getekend uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere Baron Rengers.

Fig. C. D. Roxelana. Deze geöogde Nimph-Kapel, komt my voor het Mannetje te zyn, van de volgende Figuur E. F. Zy hebben de voorste pooten kort en zonder nagels. De hier afgebeelden zyn omtrent Constantinopel gevangen, en worden ook te Smyrna gevonden, want de Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers heeft ze van de laatstgemelde plaats ontvangen.

Fig. E. F. Roxelana. Alhoewel deze Dag-Kapel, wegens het grooter getal der oogswyze en witte vlakken op de vleugelen, met de voorgaande merkelyk verschilt, zo heeft egter de grond-tekening derzelven met de gemelde veele overeenkomst, en hier uit zou men kunnen besluiten, dat zy het Wyfje van de voor- précédente Figure C. D. gaande Fig. C. D. is.

les Isles de Java & d'Amboine & celui-ci avec tous les autres Papillons de cette Planche sont dessinés d'après ceux du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. C. D. Roxelana. Il me semble que cette Nymphe à yeux est le Mâle de la Figure suivante E. F. Elles ont les pattes antérieures courtes & sans onglets. Celles que nous représentons ici ont été prises aux environs de Constantinople & on les trouve aussi à Smyrne, car Mr. A. Gevers les a reçu du dernier lieu.

Fig. E. F. Roxelana. Quoique ce Papillon ci, par rapport au plus grand nombre de taches oeillées & blanches sur les aîles, differe beaucoup du précédent, le dessein du fond de ces aîles lui ressemble cependant beaucoup, & on pourroit conclure de-là que c'est la Femelle de la

PLAAT CLXII.

PLANCHE CLXII.

Fig. A. Salmonea. Deze Nagt-Kapel korten zuiger; het is een Wyfje. De Mannetjes hebben de sprieten sterker ge- tennes des Mâles sont plus fortement plu-

Fig. A. Salmonea. Cette Phalêne a heeft gepluimde sprieten en een zeer des antennes filiformes & une trompe fort courte: c'est une Femelle. Les anpluimd en kamvormig. Van onder is de mackes & à peigne. En-dessous le fond

grond der vleugelen bruinrood, met een witte stip op iedere in 't midden. Z_{V} behoort onder de zogenaamde Nagt-Paauwoogen (Phal. Attac.) en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere Baron Rengers. Zy is uit Surinamen.

Fig. B. C. Mesentina. De voorste pooten van deze ongeöogde Nimph-Kapel zyn kort en zonder nagels. De witte vlakjes op de bovenvleugels by Fig. C. zyn eenigzins glanzig. Zy worden in Surinamen gevonden: en deeze is my ter afbeelding geleend door den Wel-Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. E. Verago. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn sterk gepluimd. De zuiger van dit Mannetje is met het bloote oog niet zigtbaar. Wanneer dit Insect de vleugelen in den rustenden stand houd, dan leggen de bovensten dakswyze, en de ondersten vlak en vooruitgeschoven, gelyk die van het zogenaamde verdorde Eyken blad. (Phal. Quercifolia.) Zy is uit Surinamen, en afgebeeld uit het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers.


Fig. F. Phocus. De vuilgeele kleur op de vleugelen van deze Dikkop-Kapel, bestaat uit lange en eenigzins glanzige hairtjes, en de bleeke vlakken op de voorste vleugels zyn doorschynend. Van

des aîles est d'un rouge-brun, & il se trouve au milieu de chacune un point blanc. Elle appartient aux Oeil de Paon nocturnes (Phal. Attac.) & se trouve au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers. Elle est de Suriname.

Fig. B. C. Mesentina. Les pattes antérieures de cette Nymphe aveugle sont courtes & sans onglets. Les petites taches blanches des aîles supérieures, de la Figure C., sont un peu luisantes. On les trouve à Suriname & celle-ci représente un Original de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. E. Verago. Les antennes de cette petite Phalêne sont fortement plumacées. La trompe de ce Mâle n'est pas visible à l'œil. Lorsque cet Insecte à ses aîles dans une position tranquile, les supérieures sont en forme de toist, & les inférieures droites & avancées, comme celles de la Phal. Quercifolia. Elle est de Suriname & dessinée d'après l'original du Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

La couleur jeaune Fig. F. Phocus. sale sur les aîles de ce Plebeien noble, est composée de petits poils longs & tant soit peu luisans, & les taches pâles des aîles antérieures sont transparentes. En-desonder is de kleur in 't algemeen meer sous la couleur est généralement d'un ligtgeel. Men vindze in Surinamen, en jeaune plus clair. On le trouve à Surina-



en is getekend uit het Kabinet van den Heer M. Houttuin. Med. Doctor.

Fig. G. Metis. Van onder zyn de voorste vleugels eveneens met donker Orangekleurige vlakken getekend, gelyk de bovenzyde derzelven: maar de ondervleugels zyn effen donkerbruin zonder vlakken. De Wyfjes egter hebben de beide zyden der vier vleugelen eveneens gekleurd. Deze Kapelletjes behooren onder de Dikkopjes, (Pap. Pleb. Urbicolæ) en geenzins by de Argusjes of Schildrups-Pagetjes, (Pap. Pleb. Ruralis) onder welke laatste de Heer Linnæus dezelve geplaatst heeft. Men vindtze aan de Kaap de goede Hoop, en deze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Heer W. van der Meulen.

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 245. Pap. Pleb. Rural. Drury, Inf. Tom. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

P-L A A T CLXIII.

Fig. A. B. Marcellina. Deze afbeelding is naar het Wyfje van het by Fig. C. afgebeelde Mannetje.

Fig. C. Marcellina. De bovenzyde der vleugelen is gelyk Fig. A. van een schoone zwavelgeele kleur. De witte vlakken op de vleugelen, van onder, hebben in beide Sexen een zilveragtigen glans. Zy behooren onder de ligtkleurige Danaiis-Kapellen, en worden in Surinamen gevonden.

II. DEEL.

men & il est dessine d'après celui du Cabinet de Mr. Houttuin, Docteur en Medécine.

Fig. G. Metis. En - dessous les aîles font dessinées justement comme leur surface supérieure de taches obscures couleur d'Orange; mais les aîles inférieures sont d'un brun-obscur simple sans taches. Les Femelles ont pourtant les deux surfaces des aîles de la même couleur. Ces petits Papillons appartiennent aux Plebeiens nobles (Pap. Pleb. Urbicola) & non point aux Argus (Pap. Pleb. Ruralis) parmi lesquels Mr. Linnæus les a rangés. On les trouve au Cap de bonne Esperance & celui-ci est dessiné du Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 245. Pap. Pleb. Rural. Drury, Inf. Tom. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

PLANCHE CLXIII.

Ceci est la Fe-Fig. A. B. Marcellina. melle du Mâle Fig. C.

Fig. C. Marcellina. La surface supérieure des aîles est comme la Figure A. d'une belle couleur de souffre. Les taches blanches des aîles en-dessous, ont dans les deux Sexes un lustre argenté. Ils appartiennent aux Danaides claires & setrouvent à Suriname.

R

Dit fraaye Bas-Fig. D. E. Pholeus. tert of Schildrups Pagetje is op de bovenzyde der vleugelen Blaauw-Satynagtig glanzig, met een groenen weerschyn op het midden derzelven. De onderzyde is gesierd met blaauwe en groene banden en vlakken, welken als met een vergulden luister praalen. Het is in Surinamen gevangen.

Fig. F. G. Ematheon. De blaauwe kleur van het Lyf en der vleugelen, op de bovenzyde, als mede de streepjes of vlakjes der gemelde kleur by Fig.G.is glan-Zy behoort onder het gezin der naast voorgaande, en is my uit Surinamen toegezonden.

CLXIV. PLAAT

Fig. A. B. Glaucippe. Deze witte en aan de tippen met rood gevlakte Danaüs-Kapel, is het Mannetje van de naastvolgende.

Fig. C. Glaucippe. Deze is het Wyfje van Fig. A.B. Zy heeft de onderzyde der vleugelen eveneens gekleurd als Fig. B. behalven den zwarten onderrand aan de agtervleugels, welke alleen maar aan de Wyfjes dezer Kapellen, voor zo veel ons bekend, eigen is. Zy worden in China gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 762. n. 89. Pap. Dan. Candid. Seba, Schatk. Tom. Dan. Candid. Seba, Tom. IV. Tab. 45.

Fig. D. E. Pholeus. Cette belle petite Tortue est d'un lustre satiné bleu luisant sur la surface supérieure des aîles, avec un chatoyant vert sur leur milieu. Le dessous est orné de bandes & de taches bleues & vertes, qui brillent comme d'un lustre doré. On l'a pris à Suriname.


Fig. F. G. Ematheon. La couleurbleue du corps & des aîles, sar le dessus, Es pareillement les petites rayes ou taches de la même couleur, Fig. G. est luisante. Elle appartient à la famille de celle qui precede immédiatement & m'a été envoyé de Suriname.

PLANCHE CLXIV.

Fig. A. B. Glaucippe. Cette Danaide blanche, tachetée de rouge vers les pointes, est le Mâle de la suivante.

Fig. C. Glaucippe. C'est ici la Femelle de la Figure A.B. La surface inférieure des aîles est de la même couleur de la Fig. B. excepté le bord inférieur noir aux aîles postérieures, qui se trouve uniquement dans les Femelles de ces Papillons. Ils sont de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 762. n. 89. Pap.



1691	

IV. Tab. 45. Fig. 5. 6. 13. 14. Edwards, av. Tab. 128. Clerck, icon. Tab. 35. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. I. Tab. 10. Fig. 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. Dit Bastert-Pagetje heeft van boven binnen den zoom der ondervleugels, een zilverglanzigen tandswyzen streep, 't welk ook plaats heeft op de onderzyde Fig. E. der vooren agtervleugelen, alwaar op de laatsten binnen den gemelden streep twee ryen elk van zeven zilveragtige, maar een weinig naar het blaauwe hellende droppen geplaatst zyn, welken als van gegooten zilver zig aldaar vertoonen.

Fig. F. G. Cupido. Dit is de afbeelding van een Wyfje der voorgaande Fig. D. E. Het verschilt merkelyk in tekening, maar voor het overige, wat de zilveragtige streepen en ronde vlakken of dropjes betrest, is zy geheel overeenkomstig met het Mannetje. Men wil dat de Rups van deze fraaie Kapelletjes zig op den Katoenboom in Surinamen onthoud. En my is verzekerd dat aldaar kort na de regentyd deze Kapellen in zulk een menigte worden gevonden, dat men dezelven als Hast kan vangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 787. n. 217. Pap. Pleb. Rural. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 33. Fig. 5. 6. 7. 8. Merian. fur. inf. Tab. 10. Fig. 1. Rösel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 7.

Fig. 5. 6. 13. 14. Edwards av. Tab. 128. Clerck, icon. Tab. 35. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. I. Tab. 10. Fig. 3. 4.

Fig. D. E. Cupido. Ce petit Papillon a en-dessi dans le bord des aîles inférieures une raye d'un lustre argenté & dentelées, ce qui a pareillement lieu sur le dessous Fig. E. des aîles antérieures & postérieures, où se voyent sur les dernieres, dans la dite raye, deux rangées, chacune de sept gouttes argentées, mais tirans un peu sur le bleu, qui se montrent comme étant d'argent liquide.

Fig. F. G. Cupido. C'est la sigure d'une Femelle de la Figure précédente D. E. Elle dissere beaucoup dans le dessein, mais au reste, quant aux rayes argentées & aux taches ou gouteş rondes, elle ressemble entierement au Mâle. On prétend que la chenille de ces beaux petits Papillons loge sur l'arbre de coton à Suriname. On m'a assuré que vers le tems de la pluie on y trouve ces Papillons en si grand nombre, qu'on en peut attraper autant que l'on veut.

Linn. Syft. Nat. pag. 787. n. 217. Pap. Pleb. Rural. Seba, Tom. IV. Tab. 33. Fig. 5.6.7.8. Merian, fur. inf. Tab. 10. Fig. 1. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 7.

R 2

PLAAT CLXV.

Fig. A. Cresphontes. Deze gestaarte Kapel of Pagie, heeft de grondkleur der vleugelen op de bovenzyde donkerbruin, daar de Mannetjes in tegendeel, (gelyk uit de afbeelding op de volgende Plaat Fig. B. te zien is,) dezelve zwart hebben. De blaauwe vlakken aan beide zyden der ondervleugels bestaan uit glinsterende siertjes. Zy behoort onder de Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus, en word in Noord-Amerika, te Nieuwjork en op het Eiland Jamaika, als mede in Zuid-Carolina gevonden.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Festonnée.

Fig. B. Phasis. Dit Nagt-Kapelletje met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de vleugelen aan de onderzyde van een vuilgeele kleur, met dezelfde doch flaauwer tekening als op de bovenzyde. Men vind ze in Surinamen. Fig. C. Jota. Wegens eenige overeenkomst welke dit Nagt-Kapelletje met een Europisch Insect, 't welk volgens Linnæus* door den Heer Forskâl in Duitschland ontdekt was, en op het mid-

den van ieder bovenvleugel, een zilveragtig teken, gelykende naar een Grieksche Jota heeft, zo hebben wy aan deze diezelfde benaaming gegeven. Het behoort onder het gezin dier Uiltjes wel-


PLANCHE CLXV.

Fig. A. Cresphontes. Le fond du desfus des aîles de ce Papillon à queue ou Page est d'un brun-obscur, tandisque les Mâles au contraire (comme on peut le voir sur la Planche suivante, Fig. B.) l'ont noir. Les taches bleues des deux côtés des aîles inférieures sont composées d'atomes luisants. Il appartient aux Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus & se trouve dans l'Amérique Septentrionale, a la Nouvelle-York & dans l'Isle de la Jamaïque, comme aussi dans la Caroline Méridionale.

D'Aubenton, Planch. enl. 69. La Festonnée.

Fig. B. Phasis. Les aîles de cette petite Phalêne à antennes filiformes & à trompe roulée, sont au-dessous d'une couleur jeaune sale, avec le même dessein, mais plus soible que sur le-dessus. On les trouve à Surinamen.

Fig. C. Jota. A cause de quelque ressemblance que cette petite Phaléne a avec un Insecte de l'Europe qui, selon Mr. Linnæus, avoit été découvert en Allemagne par Mr. Forskâl, & qui a sur le milieu de chaque aîle supérieure une marque argentée, ressemblant à un Jota, nous lui avons donné ce même nom. Elle appartient à la famille de ces Phalénes qui ont des antennes silisormes & une



a		
	,	

,			



ken draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger hebben. Van onder zyn de vleugelen aschkleurig zonder, of met weinig andere tekening. Men vindtze in de Virginiën.

* Linn. Syst. Nat. pag. 844. n. 130. Phal. Noct. Jota.

Fig. D. Venulia. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder zyn de vleugelen geel en allen zwart gerand, en op ieder een zwarte stip in 't midden. Het is op de Kust van Bengalen gevangen.

Fig. E. Onytes. Dit wederzyds eveneens gekleurd Nagt-Kapelletje behoort wegens de draadvormige sprieten en gekrulden zuiger onder het gezin der drie voorgaande. Het wordt in Surinamen gevonden.

PLAAT CLXVI.

Fig. A. Alcanor. De onderzyde der vleugelen van deze gestaarte Kapel of Pagie, is niet van de bovenzyde onderscheiden. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus zoude zy onder de Trojaansche Ridders behooren. Zy is uit China.

Fig. B. Cresphontes. Deze afbeelding is naar het Mannetje van Fig. A. op de naastvoorgaande Plaat. Van onder is zy ten eenemaal gelyk aan die zyde der gemelde Plaat Fig. B.

Fig. C. D. Ornatrix. Dit Nagt-Ka-

trompe roulée. Au-dessous les aîles sont couleur de cendre, avec fort peu d'autre ou sans aucun dessein. On les trouve en Virginie.

Linn. Syst. Nat. pag. 844. n. 130. Phal. Noct. Jota.

Fig. D. Venulia. Les antennes de cette petite Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. Au-dessous les aîles sont jeaunes, toutes bordées de noir, & fur le milieu de chacune se voit un point noir. On l'a pris sur la Côte de Bengale.

Fig. E. Onytes. Cette petite Phalêne dont les deux surfaces sont de la même couleur, appartient, par rapport aux antennes filiformes & la trompe roulée, à la famille des trois précédentes. On la trouve à Suriname.

PLANCHE CLXVI.

Fig. A. Alcanor. Le dessous des aîles de ce Papillon à queue ou Page, ne differe point du dessus. Selon la division de Mr. Linnæus il appartiendroit aux Chevaliers Trayens. Il est de-la Chine.

Fig. B. Cresphontes. C'est le Mâle de la Figure A de la Planche précédente. Au-dessous il ressemble entierement à cette surface de la dite Planche Fig. B.

Fig. C. D. Ornatrix. Cette petite Pha- R_3

pelletje heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, het houd de vleugels in den rustenden stand, om het lyf geslagen, gelyk de Phal. Quadra, de Phal. Rubricollis, en de Phal. Lotrix * als mede gelyk de meesten der Mot-Vlinders (*Phal. Tineæ*) dezelven gewoon zyn te houden. Zy worden in Zuid- en Noord-Amerika gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 839. n. 110. Phal. Noct. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 39. Fig. 19. 20. Clerck, icon Tab. 55. Fig 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 24. Fig. 2. * Zie Plaat CIX. Fig. E. F. NB. Deze is de Phal. Tineæ. Pulchella Vide Linn. Syst. Nat. pag. 884. n. 349.

Fig. E. Priverna. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De vleugelen hebben ze van onder in't midden schoon geel, aan de voorsten de tippen bruin en de agtersten aan de onderranden zwart. Men vindze in Surinamen.

Fig. F. Ornatrix. Wegens de onderscheiden zwarte tekening aan beide zyde der ondervleugels, hebben wy dit Wyfje hier doen afbeelden. Van boven zyn de voorste vleugels niet onderscheiden van het Mannetje by Fig. C.

PLAAT CLXVII.

Fig. A.B. Thoas. Hoe veele overeenkomst deze Pagie ook met den Cresphontes coup de rapport entre ce Page & le Cres-

lêne a des antennes filiformes & une trompe roulée. Elle entoure le corps de ses aîles, lorsqu'elle se repose, comme la Phal. Quadra, la Phal. Rubricollis & la Phal. Lotrix * & comme la plus grande partie des Teignes (Phal. Tineæ) ont coutume de les porter. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale.


Linn. Syst. Nat. pag. 839. n. 110. Phal. Noct. Seba, Tom. IV. Tab. 39. Fig. 19. 20. Clerck, icon. Tab. 55. Fig. 3. 4. Drury, inf. Tom. I. Tab. 24. Fig. 2. * Voyez la Planche CIX. Fig. E. F. NB. Celle-ci est la Phal. Tineæ Pulchella, vide Linn. Syft. Nat. pag. 884. n. 349.

Fig. E. Priverna. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. Elles ont les aîles au-dessous, dans le milieu, d'un beau jeaune; les pointes des antérieures sont brunes, & les postérieures sont noires vers les bords inférieurs. On les trouve à Suriname.

Fig. F. Ornatrix. A cause du dessein noir varié des deux surfaces des aîles inférieures, nous avons fait représenter ici ce Mâle. Au-dessus les aîles antérieures ne different point du Mâle, Fig. C.

PLANCHE CLXVII.

Fig. A.B. Thoas. Quoiqu'il y a beau-



	*		* 3			
				,		
					,	
	:					
	- 1					
	· ·					
		•				

moge hebben, zyn het egter, wanneer men dezelven naauwkeurig met elkander vergelykt, twee van elkander verschillende soorten. Deze heeft de vleugelen in eene langwerpiger gedaante, en de uit groote geele vlakken bestaande band, loopt meer in eene regte lyn over de bovenzyde der vleugelen, dan in de laatstgenoemden. De Wysjes zyn ook in kleur noch tekening niet onderscheiden, met het hier afgebeelde Mannetje. Zy zyn in Surinamen zeer gemeen.

Linn. Syst. Nat. pag. 536 Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 38. Fig. 6.7. Houttuin, Nat. Hist. I Deel XI. St. pag. 205. Pl. 87. Fig. 3. Drury, inf. Tom. I. Tab. 22. Fig. 1. 2.

Fig. C. Capensis. Deze Nagt-Kapel met draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger, heeft de grondkleur der vleugelen, aan de onderzyde, donkerbruin, met dezelfde witte tekening als op de bovenzyde is te zien. Men vind ze aan de Kaap de goede Hoop.

Fig. D. Tymber. Op de onderzyde der vleugelen, heeft deze Nagt-Kapel eene bruinagtige geele kleur, en over de agtersften loopt een donkerbruine dwarsstreep. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy is uit Surinamen.

Fig. E. F. Agathina. Aan beide zyden der vleugelen heeft deze geöogde Nimph-Kapel een paarschen weerschyn. De voorste pooten zyn kort, en zonder nagels. Zy is uit Surinamen en berust in het Kabi-

phontes, ce sont cependant, lorsqu'on les compare exactement, deux especes entierement dissérentes. Les aîles de celui-ci ont une forme oblongue, & la bande de grandes taches jeaunes va plus en ligne directe sur le dessus des aîles, que dans le dernier. Les femelles ne dissérent point aussi en couleur ni en dessein du Mâle que nous représentons ici. Ils sont fort communs à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 536. Pap. Eq. Achiv. Thoas. Seba, Tom. IV. 38. Fig. 6.7. Houttuin, Hift. Nat. IPa,t. XI. Vol. pag. 205. Pl. 87. Fig. 3. Drury, inf. Tom. I. Tab. 22. Fig. 1.2.

Fig. C. Capensis. Le fond des aîles de cette Phaléne à antennes filiformes & à trompe roulée, est, du côté inférieur, d'un brun-obscur, avec le même dessein blanc qui se voit sur la surface supérieure. On les trouve au Cap de bonne Espérance.

Fig. D. Tymber. Cette Phalêne a fur le dessous des aîles une couleur jeaune brunâtre, & il y a fur les postérieures une bande transversale d'un brun-obscur. Les antennes sont filisormes & la trompe est roulée. Elle est de Suriname.

Fig.E.F. Agathina. Cette Nymphe à yeux a un chatoyant violet sur les deux surfaces des aîles. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Elle est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr.

net van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van C. van Lennep. Lennep.

PLAAT CLXVIII.

Fig. A. B. Aurelius. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus zou deze Kapel met even groot recht, als den Pap. Phidippus*, onder de Grieksche Ridders behooren: echter zoude men ze beide met meer gevoeglykheid onder de geöogde Nimphen mogen plaatzen, dewyl de breedte van de onderste tip, of grondsteun tot aan het gewricht der bovenvleugels byna een halve duim breeder is, dan van den grondsteun tot aan de voorste tip der gemelde vleugelen. Zy heeft de voorste pooten kort en zonder nagels. De onderzyde der vleugelen heeft een glans als een zekere zyden stof, 't welk gevlamd Taf genaamd word. De Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers heeft ze uit de Oostindiën van de Westkust van Sumatra ontvangen, en het is de eenigste welke van deze soort in de Hollandsche Kabinetten van Insecten bekend is. * Zie I Deel Pl.LXIX.Fig. A.B.

Fig. C.D. Hyperbius. Deze af beelding is naar het Mannetje van Fig. E. F. en behoort onder de vierpootigen en geöogde Nimph-Kapellen.

. Fig. E. F. Hyperbius. Is het Wyfje van de voorgaande Fig.C.D. Zy worden aan de Kaap de goede Hoop gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 769. n. 130. Pap. Dan. Fest.


PLANCHE CLXVIII.

Fig. A. B. Aurelius. Selon la division systematique de Mr. Linnæus, ce Papillon ci appartiendroit à aussi juste titre que le Pap. Phidippus * aux Chevaliers Troyens. Cependant on pourroit les ranger tous les deux avec plus de droit parmi les Nymphes à yeux, puisque la largeur de la pointe inférieure, ou la base, jusques à la jointure des aîles supérieures est presque d'une demie pouce plus large, que de la base jusques à la pointe antérieure des dittes aîles. Ses pattes antérieures sont courtes & sans onglets. Le dessous des aîles à un lustre comme une certaine Etoffe que l'on nomme du Taffetas flambé. Son Excellence Mr. le Baron Rengers l'a reçu des Indes Orientales, de la Côte occidentale de Sumatra, & c'est, le seul de cette espece qui soit connu dans les Cabinets d'Insectes de la Hollande. *Voyez la I Partie.Pl. LXIX. Fig. A. B.

Fig. C. D. Hyperbius. C'est ici le Mâle de la Figure E. F. qui appartient aux Nymphes à yeux & tétrapedes.


Fig. E. F. Hyperbius. C'est la Femelle de la précédente Figure C. D. On les trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn Syst. Nat pag. 769. n. 133. Pap. Dan. Fest.



•	,

	,	
; ;		•
•		



UITLANDSCHE KAPELLEN.

PLAAT CLXIX.

Fig. A. Odora. Deze Nagt-Kapel heeft draadvormige sprieten en een langen gekrulden zuiger. De onderzyde der vleugelen is donkeraschkleurig met bruine golfswyze dwarsstreepen; by de volgende Figuur is het Wysje afgebeeld.

Fig. B. Odora. De witte golfswyze dwarsband over de vleugelen onderscheid deze van het Mannetje by Fig. A. maar in de grondtekening verschillenze geenzins van elkander. De blaauwe glanzige streepen en siertjes wordt men in allen niet zo duidelyk gewaar, ten zy men de Kapellen, nog zuiver en ongeschonden zynde, of uit de Rupzen geteeld bekomt, in welk geval wy geweeft zyn; waardoor wy de afbeelding zo veel te naauwkeuriger hebben kunnen geven. Van onder zyn de vleugelen in kleur en tekening overeenkomstig met het Mannetje. Men vindtze in Zuid- en Noord-Amerika. Dezen zyn in Surinamen gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 11. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 1.2. Sloane. Jamaic. Tom. II. Tab. 236 Fig. 13. 14. Drury, inst. Tom. I. Tab. 3. Fig. 1.

Fig. C. D. Lysidice. De blaauwe kleur op de vleugelen en het lys van dit fraai Kapelletje, is niet zo glanzig gelyk II. Deel.

PAPILLONS EXOTIQUES. 11E

PLANCHE CLXIX.

Fig. A. Odora. Cette Phalêne a des antennes filiformes & une trompe roulée longue. Le dessous des aîles est d'un gris de cendre obscur, avec des bandes transversales brunes ondées. La Figure suivante represente la Femelle.

Fig. B. Odora. La bande transversale blanche ondée sur les aîles, distingue celle-ci du Mâle, Figure A; mais ils ne different point dans le dessein du fond. Les bande bleue luisante & les atomes ne s'apperçoivent point si visiblement dans toutes les especes, à moins qu'on ne reçoive les Papillons, purs & sans défauts, ou comme ils naissent des chenilles, un avantage qui nous est arrivé, & par lequel nous nous sommes trouvés en état de représenter la figure avec la derniere exactitude. Le dessous des aîles ressemble parfaitement à celui du Mâle, tant pour la couleur que pour le dessein. les trouve dans l'Amérique septentrionale & méridionale. Ceux-ci font de Suriname.

Linn. Syst. Nat. pag. 811. n. 11. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 50. Fig. 1. 2. Sloane, Jamaic. Tom. II. Tab. 236. Fig. 13. 14. Drury, inf. Tom. I. Tab. 3. Fig. 1.

Fig. C. D. Lysidice. La couleur bleue des aîles & du corps de ce beau petit Papillon, n'est pas si luisante comme celle

de meeste Kapellen, welke de gemelde kleur hebben, maar donsagtig en zonder eenigen weerschyn. De witte stippen, op de onderzyde, hebben een zilveragtigen luister. De voorste pooten zyn kort en niet geschikt om mede te loopen. Zy behoort dierhalven onder de vierpootige Gras-Kapellen, en wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Tharos. Op het eerste gezigt gelykt dit Kapelletje naar de Liriope, welke in het I. Deel, Plaat I. Fig. C. D. is afgebeeld; maar by nadere beschouwing blykt het dat het twee van elkander verschillende soorten zyn. Zy behoort mede onder de zogenaamde vierpootige Kapellen, en wordt in Noord-Amerika te Nieuwjork gevonden.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 21. Fig. 5.6.

PLAAT CLXX.

Nagt-Kapel veele overeenkomst heest met de *Phal. Odora*, op de voorgaande Plaat Fig. A. B. afgebeeld, zo is egter de grondtekening aan beide zyden der vleugelen te veel verschillende, dan dat men ze met de gemelde voor een en dezelfde soort zoude houden; bovendien heerscht een paarsch-kleurigen gloed over de vleugelen, welke aan de onderzyde zig nog schooner vertoont, naar maate

de la plupart des Papillons qui ont la dite couleur, mais en forme de duvet, & fans aucun reflet. Les points blancs fur le dessous, ont un lustre argenté. Les pattes antérieures sont courtes & ne lui servent point à marcher. Il appartient, en vertu de cela, aux Nymphes à quatre pieds & on le trouve à Suriname.

Fig. E. F. Tharos. A la premiere vue ce petit Papillon ressemble à la Lirsope, qui est représentée dans la I. Partie, Planche I. Fig. C. D. mais en les comparant de plus près on apperçoit que ce sont deux especes dissérentes. Il appartient pareillement aux Papillons tétrapedes, & on le trouve dans l'Amérique méridionale, à la Nouvelle York.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 21. Fig. 5. 6.

PLANCHE CLXX.

Fig. A. B. Agarista. Quoique cette Phaléne ressemble beaucoup à la Phal. Odora, représentée sur la Planche précédente, Fig. A. B. on voit néanmoins trop de dissérence dans le sond des deux surfaces des aîles, pour qu'on puisse les placer parmi la même espece; d'ailleurs il domine un lustre violet sur les aîles, qui brille avec plus d'éclat, sur la surface inférieure, selon que la lumiere y donne. Je n'ai point vu une Femiere y donne.



•			30.00	
			•	
	٠.			
			J	
			4	•
		· •		
			,	
		•		

het licht daar op valt. My is nog geen Wyfje van deze foort voorgekomen, dierhalven kan ik niet bepaalen of dezelve in kleur met het hier afgebeelde Mannetie veel verschillen. Zy is op de Reede van Curação aan een der vensters van de Kajuit op een Fregatschip aldaar liggende, gevangen, en berust thans in de Verzameling van den Wel Ed. Heer E. de Marre. Doch ik ben in het zekere onderricht, dat men ze ook in Surinamen heeft gevonden.

Fig. C. Phareus. Dit Kapelletje heeft de vleugelen, van onder niet zo schoon rood van kleur als op de bovenzyde. Het is een zespootige en kan onder de zogenaamde Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis) geplaatst worden. Men vindtze in Surinamen.

Fig. D. Phylira. De onderzyde der vleugelen van dit Spanrups-Kapelletje is, gelyk boven, bleekgroen, doch zonder de oogswyze roode vlakjes. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is ge-Het is uit Surinamen. kruld.

Fig. E. Carica. Door Juffrouw Merian is de afbeelding van dit Kapelletje gegeeven, welker Rups zig op de Papaya-Boomen in Surinamen onthieldt. Mannetjes hebben de vleugelen in 't algemeen smaller dan het hier afgebeelde Wyfje. Van onder hebbenze dezelfde kleur en tekening als op de bovenzyde.

melle de cette espece, & je ne saurois de. cider si elles different beaucoup en couleur du Mâle que nous représentons ici. Elle a été prise à Curação, à une senêtre de la poupe d'une Fregate Hollandoise, & elle se trouve maintenant dans la Collection de Mr. E. de Marre. Cependant on m'a assuré qu'on les trouve pareille. ment à Suriname.

Fig. C. Phareus. Au-dessous les aîles de ce petit Papillon, ne sont point d'une couleur rouge si belle que la surface supérieure. Il est sixpede & on peut le ranger parmi les Argus (Pap. Pleb. Ruralis.) On les trouve à Suriname.

Fig. D. Phylira. Le dessous des aîles de cette petite Phalêne arpenteuse est comme le dessus, d'un verd pâle, mais sans les petites taches rouges oeillées. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. Elle est de Suriname.

Fig. E. Caricæ. Mademoiselle Merian a donné la Figure de ce petit Papillon, dont la chenille demeure sur les arbres Papaya, à Suriname. Les Mâles en général ont les aîles plus étroites que celles de cette Femelle. Sur le dessous on voit la même couleur & le même dessein que sur le dessus.

S 2

Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 244. Pap. Pleb. Ruralis. Merian Sur. ins. Tab. 40. Clerck, icon. Tab. 20. Fig. 3 4.

Fig. F. Pelops. Dit wederzyds evencens gekleurde Kapelletje heeft eenige overeenkomft met het naaft voorgaande. Het is een Wyfje. De Mannetjes hebben gelyk de evengemelde de vleugelen smaller. Het is uit Surinamen.

PLAAT CLXXI.

Fig. A. B. Macrops. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. De Heer Linnæus plaatst dezelve onder de Atlas-Uilen, (Phal. Attaci) zyn Ed. hadze van den Heer Sparman ontsangen. Zy worden op de Kust van Coromandel, te Trancquebar, en in Bengalen gevonden.

Linn. Syst. Nat. Tom. III. pag. 225. Phal. Macrops. Sultzer, Gesch. der Ins. pag. 44. Tab. 22. Fig. 2. Phal. Bubo, alwaarzy ten onregte onder de ongetongde, of, geenen zigtbaaren zuiger bebbende Nagt-Kapellen, word geplaatst.

Fig. C. D. Daplidice. De Mannetjes van deze witte Danaus-Kapellen hebben op de bovenvleugels een zwarte vlak minder dan het hier afgebeelde Wyfje, ook ontbreekt aan de eerste den zwarten rand met witte vlakken op de ondervleugels. Maar voor 't overige is er geen

Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 244. Pap. Pleb. Ruralis. Merian. Sur inf. Tab. 40. Clerck, icon. Tab. 20. Fig. 3. 4.

Fig. F. Pelops. Ce petit Papillon, dont les deux surfaces sont de la même couleur, a quelque rapport avec celui qui precede immédiatement. C'est une Femelle. Les aîles des Mâles, comme du susdit, sont plus étroites. Il est de Suriname.

PLANCHE CLXXI.

Fig. A. B. Macrops. Les antennes de cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Mr. Linnæus la range parmi les Atlas (Phal. Attaci.) Il l'avoit reçue de Mr. Sparman. On les trouve à la Côte de Coromandel, à Trancquebar & à Bengale.


Linn. Syst. Nat. Tom. III. pag. 255. Phal. Macrops. Sultzer pag. 44. Tab. 22. Fig. 2. Phal. Bubo, où on la place à tort parmi les Phalênes qui n'ont point la trompe visible.

Fig. C. D. Daplidice. Les Mâles de ces Danaïdes blanches, ont une tache de moins fur les aîles supérieures, que la Femelle dont nous donnons ici la Figure. On ne trouve pas aussi dans le premier le bord noir avec des taches blanches sur les aîles inférieures; mais au reste il n'y es



		·	•
		· (,,).	
			,

•	



onderscheid in kleur noch tekening met elkander. Zy worden aan de Kaap de goede Hoop gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 81. Pap. Dan. Cand.

Fig. E. F. Gliciria. Deze Chineesche Kapel gelykt veel naar de Europische groote Kool-Kapel. (Pap. Brassica.) Veelligt onthoud zig de Rups derzelven mede op diergelyke Plantgewassen.

PLAAT CLXXII.

Fig. A. Iphianasse. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Op de bovenzyde der vleugelen heerscht een schoone paarschkleurige weerschyn, en van onder zyn dezelven donker aschkleurig met bruine golfswyze dwarsstreepen. Zy is my uit Surinamen toegezonden.

Fig. B. Mycerina. Deze heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. De onderzyde der vleugelen is aschkleurig met bruine golfswyze dwarsstreepen, en op het midden van ieder vleugel een donkerbruine ronde vlak. Zy is uit Surinamen.

Fig. C. Bajularia. De beide zyden der vleugelen van deze Nagt-Kapel, zyn eveneens in kleur en tekening. De sprieten zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Zy wordt in Amboina gevonden.

aucune différence de couleur ni de dessein. On les trouve au Cap de bonne Esperance.

Linn. Syst. Nat. pag. 760. n. 81. Pap. Dan. Cand.

Fig. E. F. Gliciria. Ce Papillon Chinois ressemble beaucoup au grand Papillon du Choux de l'Europe. Peut-être que la chenille demeure aussi sur des Plantes semblables.

PLANCHE CLXXII.

Fig. A. Iphianasse. Les antennes des cette Phaléne sont filisormes & la trompe est roulée. Le dessus des aîles brille d'un beau chatoyant violet, & en-dessous elles sont d'un minime obscur, avec des bandes transversales ondées. On me l'a envoyée de Suriname.

Fig. B. Mycerina. Celle-ci a des antennes filiformes & une trompe roulée. Le dessous des aîles est couleur de cendre; avec des bandes transversales brunes ont dées, & sur le milieu de chaque aîle une tache ronde d'un brun-obseur. Elle est de Suriname.

Fig. C. Bajularia. Les deux furfaces des aîles de cette Phaléne ont la même couleur & le même dessein. On la trousve à Amboine.

Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 6. 7.

Fig. D. Perithea. De vleugelen zyn zeer dun en byna doorschynend; aan de onderzyde eveneens bleek-paarsch met geel gevlakt; het lyf en de pooten donkergeel; de sprieten draadvormig en de zuiger gekruld. Zy behoort nevens de voorgaande en de twee volgende onder dat gezin der Nagt-Kapellen, welke de Heer Linnæus met den bynaam van Phal. Noctuæ onderscheid. Men vindtze in Amboina.

Fig. E. Tirbaca. Heeft de onderzyde der vleugelen geel. Aan de onderranden is een breede donkerbruine dwarsband, gelyk de agtervleugels van boven. d'
De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Zy wordt aan de Kaap lif
de goede Hoop gevonden, en berust in
het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer
C. van Lennep.

Fig. F. Collusoria. Van onder zyn de vleugelen donkergeel. De tippen der voorste bruin, en met twee zwarte donkerbruine dwarsbanden gesierd. Men vindtze in Surinamen, en is getekend naar een uit het laatstgenoemde Kabinet.

PLAAT CLXXIII.

Fig. A.B. Occidua. Op de bovenzyde der vleugelen, als mede op de agterste, van onder, heerscht een paarschagClerck, icon. Tab. 54. Fig. 6. 7.

Fig. D. Perithea. Les aîles sont fort minces & presque transparentes; sur le dessous d'un même violet pâle, tacheté de jeaune; le corps & les pattes d'un jeaune obscur; les antennes filiformes, & la trompe roulée. Elle appartient, avec la précédente & avec les deux suivantes à la famille des Phalênes, que Mr. Linnæus distingue par le nom de Phal. Nocture. On les trouve à Amboine.

Fig. E. Tirhaca. Le dessous des ailes de celui-ci est jeaune. Il y a aux bords inférieurs une large bande transversale d'un brun-obscur, comme les aîles postérieures en-dessus. Les antennes sont siliformes & la trompe est roulée. Il est du Cap de bonne Esperance & se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. F. Collusoria. En-dessous les aîles sont d'un jeaune obscur. Les pointes des antérieures sont brunes & ornées de deux bandes transversales noires d'un brun obscur. On les trouve à Suriname & celui-ci est du susdit Cabinet.

PLANCHE CLXXIII.

Fig. A. B. Occidua. Il domine sur le dessus des aîles & sur les postérieures en dessous, un chatoyant violet: ce qui n'est



				•
•				
	•			
	·			
		-		
奖.				
•			•	
	••			
	,			
				ŧ

		-	
			6
	•		
• ((())			
		·	
			•
		•	
	•		
		•	
	•		
	-		
		•	
			•
,			
	•	·	
•			
			*



tige weerschyn, 't welk egter niet dan pourtant pas visible que dans ceux qui kan worden waargenomen. krulden zuiger. Haar woonplaats is Su- demeure est à Suriname. rinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 812. n. 14. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 1. 2. Fig. C. D. Hersilia. Deze schoone Oranjekleurige Kapel, heeft op de ondervleugels by Fig. D. twee witte zilverglanzige vlakjes. De Mannetjes zyn in kleur of tekening van dit hier afgebeeld Wyfje niet onderscheiden. wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Philea. By deze afbeelde twee witte zilverglanzige vlakjes ge- trouvent deux petites taches argentées. plaatst zyn.

Linn. Syft. Nat. pag. 764. n. 104. Pap. Dan. Candid. Röfel, inf. Tom. IV. Dan. Candid. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. Tab. 3. Fig. 5.

PLAAT CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. De groene kleur op de bovenvleugels van deze Nagt-Kapel heeft een Fluweelagtigen luister. Van onder zyn de bovenvleugels van den tip tot omtrent op de helft donkerbruin, waardoor een breede bleekgeele dwarsband loopt, het overige gedeelte is don-

in de zuiversten en minst beschadigsten sont les plus purs & les plus soigneuse-Zy heeft ment preservés. Il a des antennes filidraadvormige sprieten en een langen ge- formes & une trompe roulée longue. Sa

> Linn. Syst. Nat. pag. 812. n. 14. Phal. Attac. Clerck, icon. Tab. 54. Fig. 1. 2. Fig. C.D. Herfilia. Ce beau Papillon couleur d'Orange a sur le dessous des aîles, Fig. D. deux petites taches blanches La couleur ni le dessein argentées. des Mâles ne different en rien de la Fe-Zy melle que nous représentons ici. On le: trouve à Suriname.

Fig. E. F. Philea. Nous n'ajoutons ding behoeft geene verdere beschryving point d'autre description à cette Figure, dan dat op ieder vleugel aan de onderzy- sinon que sur le dessous de chaque aîle se

> Linn. Syst. Nat. pag. 764. n. 104. Pap. 3. Fig. 5.

PLANCHE CLXXIV.

Fig. A. Salaminia. La couleur verte des aîles supérieures de cette Phalêne est d'un lustre de velours. En-dessous les aîles sont, depuis la pointe jusques au milieu, d'un brun obscur, par où passe une bande transversale d'un jeaune pâle. Le reste est d'un jeaune obscur. Les aîles

kergeel, de ondervleugels zyn gelyk als de bovenzyde derzelven. De sprieten hebben ze draadvormig, en den zuiger gekruld. Men vindtze in China.

Clerck, icon. Tab. 48. Fig. 5. 6.

Fig. B. Materna. Heeft draadvormige sprieten en een gekrulden zuiger. De bovenvleugels zyn glanzig. Van onder is de grondkleur in 't algemeen donker-Op de voorste twee golfswyze geel. dwarsbanden, en de tippen zyn graauw. De agtersten zyn gelyk de bovenzyde derzelven in de afbeeldinge vertoont. Zy worden op de Kust van Coromandel, en ook in Surinamen gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 117. Phal. Noctua. Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 4.

Fig. C. Fluctuofa. Van onder is de grondkleur der vleugelen van deze Nagt-Kapel weinig verschillende met de bovenzyde, dan dat de tandswyze dwarsband naar de onderranden aldaar niet te zien is, doch in tegendeel zyn 'er op die plaats omtrent dertig kleine roomkleurige starswyze vlakjes onregelmatig verspreid. De sprieten heeft zy draadvormig en den zuiger gekruld. Men vindtze op de Kust van Guiné by Delmina, en ook aan de Sierra Leona.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 14. Fig. 1. Fig. D. Scolopacea. De onderzyde

inférieures sont comme leur surface supérieure. Elles ont les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve en Chine.

Clerck, icon. Tab. 48. Fig. 5. 6.

Fig. B. Materna. A des antennes filiformes & une trompe roulée. Les aîles supérieures sont luisantes. sous le fond est généralement d'un jeauneobscur. Il y a sur les aîles antérieures deux bandes transversales ondées, & les pointes sont minimes. Les postérieures sont comme le dessus dans notre Figure. On les trouve sur la Côte de Coromandel, de même qu'à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 840. n. 117. Phal. Noctua. Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 4.

Fig. C. Fluctuosa. En-dessous le fond des aîles de cette Phalêne differe fort peu de la surface supérieure, sinon que la bande transversale, vers les bords inférieurs, n'y est pas visible; mais au contraire il y a sur cet endroit environ trente petites taches couleur de crême, dispersées irregulierement. Elle a les antennes filiformes & la trompe roulée. On les trouve sur la Côte de Guinée, près de Delmina, & à la Sierra Leona.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 14. Fig. 1. Fig. D. Scolopacea. Le fond du desder yleugelen van deze Nagt-Kapel is in fous des aîles de cette Phalêne est d'un de grondkleur ligtbruin. Een donkerbruine boogswyze streep, loopt van de tippen der bovenvleugels tot aan den binnenrand by het einde van 't agterlyf. Binnen deze streep is omtrent het midden van ieder vleugel een zwartagtige vlak geplaatst. De sprieten en zuiger zyn Surinamen ontfangen.

Drury, inf. Tom, II. Tab. 22. Fig. 4.

Fig. E. Hermonia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig, en de zuiger is gekruld. Van onder is het lyf, de pooten, en de grondkleur der vleugelen bruin aschkleurig. Op de voorste vleugels zyn drie witte vlakken, twee by de buitenranden kort onder elkander geplaatst, en de derde meer naar beneden by den binnenrand; op de agtersten twee witte stippen. Zy wordt op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. F. Mygdonia. Wanneer men deze Nagt-Kapel met den kop naar het licht gekeerd beschouwt, dan heerscht op den bruinen fluweelagtigen grond een donkere blaauwe weerschyn. Van onder zyn de vleugelen bruin, met op de voorsten drie vuil-geele vlakken, ter plaatze waar dezelven van boven te zien zyn, en een vierde vlak is verder beneden-H. DEEL.

brun clair. Une raye en forme d'arc, d'un brun-obscur, va depuis les pointes des aîles supérieures, jusqu'au bord inférieur, près la pointe de l'abdomen. Presque au milieu de chaque aîle, dans cette raye, se trouve une tache noirâtre. Les antennes & la trompe sont comme gelyk by de voorgaande. Ik heb ze uit dans la précédente. Je l'ai reçue de Suriname.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 22. Fig. 4.

Fig. E. Hermonia. Les antennes de cette Phalêne sont filiformes & la trompe est roulée. En-dessous le corps, les pattes & le fond des aîles sont d'un brun minime. Il y a sur les aîles antérieures trois taches blanches, deux vers les bords extérieurs, l'une fort près au-dessous de l'autre, & la troisieme plus basse vers le bord inférieur; sur les postérieures deux points blancs. On la trouve sur la Côte de Coromandel.

Fig. F. Mygdonia. En considerant cette Phalêne, la tête tournée vers la lumiere, il domine sur le fond brun de velours, un chatoyant bleu. En-desfous les aîles sont brunes, & il y a sur les antérieures trois taches d'un jeaune sale, là où on les voit en-dessus, & une quatrieme tache est placée plus basse, vers la pointe inférieure de ces aîles. Les waarts naar den onder tip dezer vleugels antennes sont filiformes & la trompe est vormig en den zuiger gekruld. vindtze op de Kust van Coromandel.

De sprieten heeft zy draad- roulée. On les trouve sur la Côte de Men Coromandel.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 2. Fig. 1. Phal. Hyroglyphica.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 2. Fig. 1. Phal. Hyroglyphica.

PLAAT CLXXV.

Fig. A. B. Biblis. Deze franye Kapel behoort onder de ongeöogde Nimphen, en vierpootige Kapellen; zy gelykt eenigzins naar de Penthesilea, welke op de CXLVste Plaat Fig. B. C. is afgebeeld; maar de verschillende tekening doet de laatstgemelde van deze genoegzaam onderscheiden. Zy is uit China.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 6. Fig. 2.3. Houttuin, Nat. Hist. I. D. XI. St. pag. 313. Tab. 89. Fig. 4. De Koninginne Tabbaard.

Fig. C. D. Acis. Dit Schildrups-Pagetje, 't welk aan de Kaap de goede Hoop is gevangen, berust in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti. De Heer Drury verzekert dat dit Kapelletje ook in Noord-Amerika wordt gevonden, alzo zyn Ed. meld dat op den 31ste Augustus te Nieurvjork, die

CLXXV. PLANCHE

Fig. A. B. Biblis. Ce beau Papillon appartient aux Nymphes aveugles & aux Papillons tétrapedes. Il ressemble en quelque sorte à la Penthesilea, qui est représentée sur la Planche CXLV. Fig. B. C. Mais la différence du dessein distingue le dernier visiblement de celui-ci. Il est de la Chine.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 6. Fig. 2. 3. Houttuin, I. Partie, Piece XI. pag. 313. Tab. 89. Fig. 4. La Robe de la Reine.

Fig. C. D. Acis. Cette petite Tortue, qui a été prise au Cap de bonne Esperance, se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti. Mr. Drury assure que ce petit Papillon se trouve aussi dans l'Amérique Méridionale, disant qu'on en a attrapé un semblable à la Nouvelle York, le 31. Aous



zelfde was gevangen van welken Hy de dont il nous a donné la Figure. afbeelding heeft gegeven.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 2.

Fig. E. Pretus. De sprieten van dit bastert Onrustje zyn naar 't einde dikker en eindigen in een haakagtig puntje. Van onder is de kop en het Lyf wit, de pooten geel, aan de leden met wit en zwart geringd. De vleugelen zyn bleek-bruinrood van kleur. Het is getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. F. Pretus. Deze is afgebeeld naar een Mannetje van de voorgaande Fig. E. Zy worden op het Eiland St. Thomas in de Westindiën gevonden. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen heeft my deze ter afbeelding geleend.

Fig. G. H. Eresimus. De voorste pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Aan de Mannetjes ontbreekt dat zwartagtige ringetje 't welk op beide zyden der ondervleugels aan de tweede ader by den binnenrand geplaatst is. Volgens de verdeeling van den Heer Linnæus zou ze onder de bonte Danaus-Kapellen moeten geplaatst worden. Men vindze in Surinamen.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 36. Fig.

Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 2.

Fig. E. Pretus. Les antennes de ce petit Sphinx-belier font plus grosses vers le bout, & finissent par une pointe en forme de crochet. Au-dessous la tête & le corps sont blancs, les pattes jeaunes, & bordées de blanc & de noir vers les jointures; les aîles sont de couleur brunrouge pâle. L'Original se trouve dans la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. F. Pretus. C'est ici la Femelle du Mâle précédent, Fig. E. On les trouve dans l'Isle de St. Thomas, aux Indes Occidentales, & Mr. W. van der Meulen me l'a prêtée pour la faire dessiner.

Fig. G. H. Eresimus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & sans onglets. Les Mâles n'ont point ce petit anneau noirâtre, qui se trouve sur les deux surfaces des aîles inférieures, à la seconde veine, près le bord intérieur. Selon la division systematique de Mr. Linnæus il faudroit le ranger parmi les Danaïdes bigarrées. On le trouve à Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 36. Fig. 17. 18. Т 2

17. 18. Kleman, inf. I. Tab. 1. Fig. 1. Kleman, inf. I. Tab. 1. Fig. 1.

PLAAT CLXXVI.

PLANCHE CLXXVI.

Fig. A. Epimethea. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd; de zuiger is onzigtbaar. In 't midden van de oogswyze Oranjekleurige vlak is een wit doorschynend halvemaanswys vlakje. Van onder hebben de vleugelen dezelfde kleur en tekening als de bovenzyde, maar het groote oog op de agtervleugels is daar niet te zien. Deze is een Mannetje van het door den Heer Drury afgebeeld Wysje. Zy worden op de Kust van Guine gevonden, en de afbeelding is ontleend naar een uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers.

Drury, inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 1.

Fig. B. Phyllus. De witte vlakken op de bovenvleugels van dit Dikkop-Kapelletje zyn doorschynend. Het is uit Surinamen en berust met de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen in de talryke Verzameling van zeldzame Insecten van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. Talus. De groene kleur aan den kop, het lyf, en een gedeelte der vleugelen bestaat uit glinsterende hairtjes.

Fig. A. Epimethea. Les antennes de cette Phalêne sont filisormes; la trompe est imperceptible. Au centre de la tache oeillée couleur d'Orange se trouve une petite tache transparente, en sorme de demi Lune. Au-dessous les aîles ont la même couleur qu'au-dessus, mais le grand oeil sur les aîles postérieures n'y est pas visible. Celle-ci est un Mâle de la Femelle dont Mr. Drury a donné la Figure. On les trouve sur la Côte de Guinée, & nous l'avons représenté d'après l'original du Cabinet de Mr. A. Gevers.

Drury inf. Tom. II. Tab. 13. Fig. 1.


Fig. B. Phyllus. Les taches blanches des aîles supérieures de ce petit Plebeien noble sont transparentes. Il est de Suriname, & se trouve avec les autres Papillons de cette Planche dans la nombreuse Collection de rares Insectes de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. Talus. La couleur verte de la tête, du Corps & d'une partie des alles, est composée de petits poils luisants.



			a.	
			TE.	
:3	1.0. 1.0.		Œ	
,				
	7			
		(F)		

		·
	,	
	,	
•		



De donkergeele vlakken en stippen op de bovenvleugels zyn doorschynend. Van onder is de grondkleur der vleuge-1en ligtbruin met weinig van die groeneglinsterende hairtjes bezet. Naar de onderranden der agtervleugels is een graauwe golvswyze tekening. Zy worden in Surinamen gevonden.

Fig. E. Phineus. De geele tekening op de onderzyde der vleugelen is niet zo schoon van kleur dan van boven, doch voor 't overige niet onderscheiden. Zy word nevens de twee volgende in Surinamen gevonden.

Fig. F. Ismarus. Dit Schildrups-Pagetje heeft de bovenzyde der vleugelen fchoon donkerblaauw van kleur en glanzig, met zwarte randen, en op de bovenvleugels omtrent het midden een zwarte ronde vlak.

Het lyf met de Fig. G. Lucagus. beide zyden der vleugelen van deze Dikkop-Kapel is donkergroen en glanzig, 't einde van het agterlyf is een Carmozynrood hairagtig kwastje.

PLAAT CLXXVII.

Fig. A. B. Torquatus: Deze Pagie behoort onder de zogenaamde Grieksche Ridder-Kapellen van den Heer Linnæus. De blaauwe vlakjes op de ondervleugels Les taches & les points jeaunes-obscurs des aîles supérieures sont transparentes. Au-dessous le fond des aîles est d'unbrunclair, & garni d'un petit nombre de ces petits poils luisants; vers les bords inférieurs des aîles postérieures se trouve un dessein gris ondé. On les trouve à Suriname.

Fig. E. Phineus. Le dessein jeaune fur le dessous des aîles n'est pas si beaus que celui du-dessus, mais au reste il n'y a point de différence. On le trouve avec le suivant à Suriname.

Fig. F. Ismarus. Le dessus des aîles de cette petite Tortue, est d'une belle couleur bleue obscure & luisante, avec des bords noirs, & fur les ailes supérieures, vers le milieu, une tache ronde noire.

Fig. G. Lucagus. Le corps & les deux surfaces des aîles de ce Plebeien noble, font d'un vert obscur & luisant, aves met een blaauwagtigen weerschyn. Aan un chatoyant bleudtre. A la pointe de l'Abdomen se voit une petite tousse d'un rouge cramoisi & en forme de cheveux.

CLXXVII. PLANCHE

Fig. A. B. Torquatus. Ce Page appartient aux Chevaliers Grecs de Mr. Linnæus. Les petites taches bleues des aîles inférieures, Fig. B. font luifantes. T 3.

by Fig. B. zyn glanzig. Men vindtze in *Surinamen*, en deze beruft nevens alle de overige op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in het uitmuntende Kabinet van den Wel Ed. Heer *W. van der Meulen*.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

Fig. C. D. Hypsipyle. Deze behoort onder de gestrekte of Parnas-Kapellen. Zy heeft de voorste pooten kort en zonder nagels. Zy wordt in Surinamen gevonden.

Fig. E. Erycinia. Deze wederzyds eveneens gekleurde Kapel behoort onder de Danaiissen. Zy heeft zes volmaakte pooten, allen met nagels voorzien. Men heeft ze in Surinamen gevonden.

Fig. F. Amatbusia. De blaauwe tekening op de ondervleugels is glanzig. Van onder komt zy volmaakt overeen met de Quirina *, welke in 't Eerste Deel op de LXVste Plaat Fig. A. B. is afgebeeld. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort, stomp, en zonder Nagels. Men kan ze wegens de langwerpige gestrekte vleugelen en het lange agterlys, met recht onder de Parnas-Kapellen plaatzen. De Wel Ed. Heer W. van der Meulen heeft ze uit Surinamen ontvangen.

On les trouve à Suriname & celui-ci se trouve, avec tous les autres Papillons de cette Planche, au riche Cabinet de Mr. W. van der Meulen.


Seba, Tom. IV. Tab. 7. Fig. 21. 22.

Fig. C. D. Hypsipyle. Celui-ci appartient aux Muses à aîles oblongues. Ses pattes antérieures sont courtes & sans onglets. On le trouve à Suriname.

Fig. E. Erycinia. Ce Papillon, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux Danaïdes. Il a six pattes completes, toutes pourvues d'onglets. On l'a trouvé à Suriname.

Fig. F. Amathusia. Le dessein bleu sur les aîles inférieures est luisant. Endessous il ressemble parfaitement à la Quirina *, représentée dans la Premiere Partie, Planche LXV. Fig. A. B. Celui-ci n'a que quatre pattes ambulantes, tandis que les deux antérieures sont courtes, obtuses & sans onglets. On peut le placer à juste titre parmi les Muses, en consequence des aîles oblongues & du long Abdomen. Mr. W. van der Meulen l'a reçu de Suriname.

	35		
		•	
			0.
	•		
·			



UITLANDSCHE KAPELLEN.

* De Heer Linnæus beeft deze Pap. Quirina in deszelfs Mantissa Plantarum altera, op pag. 536. onder de benaaming van Pap. Doris opgegeven, 't welk ons te voren ontglipt was.

PLAAT CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. Deze is het Wyfje van die Kapel welke in het Eerste Deel op de LXste Plaat Fig. C. is afgebeeld. De geele ondervleugels, en het gemis van de witte streep aan den buitenrand der bovenvleugels by de gewrigten, maken byna al het onderscheid uit met het laastgemelde Mannetje. Van onder zyn de vleugelen eveneens gelyk de afbeelding op de bovenzyde vertoont. De sprieten eindigen in een haakagtig puntje, even gelyk die der zogenaamde Bosch-Kapellen * en Dikkoppen. Zy is in Surinamen gevangen, en berust thans in het Kabinet van den Heer L. Juliaans.

* Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. en XVIII.

Fig. B. Nechus. De onderzyde der vleugelen van dezen Pylstaart is in de grondkleur donker aschgraauw, dewelke naar het lyf of by de gewrigten in donker geel, met een mengeling van bruinrood, verandert. De zuiger is lang. Zy worden in de Westindiën gevonden, en deze is my door den Heer L. Juliaans ter as beelding geleend.

* Mr. Linnæus nous a donné ce Pap. Quirina, dans fon Mantissa Plantarum altera, pag. 536. fous le surnom de Pap. Doris, ce qui nous étoit alors échapé.

PLANCHE CLXXVIII.

Fig. A. Cronis. C'est ici la Femelle du Papillon, représenté dans la Premiere Partie, Planche LX. Fig. C. Les aîles inférieures jeaunes & le défaut de la raye blanche, au bord extérieur des aîles supérieures, vers leurs jointures, font presque toute la différence entre ce dernier Mâle. En-dessous les aîles sont semblables au dessus de la Figure. Les antennes finissent par une petite pointe en forme de crochet, justement comme celles des Papillons des bois * & des Plebeiens nobles. On l'a pris à Suriname & il se trouve maintenant au Cabinet de Mr. L. Juliaans.

* Pap. Dedalus. Icarus, &c. Pl. I. &. XVIII.

Fig. B. Nechus. Le fond du-dessous des aîles de ce Sphinx est d'un gris de cendre obscur, qui, vers le corps, ou près les jointures, se change dans un jeaune obscur, avec un melange de rouge brun. La trompe est longue. On les trouve aux Indes Occidentales, & Mr. L. Julians, me l'a prêté pour le faire dessiner.

Fig. C. Eurocilia. De beide zyden kleur noch tekening. Het lyf is van onder geel; de sprieten zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Zy is uit de Westindiën, en berust in de laastgemelde Verzameling.

Fig. D. Phereclus. Op de onderzyde der vleugelen heerscht een schoone paarsche weerschyn; voor 't overige is daar geen onderscheid met de bovenzyde in kleur noch bandswyze vlak op de bovenvleugels. Het is een vierpootig Kapelletje, 't welk door den Heer Linnaus onder de onedele Veldburgers geplaatst is. Men vind het in Surinamen.

Linn. Syft. Nat. pag. 792. n. 248. Pap. Pleb. Rural. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 8.9.

Fig. E. Perdica. De sprieten van dit Spanrups-Kapelletje zyn sterk gepluimd; de zuiger is klein, en de kleur der vleugelen is aan beide zyden eveneens. Het is uit Bengalen en berust in de Verzameling van den Wel Ed. Hooggeleerden Heer Profr. P. Luchtmans.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 8. Fig. 5.6. Fig. F. Anaphus. Van onder zyn de vleugelen aan de bovenzyden derzelven volmaakt gelyk. Het is een Dikkop-Kapel, welke in Surinamen worden gevonden en is nevens de volgende getekend uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. C. Eurocilia. Les deux surfaces der vleugelen zyn niet onderscheiden in des ailes ne different point en couleur ni en dessein. En-dessous le corps est jeaune; les antennes sont plumacées & la trompe est roulée. Il est des Indes Occidentales & se trouve dans la Collection susmentionnée.

> Fig. D. Phereclus. Le dessous des ailes brille d'un beau chatoyant violet; au reste il n'y a point de différence avec le dessus, ni pour la couleur, ni pour la tache en forme de bande sur les aîles supérieures. C'est un petit Papillon tétra. pede, que Mr. Linnæus a placé parmi les Plebeiens communs. On le trouve à Suriname.

> Linn. Syst. Nat. pag. 792. n. 248. Pap. Pleb.Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 8.9.

> Fig. E. Perdica. Les antennes de cette petite Phalène arpenteuse sont fortement plumacées; la trompe est petite & la couleur des aîles est la même sur les deux surfaces. Elle est de Bengale, & se trouve dans la Collection de Mr. le Profr. P. Luchtmans.

Seba, Tom. IV. Tab. 8. Fig. 5. 6. Fig. F. Anaphus. Le dessous des aîles ressemble parfaitement à la surface supérieure. C'est un Plebeien noble, qui se trouve à Suriname, & il est, avec le suivant, de la Collection de Mr. le Minifire E. F. Alberti.






Fig. G. Cebrenus. Alle de geele vlakken en stipjes op de bovenvleugels van deze Dikkop-Kapel zyn doorschynend. De grondkleur, van onder, is meer aschgraauw, doch zonder geel gemengd. Men vindze in Surinamen.

PLAAT CLXXIX.

Fig. A.B. Codrus. De donkere kleur op de bovenzyde der vleugelen van deze Pagie of Grieksche Ridder-Kapel heeft een groenen weerschyn. De bleekgroene vlakken op de voorste vleugels zyn doorschynend. Zy worden op het Molukkische Eiland Amboina gevonden, en berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Kapellen in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Fig. C. Gentius. Het lyf, met de vleugels van dezen Dikkop zyn in alles gelyk in kleur, en geele vlakken, aan de bovenzyde. Men vindze in Surinamen.

Fig. D. Procas. Deze geele met zwart gerande Dikkop-Kapel, is gelyk de Gentius aan beide zyden van 't lyf, en de vleugelen volmaakt eveneens gekleurd, en word nevens de volgende Figur in avec la Figure suivante à Suriname. Surinamen gevonden.

Fig. E. F. Arcas. De blauwe kleur ven zyn eenigzins doorschynend. Zy be- peu transparentes. hoort onder de Argus-Kapelletjes. (Pap. Argus. (Pap. Pleb. Ruralis.) Pleb. Ruralis.)

II. DEEL.

Fig. G. Cebrenus. Toutes les taches jeannes & les petits points des aîles supérieures, de ce Plebeien noble, sont transparentes. Le fond, en-dessous, est plus minime, mais sans melange de jeaune. On les trouve à Suriname.

PLANCHE CLXXIX.

Fig. A. B. Codrus. La couleur obscure du dessus des aîles de ce Page ou Chevalier-Grec, a un reslet vert. Les taches d'un vert pâle des aîles antérieures sont transparentes. On les trouve à Amboine, une des Isles Molucques, & celuici, avec tous les autres Papillons de cette Planche se trouve au Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. C. Gentius. Le corps & les aîles de ce Plebeien noble sont entierement conformes, en couleur & en taches jeaunes, sur le dessus. On le trouve à Suriname.

Fig. D. Procas. Ce Plebeien jeaune, Lordé de noir, est comme le Gentius, ayant sur les deux surfaces du Corps parfaitement la même couleur; & on le trouve

Fig. E. F. Arcas. La couleur bleue op de bovenzyde der vleugelen is niet du dessus des aîles n'est point luisante, glanzig, maar de witte vlakken op dezel- mais les taches blanches y sont tant soit Il appartient aux

PLAAT CLXXX.

Fig. A. Hegesippus. In kleuren en tekening zyn beide zyden der vleugelen aan elkander gelyk. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. Zy onderscheid zig van de overige zogenaamde kaneel-kleurige Kapellen, doordien de ondervleugels in 't midden niet, gelyk de voorsten ligt-bruinrood, maar wit getekend zyn. Men heeft ze met Fig. B. op de West-Kust van Sumatra ontdekt, en van daar zyn ze in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heer Baron Rengers gezonden.

Fig. B. Theseus. Deze Pagie-Kapel, zou volgens de verdeeling van den Heer Linnæus onder de Trojaansche-Ridders behooren. Van onder zyn geene roode vlakken aan de borst, en de kleur en tekening der vleugelen is niet onderscheiden met die op de bovenzyde.

Fig. C. D. Amulia. Heeft op de bovenzyde der vleugelen een violet-kleurigen weerschyn; de voorste pooten zyrkort en in de gedaante als kwastjes tegens de borst der Kapel geplaatst. Zy behoort by de geöogde Nimph-Kapellen en is op de Kust van Afrika aan de Sierra Leona gevangen.

Fig. E. F. Ariadne. Deze geöogde Nimph-Kapel heeft op beide zyden der vleugelen een schoone roozekleurigen weerschyn. Zy is eene vierpootige, welke in Surinamen word gevonden.


PLANCHE CLXXX.


Fig. A. Hegesippus, Les deux surfaces des aîles se ressemblent en couleurs & en dessein. Les pieds antérieurs sont courts & sans onglets. Il se distingue des autres Papillons, couleur de canelle, en ce que les aîles inférieures, au milieu, ne sont point, comme les supérieures, d'un brun-rouge clair, mais d'un dessein blanc. On l'a decouvert, avec la Figure B. sur la côte Occidentale de Sumatra, d'où on les a envoyé au Cabinet de Son Excellence Mr. le Baron Rengers.

Fig. B. Theseus Ce Page appartient, d'après la division de Mr. Linnæus, aux Chevaliers Troyens. En dessous il n'y a point de taches rouges à la Poitrine, El la couleur ni le dessein des aîles ni differe point de la surface supérieure.

Fig. C. D. Amulia. Celui-ci a fur le dessus des aîles un chatoyant violet. Les pattes antérieures sont courtes & appliquées à la poitrine en forme de tousses. Il appartient aux Nymphes à yeux, & on l'a pris sur la Côte de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Fig. E. F. Ariadne: Les deux surfatces des aîles de cette Nymphe à yeux ont un beau chatoyant couleur de rose. Elle est tétrapede & se trouve à Suriname.





***		· .	
		• .	
		· ·	
			· .
	0.00		



PLANCHE CLXXXI.

Fig. A. B. Deiphobus. De blaauwe streepen op de ondervleugels van deze Trojaansche Ridder-Kapel, bestaan uit glinsterende schubbetjes. De Mannetjes hebben gemeenlyk de Oranje-kleurige tekening op de onderzyde der vleugelen bleek-geel, daar in tegendeel de Wysjes, naar welke deze afbeelding gemaakt is, met donker of hoog-oranje kleurige vlakken gesierd zyn. Zy worden op het Molukkische Eiland Amboina gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 746. n. 7. Pap. Eq. Trojan. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 47. Fig 5.6. Clerck, icon. Tab. 25. Fig. 1. 2.

Fig. C. Archias. Van boven hebben de vleugelen eene bleek roode-kleur, met een blaauwagtigen weerschyn. Aan de onderranden der agtervleugels is een klein zwart vlakje. Het behoort onder de Argus-Kapelletjes. (Pap. Pleb. Rural.) Men vind ze in Surinamen, en is nevens de drie volgende afgebeeld uit de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti.

Fig. D. Labda. De sprieten van dit Nagt-Kapelletje, zynsterk gepluimd. De zuiger is gekruld. Van onder is de kleur der vleugelen met de bovenzyde derzelven niet onderscheiden. Het is in Su-II. DEEL.

Fig. A.B. Deiphobus. Les rayes bleues des aîles inférieures de ce Chevalier-Troyen, sont composées d'atomes luisants. Le dessein, couleur d'orange, sur la surface inférieure des aîles des Mâles, est ordinairement d'un jeaune pâle, tandis que les taches des Femelles, comme celle que nous représentons ici sont, d'un orange plus fort. On les trouve à Amboine, une des Isles Molucques.

Linn. Syft. Nat. pag. 746. n. 7. Pap. Eq. Trojan. Seba, Tom. IV. tab. 47. Fig. 5. 6. Clerck, icon. Tab. 25. Fig. 1.2.

Fig. C. Archias. Au-dessus les aîles sont d'un rouge pâle, avec un chatoyant bleuâtre. Aux bords inférieurs des aîles postérieures, se voit une petite tache noire. Il appartient aux Argus (Pap. Pleb. Rural.) On les trouve à Suriname & celui-ci avec les trois suivants sont dessinés d'après les originaux de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti.

Fig. D. Labda. Les antennes de cette petite Phaléne sont fortement plumacées. La trompe est roulée. La couleur des alles en-dessous ne differe point de celle du dessus. Il est de Suriname.

X

rinamen gevangen.

Fig. E. Icafia. Heeft gepluimde sprieten, en een gekrulden zuiger. De bleekgraauwe of vuilwitte kleur der vleugelen is doorschynend, zonder donsagtige schubben; maar wanneer men dit gedeelte door een vergrootend glas beschouwt, dan is het met een menigte korte hairtjes be-Van onder is het Lyf wit, maar de vleugelen in alles gelyk aan de boven zyde. Zy wordt in Surinamen gevonden.

Fig. F. Encelada. De onderzyde der vleugelen van deze Nagt-Kapel komt in kleur en tekening met de bovenzyde derzelven overeen, uitgezonderd dat daar de kleuren bleek en minder duidelyk geplaatst zyn. De sprieten heeft zy gepluimd, en den zuiger gekruld. Zy is uit Surinamen.

PLAAT CLXXXII.

Fig. A. B. Achates. Van deze Pagies vindt men eene verscheidenheid, welke de roode vlakken aan beide zyden der vleugelen geel van kleur, en de witte tekening op de ondervleugels onderscheiden geplaatst hebben. Zy behoort onder de Trojaansche Ridder-Kapellen, en gelykt, behalven de gestaarte ondervleuit Eerste Deel op de XXXIste Plaat Fig. A. is afgebeeld. Ik hebze uit China ont-

Celle-ci a des anten-Fig. E. Icafia. nes filiformes & une trompe roulée. Le minime pâle ou la couleur blanche sale des aîles est transparente, sans écailles farineuses; mais quand on considere cette partie par un Microscope, on y apperçoit une infinité de petits poils. Endessous le corps est blanc, mais les aîles sont entierement conformes à la partie supérieure. On la trouve à Suriname.


Fig. F. Encelada. Le dessous des aîles de cette Phalène ressemble en couleur & en dessein à leur surface supérieure, à l'exception que les couleurs y sont pâles & moins visibles. Ses antennes sont filiformes & sa trompe est roulée. est de Suriname.

> CLXXXII. PLANCHE

Fig. A. B. Achates. On trouve parmi ces Pages une variété, dont les taches rouges des deux surfaces des aîles sont jeaunes, & dont le dessein blanc des aîles inférieures est placé différemment. Il appartient aux Chevaliers Troyens, & outre les aîles inférieures à queues, il ressemble beaucoup au Pap. Agenor, que gels, veel naar den Pap. Agenor, welke in nous avons représenté dans la Premiere Partie, Planche XXXI. Fig. A. Je l'ai reçu de la Chine, mais on les trouve pa-



ė					
	600				
	74.1		100		
	***	2 - -			
				•	



fangen, doch zy worden ook op het Eiland Java en op Kust van Coromandel gevonden.

Sulzer, Gesch. Ins. pag. 24. Tab. 12. Fig. 2. hier is eene Varieteit afgebeeld.

Fig. C. D. Pretus. De groene vlakken op den Fluweel-zwarten grond der bovenvleugelen van deze Argus-Kapel zyn glanzig. Van onder hebben de agter vleugels een bleek rooden weerschyn. Zy berust in de Verzameling van den Wel Eerw. Heer E. F. Alberti, en is op de Kaap de goede Hoop gevangen.

Fig. E. F. Alpheus. De roode bandswyze vlak van boven op de vleugelen is eenigzins glanfig. Zy behoort onder de zespootige Kapellen, en kan gelyk de Pap. Pretus onder de Argusjes (Pap. Pleb. Rural.) geplaatst worden. Men vindtze aan de Kaap de goede Hoop, en ze berust in de laatstgenoemde Verzameling.

PLAAT CLXXXIII.

Fig. A. B. Xantus. Wegens de ongekartelde vleugel-randen, moest deze Kapel, volgens de verdeeling van Linnæus, onder de Bonte Danaüssen geplaatst worden, daar zy egter, om de oogswyze vlakken op de onderzyde der vleugelen, beter met die op de volgende Plaat Fig. B. C. by de geöogde Nimph-Kapellen zou behooren: te meer, daar men anders by

pareillement sur l'Ile de Java & sur la Côte de Coromandel.

Sulzer, pag. 24. Tab 12. Fig. 2. Nous avons représenté ici une variété.

Fig. C. D. Pretus. Les taches vertes sur le fond noir de velours des aîles supérieures de cet Argus, sont luisantes. En-dessous les aîles postérieures ont un chatoyant d'un rouge pâle. Il est de la Collection de Mr. le Ministre E. F. Alberti, qui l'à reçu du Cap de bonne Esperance.

Fig. E. F. Alpheus. La tache rouge en forme de bande sur les aîles supérieures, est tant soit peu luisante. Il appartient aux Papillons sixpedes, & on peut le ranger, comme le Pretus, parmi les Argus (Pap. Pleb. Rural.) On le trouve au Cap de bonne Esperance & il est de la Collection susmentionnée.

CLXXXIII. PLANCHE

Fig. A. B. Xantus. En vertu des bords des aîles non-dentelées, il faudroit placer ce Papillon, selon la Division de Mr. Linnæus, parmi les Danaïdes bigarrées; tandis qu'il appartiendroit, à plus juste titre, aux Nymphes à yeux, de même que celui de la Planche suivan-Fig. B. C. & cela en vertu des taches oeillées de la surface inférieure des aîles; onderscheide gezinnen der Dag-Kapellen, geöogde en ongeöogde Kapellen, nevens elkander zoude moeten plaatsen; en het door den Heer *Linnæus* opgegeven kenmerk der uitgetande of effen vleugel-randen geen genoegzaam en bepaald kenteken kan genaamd worden.

Aan de Mannetjes ontbreekt gemeenlyk de bruin orange-kleurige dwarsband op de bovenvleugels by Fig. A. doch in zommige is die fmaller en byna donkerrood-bruin. Zy gebruikt maar vier pooten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort en ruig. Men vindze in Surinamen, en ze is afgebeeld uit het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 122. Pap. Dan. Festiv. Scha, Schatk. Tom. IV. Tab. 11. Fig. 8. 9. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Eumea. Deze Kapel behoort mede onder de vierpootigen en kan een plaats by de ongeöogde Nimphen beflaan. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen staan eenigzins verheven en zyn min of meer glanzig, naar maate de Kapel zuiver of gaaf is. Zy word in China gevonden en berust in het laastgemelde Kabinet.

Drury, Inf. Tom. I. Tab. 2. Fig. 3. Fig. E. F. Antilope. Deze ongeöogde Nimph-Kapel wordt op het Molukki-

de plus encore, parce qu'il faudroit placer autrement, dans les différentes Familles des Papillons, les Nymphes à yeux & les Nymphes aveugles au même rang; & parce que le caractere distinctif que Mr. Linnæus a établi dans les bords dentelés ou unis des aîles, ne sauroit passer pour une marque positive & suffisante.

On n'apperçoit ordinairement point dans les Mâles la bande transversale couleur d'orange brunâtre sur les aîles supérieures, de la Fig. A. mais dans quelques-uns elle est plus étroite & presque d'un brun rouge obscur. Il n'a que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes & touffues. On le trouve à Suriname & il est du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Linn. Syst. Nat. pag. 767. n. 122. Pap. Dan. Festiv. Seba, Tom. IV. Tab. 11. Fig. 8.9. Clerck, icon. Tab. 34. Fig. 1.2.


Fig. C. D. Eumea. Ce Papillon est pareillement tetrapede & on peut le placer parmi les Nymphes aveugles. Les taches blanches sur le dessous des aîles sont tant soit peu élevées & plus ou moins luisantes, selon que le Papillon a été bien conservé. On le trouve en Chine, & il est du Cabinet susmentionné.

Drury, Inf. Tom. I. Tab. 2. Fig. 3. Fig. E. F. Antilope. Cette Nymphe aveugle fe trouve à Amboine, une des

•				
		·		
	ė			•
ě.		M		
		-		
	`			

.

-



UITLANDSCHE KAPELLEN.

sche Eiland Amboina gevonden, en berust in de Verzameling van den Heer C. Stoll.

Iles Molucques, & elle est de la Collection de Mr. C. Stoll.

PLAAT CLXXXIV.

Fig. A. Labrusca. Wanneer deze Pylstaart eenigen tyd in de Cabinetten bewaard wordt, dan verandert gemeenlyk de groene kleur van 't Lyf en der bovenvleugelen in geel, in welke kleur de Heer Car. Clerck ook de afbeelding heeft gegeven. Van onder is het Lyf en de pooten donker geel, met vyf witte ronde vlakken op zyde; de vleugels zyn groenagtig-geel met twee fmalle bruine streepen, van welke zig de onderste op de bovenvleugels in twee verdeelt. Op het midden der laatstgemelde vleugels is een langwerpige don-Zy worden in Surinaker-groene vlak. men gevonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 800. n. 14. Sphinx. Merian, Surin. Tab. 34. Clerck, icon. Tab. 47. Fig. 5. 6.

Fig. B. C. Berecynthia. Aan de Wyfjes ontbreeken de twee hairagtige kwastjes, van welken op ieder ondervleugel naby het agterlyf één geplaatst is. Ook zyn de gemelde Wyfjes veel al een derde gedeelte grooter dan het hier afgebeelde Mannetje. Zy worden op Surinamen gevonden.

Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 13. Fig. 2.3.

PLANCHE CLXXXIV.

Fig. A. Labruscæ. Lorsque ce Sphinx a été conservé quelque tems dans les Cabinets, la couleur verte du corps & des aîles supérieures se change ordinairement en jeaune, & c'est dans la derniere couleur que Mr. Clerck nous en a donné une Figure. En-dessous le corps & les pattes sont d'un jeaune obscur, avec cinq taches blanches rondes à côté; les aîles sont d'un jeaune verdâtre avec deux rayes brunes étroites, dont l'inférieure se divisé en deux parties sur les aîles supérieures. Sur le milieu des aîles que nous venons de nommer se trouve une tache oblongue, d'un vert obscur. On les trouve à Suriname.

Linn. Syft. Nat. pag. 800. n. 14. Sphinx. Merian. Sur. Inf. Tab. 34. Clerck, icon. Tab. 47. Fig. 5. 6.

Fig. B. C. Berecynthia. On ne voit point dans les Femelles les deux touffes de poil, dont on en remarque une sur chaque aîle inférieure, près de l'Abdomen. Les Femelles sont ordinairement d'un tiers plus grandes que le Mâle que nous représentons ici. Ils sont de Suriname.

Seba, Tom. IV. Tab. 13. Fig. 2. 3.

Fig. D. E. Philocles. De blaauwe kleur op de bovenzyde der vleugelen van dit Gras-Kapelletje of geöogde Nimph, is glanzig. Het wordt nevens de volgende in Surinamen gevonden.

Fig. F. Philocles. Deze schynt my toe het Wysje van Fig. D. E. te zyn. Van onder zyn de vleugelen eveneens getekend als op de bovenzyde derzelven. Linnæus heeft dit Kapelletje by de Argusjes geplaatst.

Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 240. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 5. 6.

Fig. G. Thymetus. De onderzyde der vleugelen van dit Kapelletje is niet onderscheiden met de afbeelding. In gedaante komt zy veel overeen met de naastvoorgaande, en die welke op de XCIIste en XCIIste Plaaten zyn afgebeeld. Het zyn vierpootige Kapellen.

PLAAT CLXXXV.

Fig. A. fairus. In 't Eerste Deel, Plaat VI. Fig. A. B. is eene Kapel afgebeeld, dewelke maar van deze alleen is onderscheiden in de verschillende kleur en tekening der oogswyze vlakken op de ondervleugels. Thans geven wy de afbeelding van die tweede soort, van welke wy in 't voornoemde Deel bladz. 9. gemeld hebben. De hier afgebeelde is

Fig. D. E. Philocles. La couleur bleue du dessus des aîles de cette Nymphe à yeux, est luisante. On la trouve avec la suivante à Suriname.


Fig. F. Philocles. Celle-ci me semble être la Femelle de la précédente Figure D. E. Le dessous des aîles est du même dessein que le dessus. Linnæus a placé ce petit Papillon au rang des Argus.

Linn. Syst. Nat. pag. 791. n. 240. Pap. Pleb. Ruralis. Clerck, icon. Tab. 45. Fig. 5. 6.

Fig. G. Thymetus. Le dessous des aîles de ce petit Papillon ne differe point de notre Figure. Pour la forme il ressemble beaucoup au precèdent, & à ceux qui sont représentés sur les Planches XCII. & XCIII. Ce sont des Papillons tétrapedes.

PLANCHE CLXXXV.

Fig. A. Jairus. Nous avons représenté un Papillon, dans la Premiere Partie, Planche VI. Fig. A. B. qui dissere simplement de celui-ci dans la différente couleur & dans le dessein des taches oeillées sur les aîles inférieures. Maintenant nous donnons la Figure de cette seconde espece, dont nous avons fait mention dans la ditte Partie, pag. 9. Celui-



		×-			
•			-		
					, a
					1
			, .		
			10.943		
					. S
				*	
		162			
			Twi III	W	
	·				•
		- //17	·		
		• . •			
				7.	,
			, .		
	,				

naar een Mannetje, welk van boven op de vleugelen eveneens gekleurd is, en met twee dergelyke oogswyze vlakken op de ondervleugels praalt als de volgende.

Fig. B. C. Jairus. Deze is het Wyfje van de voorgaande Kapel. Zy gebruiken maar vier poten om mede te loopen, zynde de twee voorsten kort, stomp en zonder nagels. De Heer Linnæus haalt deze Kapel, welke door den Heer Car. Clerck is afgebeeld, op deszelfs beschryving van de Pap. Cassa * aan, daar de laatste egter eene Surinaamsche, en van de eerste zeer verschillende soort is. Zy worden op het Eiland Amboina gevonden, en berusten in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.

Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. Pl. CV. Fig. A. B. en Pl. CVI. Fig. A.

Fig. D. Hipparchia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig. Het is een Wyfje; maar de Mannetjes hebben gepluimde sprieten. Aan beide Sexe is de zuiger kort en niet zeer zigtbaar; de voorste pooten hebbenze met lange haairtjes bezet. Van onder is de kleur van 't lyf en der vleugelen bleek paarschagtig. Men vindze in Surinamen. Zy is nevens C. van Lennep.

ci représente un Mâle, dont les dessus des aîles ont les mêmes couleurs, & qui a deux taches oeillées sur les aîles inférieures, semblables à celles de la Figure suivante.

Fig. B. C. Jairus. C'est ici la Femelle du Papillon précédent. Ils n'ont que quatre pattes ambulantes, les deux antérieures étant courtes, obtuses & sans onglets. Mr. Linnæus allegue ce Papillon, qui c été représenté par Clerck, lorsqu'il donne la description du Pap. Cassia *; tandis que la derniere est de Suriname & tout à fait différente de la premiere espece. On les trouve dans l'Isle d'Amboine & ils font du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Clerck, icon. Tab. 29. Fig. 3. yez la Planche CV. Fig. A. B. & Planche CVI. Fig. A.

Fig. D. Hipparchia. Les antennes de cette Phalène sont filiformes. C'est une Femelle; mais les Mâles ont des antennes plumacées. La trompe est courte dans les deux Sexes & sort peu visible. Les pattes antérieures sont garnies de petits poils longs. En-dessous la couleur du corps & des aîles est d'un violet pâle. On les trouve à Suriname. Nous la repréde overige op deze Plaat, afgebeeld uit sentons avec tous les autres Papillons het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer de cette Planche d'après ceux du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

Fig. E. Interrupta. Wegens een afgebroken zwarte streep op de bovenvleugels, schynt het dat de Heer Linnæus deze Nagt-Kapel dus genoemd heeft. De sprieten zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. Van onder hebben de vleugelen met het lyf dezelfde tekening, maar de kleur is in't algemeen meer bleek dan op de bovenzyde. Haar woonplaats is op de Kust van Coromandel.

Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 116. Phal. Noctuæ. Sultzer, Gesch. Ins. Tab. 22. Fig. 3.

Fig. F. Hermia. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn gepluimd, en de zuiger is gekruld. Van onder heeft het lyf en de vleugelen eene geelagtige graauwe kleur. Zy is uit Surinamen.

Fig. G. Lothos. Heeft de sprieten met kortehairtjes bezet, en een gekrulden zuiger. Van onder is het lyf en de vleugelen bleek-geel van kleur. Men vindze in Surinamen.

PLAAT CLXXXVI.

Fig. A. B. Jason. De voorste pooten van deze gestaarte Kapel zyn kort, ruig, en in de gedaante van kwastjes tegens de borst der Kapel geplaatst. De blaauwe vlakjes aan beide zyden der ondervleugels hebben een Satynagtigen luister. Zy is uit Smirna. En bevind zig met de ove-

Fig. E. Interrupta. En vertu de la raye noire découpée des aîles supérieures, il semble que Mr. Linnæus a nommé cette Phalêne ainsi. Les antennes sont filiformes & la trompe est roulée. En-dessous les aîles & le corps ont le même dessein, mais la couleur est généralement plus pâle que sur le dessus. Sa demeure est sur la Côte de Coromandel.


Linn. Syst. Nat. pag. 840. n. 116. Phal. Noctuæ. Sultzer, Tab. 22. Fig. 3.

Fig. F. Hermia. Les antennes de cette Phalène sont plumacées & la trompe est roulée. En-dessus le corps & les aîles ont une couleur minime jeaunâtre. Elle est de Suriname.

Fig. G. Lothos. Les antennes sont garnies de petits poils & il a une trompe roulée. En-dessous le corps & les aîles sont d'un jeaune pâle. On le trouve à Suriname.

PLANCHE CLXXXVI.

Fig. A. B. Jason. Les pattes antérieures de ce Papillon à queue, sont courtes, velues & appliquées à la poitrine du Papillon en forme de touffes. Les petites taches bleues sur les deux surfaces des alles inférieures ont un lustre satiné. Il est de Smirne & se trouve avec les autres



		1.4			
	•			·	
			- 17		
				•	
				97	
			•		
•					
	,				

		,			

	8



rige op deze Plaat afgebeelde Insecten, in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer A. Gevers.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 26. Pap. Eq. Achivi. Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 1.

Fig. C. D. Hedyle. Deze geele Danaüs-Kapel wordt in de Oostindiën gevon- jeaune se trouve aux Indes Orientales. den.

Fig. E. F. Timeus. De roode kleur op de bovenzyde der vleugelen, als mede de donker geele grond op de voorste, van onder, is glanzig, evengelyk die der Pap. Virgaurea en Pap. Phlæas met welke laatste dit Kapelletje veele overeenkomst heeft: en zy behoort gelyk deze gemelde, mede onder de Argusjes (Pap. Pleb. Ruralis.). Men vindtze in Smirna.

PLAAT CLXXXVII.

Fig. A. B. Nireus: De groenagtige blaauwe band en de vlakken, op de vleugelen van deze Dag-Kapel, zyn glanzig. De Mannetjes hebben den gemelden band helder groen van kleur. Zy worden op de Kust van Guinea aan de Sierra Leona gevonden.

Papillons de cette Planche, au Cabinet de Mr. A. Gevers.

Linn. Syst. Nat. pag. 749. n. 26. Pap. Eq. Achivi. Drury, inf. Tom. I. Tab. 1. Fig. 1.

Fig. C. D. Hedyle. Cette Danaide

Fig. E. F. Timeus. La couleur rouge sur le dessus des aîles, & le fond jeauneobscur des antérieures, en-dessous, est luisant, justement comme celui du Papillon Virgaurea & du Papillon Phleas, y ayant beaucoup de ressemblance entre ce dernier & le Papillon de notre Figure, & il appartient, comme les susdits, aux Argus, (Pap. Pleb. Rur.). On les trouve en Smyrne.

PLANCHE CLXXXVII.

Fig. A.B. Nireus. La bande bleue verdâtre & les taches des aîles de ce Papillon, sont luisantes. Les Mâles ont la dite bande de couleur verte claire. On les trouve sur la Côte de Guinée, à la Sierra Leona.

Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 28. Pap. Eq. Achivi. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 6. Fig. 21. 22. en Tab. 9. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 30. Fig. 1. 2. Drury, inst. Tom. II. Tab. 4. Fig. 1. 2.

van deze Danaüs-Kapellen zyn, van boven op 't grootste gedeelte der vleugelen bleek zwart, of donker graauw van kleur en in't midden by de gewrigten wit. Men vindt nog eene verscheidenheid, welke beide zyden der vleugelen op het midden bleekgeel hebben. Zy zyn in China en op het Eiland fava te Batavia en te Samarang waargenomen.

Clerck, icon. Tab. 38. Fig. 2. 3. Houttuin, Nat. Hift. I. D. XIde Stuk pag. 242. Pl. 88. Fig. 4. Sulzer, Gefch. Inf. Tab. 15. Fig. 8.

Fig. E. F. Jugurtha. Deze afbeelding is naar een Wyfje. Op de bovenvleugels der Mannetjes ontbreeken de zwarte vlakken welken by Fig. E. te zien zyn. De geheele oppervlakte der vleugelen op de onderzyde is eenigzints glanzig. Zy worden op de Kust van Coromandel gevonden, en deze berust in het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer C. van Lennep.


Linn. Syst. Nat. pag. 750. n. 28. Pap. Eq. Achivi. Seba, Tom. IV. Tab. 6. Fig. 21. 22. & Tab. 9. Fig. 21. 22. Clerck, icon. Tab. 30. Fig. 1. 2. Drury, inf. Tom. II. Tab. 4. Fig. 1. 2.

Fig. C. D. Antonoë. La plus grande partie du dessus des aîles des Mâles de ces Danaïdes, est d'un noir pâle, & au milieu, vers les jointures, elles sont blanches. On trouve encore une variété, dont les deux surfaces des aîles, au milieu, sont d'un jeaune pâle. On les a trouvés en Chine, dans l'Ile de Java, à Batavia & à Samarang.

Clerck, icon. Tab. 38. Fig. 2. 3. Houttuin, Hift. Nat. I Partie, XIme. Tome pag. 242. Pl. 88. Fig. 4. Sultzer, Tab. 15. Fig. 8.

Fig. E. F. Jugurtha. Cette Figure represente une Femelle. On n'apperçoit pas sur les aîles supérieures des Mâles, les taches noires que l'on voit dans la Figure E. La surface entiere des aîles, endessous, est un peu luisante. On les trouve sur la Côte de Coromandel, & celuici est du Cabinet de Mr. C. van Lennep.

•			
	,		
			å
			,
			,
	•	•	
			•
		ŕ	



PLAAT CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels wederzyds eveneens gekleurd. De onderfte zyn donkerbruin; aan de gewrigten op ieder vleugel, drie Carmozyn-roode stippen, en aan

de bovenranden ligt-geel. Men vindtze in Surinamen, en deze is my door den Wel Ed. Heer Kappelhoff, Med. Doctor,

ter afbeelding geleend.

Fig. B. Juventa. Deze aan beide zyden der vleugelen eveneens gekleurde ongeöogde Nimph-Kapel, heeft de bleekgroene vlakken eenigzins doorschynende. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Zy worden op de Eilanden Java, Amboina en op de Kust van Coromandel gevonden.

Fig. C. Periander. Op de onderzyde der vleugelen is dit gestaarte Kapelletje in de grondkleur ligtbruin; maar de witte streepen en roode vlakken zyn daar zoo geplaatst, gelyk de afbeelding van boven vertoont. Zy is uit Surinamen, en berust in het Kabinet van den Wel Ed. Heer IV. van der Meulen.

Fig. D. Bafilea. Van boven zyn de vleugelen van deze ongeöogde Nimph-Kapel getekend gelyk Fig. E; uitgezonderd dat de donker of bruingeele vlak, by

PLANCHE CLXXXVIII.

Fig. A. Cybele. Le dessous des aîles supérieures de cette Muse est de la même couleur. Les inférieures sont d'un brunobscur; vers les jointures se trouve sur chaque aîle trois points rouges cramoisi, & elles sont d'un jeaune clair aux bords supérieurs. On les trouve à Suriname & Mr. Kappelhoff, Docteur en Medécine, m'a prété celui-ci pour le faire dessiner.

Fig. B. Juventa. Les taches d'un vert pâle de cette Nymphe aveugle, dont les deux furfaces des aîles ont la même couleur, font un peu transparentes. Les pattes antérieures font courtes & fans onglets. On les trouve dans les Isles de Java, d'Amboine & sur la Côte de Coromandel.

Fig. C. Periander. Le fond du desfous des aîles de ce petit Papillon à queue, est d'un brun-clair; mais les rayes blanches & les taches rouges y sont placées comme sur le dessis de la Figure. Il est de Suriname & se trouve au Cabinet de Mr. W. van der Meulen.

Fig. D. Basilea. En-dessus les aîles de cette Nymphe aveugle sont dessinées comme la Figure E; à l'exception que la tache jeaune obscure ou brunâtre, vers les

de tippen der bovenvleugels, kleiner, en binnen de kleine geele vlak, aan den binnenrand der ondervleugels, by het agter lyf, een kleine zwarte stip geplaatst is. Alle de witte streepen en vlakken in de afbeeldinge, hebben een glans als zyde. Men vindze nevens de volgende in Surinamen.

Fig. E. F. Iphicla. De witte banden, aan beide zyden der vleugelen, als mede de vlakjes van gemelde kleur by Fig. F. zyn glanzig. Zy is zo wel als de voorgaande Fig. D. een vierpootige Kapel.

Linn. Syst. Nat. pag. 780. n. 181. Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. I. Tab. 14. Fig. 3. 4.

PLAAT CLXXXIX.

Fig. A. Erythrea. Deze Parnas-Kapel heeft de bovenvleugels, wederzyds eveneens gekleurd. De ondervleugels zyn donker bruin, aan de gewrigten met vier roode stippen, en de buitenranden met geel gesierd. Men heeft verscheidenheden, aan welken de roode streepen op de ondervleugels ontbreeken. Zy wordt in Surinamen gevonden en berust nevens de overi-

pointes des aîles supérieures, est plus petite, & que l'on apperçoit, au milieu de la petite tache jeaune, au bord inférieur des aîles en-dessous, près de l'Abdomen, un petit point noir. Toutes les rayes & les taches blanches de la Figure, ont un lustre de soye. On la trouve, avec la suivante, à Suriname.

Fig. E. F. Iphicla. Les bandes blanches des deux surfaces des aîles, comme les petites taches de la même couleur, dans la Figure E, sont luisantes. Celui-ci, aussi-bien que la Figure précédente D. est tétrapede.

Linn. Syft. Nat. pag. 780. n. 181. Pap. Nimph. Phalerat. Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 5. 6. Drury, inf. Tom. I. Tab. 14. Fig. 3. 4.

PLANCHE CLXXXIX.

Fig. A. Erythrea. Les deux surfaces des aîles supérieures de cette Muse, ont la même couleur. Les aîles inférieures sont d'un brun obscur, vers les bases avec quatre points rouges, & les bords extérieurs sont ornés de jeaune. On trouve des variétés qui n'ont point les rayes rouges sur les aîles inférieures. Il est de Suriname & se trouve avec tous



	•		
-			
			150
		201	

			•	
			·	
		b qt		
3				
	<i>:</i> .			
·				



PAPILLONS EXOTIQUES. 141

het Kabinet van den Wel Ed. Gestr. Heer Cabinet de Mr. C. van Lennep. C. van Lennep.

Fig. B. C. Myrina. De witte vlakken op de onderzyde der vleugelen van ches sur le dessous des aîles de cette Nymdeze ongeöogde Nimph-Kapel, hebben phe aveugle, ont un lustre de Nacre de een paarlemoeragtigen luister. heeftze in Noord-Amerika by Nieuwjork Septentrionale, à la Nouvelle York. gevangen.

Fig. D. E. Egialea. De Mannetjes van deze Kapellen hebben de bovenzyde der vleugelen in plaats van geel, gelyk dit Wyfje, met bleek-blaauwe vlakken, byna als de Pap. Porsenna *; maar van onder komen dezelven met Fig. E. volmaakt overeen. Het is een zespootige Kapel, welke onder de Danaüssen behoort. Men vindtze op het Eiland Java by Batavia, en te Samarang.

* Zie Pl. XLIII. Fig. D. E.

Fig. F. G. Protogenia. De bovenblaauwen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en zonder nagels. vindtze op het Eiland Java.

PLAAT CXC.

Fig. A. B. Auge. De blaauwe kleur

ge op deze Plaat afgebeelde Kapellen, in les autres Papillons de cette Planche, au

Fig. B. C. Myrina. Les taches blan-On l'a prise dans l'Amérique Men perle.

> Fig. D. E. Egialea. La surface supérieure des aîles des Mâles de ces Papillons, est, au lieu de jeaune, comme celles de cette Femelle, garnie de taches bleues pales, presque comme le Pap. Porfenna*; mais en-dessous elles ressemblent parfaitement à la Figure E. C'est un Papillon sixpede; qui appartient aux Danaïdes. On le trouve dans l'Isle de Java, près de Batavia & à Samarang.

* Voyez la Planche XLIII. Fig. D. E.

Fig. F. G. Protogenia. Les aîles suvleugels van deze ongeöogde Nimph-Ka- périeures de cette Nymphe aveugle, ont, pel hebben, by de witte vlakken, een vers les taches blanches, un chatoyant bleu. Les pattes antérieures sont cour-Men tes & sans onglets. On les trouve dans l'.Isle de Java.

PLANCHE CXC.

Fig. A. B. Auge. La couleur bleue Y_3

rondom de witte vlakken, op de bovenzyde der vleugelen van deze fraaye ongeöogde Nimph-Kapel, heerscht een heerlyken weerschyn, welke, naar maate men de Kapel naar het licht keert, in helder of donker paarsch verandert, en over den zwarten grond een Indigo-kleurigen luister verspreidt. De Mannetjes zyn een derde gedeelte kleiner dan het hier afgebeelde Wyfje. Zy behooren onder de vierpootige Kapellen, en worden op de Eilanden Java en Amboina gevonden.

autour des taches blanches, sur le dessus des aîles de cette belle Nymphe aveugle, est d'un chatoyant superbe, qui, selon la position du Papillon contre la lumiere, se change en violet clair ou obscur, & repend sur le fond noir, un lustre couleur d'Indigo. Les Mâles sont d'un tiers plus petits que la Femelle de notre Figure. Ils sont Papillons tétrapedes & se trouvent dans les Isles de Java & d'Amboine.

Clerck, icon. Tab. 21. Fig. 1. 2.

Fig. C. Mneme. Deze wederzyds men, nevens de drie volgenden, in Surimamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 756. n. 59. Pap. Heliconii. Sulzer, Gesch. Ins. Tab. 15. Fig. 3.

Fig. D. Harmonia. De bovenzyde der ondervleugels is bruin met kleine witte stippen aan de onderranden; doch voor 't overige niet onderscheiden met de hier afgebeelde onderzyde der vleugelen. Zy behoort met de volgende onder de Parnas-Kapellen.


Clerck, icon. Tab. 21. Fig. 1. 2.

Fig. C. Mneme. Cette Muse, dont eveneens gekleurde Parnas-Kapel vindt les deux surfaces ont la même couleur, se trouve avec les trois suivans à Suriname.

> Linn. Syft. Nat. pag. 756. n. 59. Pap. Heliconii. Sulzer, Inf. Tab. 15. Fig. 3.

La surface supé-Fig. D. Harmonia. rieure des aîles inférieures, est brune avec de petits points blancs aux bords inférieurs; mais pour le reste il n'y a point de différence avec la surface inférieure des aîles de notre Figure. Il appartient, avec le suivant, aux Muses ou Papillons du Parnas.

î .	



Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 29. Fig. 17. 18.

Fig. E. Callycopis. Deze dunkt my dat het Mannetje van de volgende is, beiden zyn ze van onderen donkerbruin, aan de gewrigten der agtervleugels met drie roode stippen, en de buitenranden geel gezoomd.

Fig. F. Callycopis. De verschillende tekening van den rooden vlak op de voorste vleugels, maakt alleen het onderscheid uit met de voorgaande Fig. E. als zynde elkander, van onder, in alles gelyk, behalven dat deze een Wyfje en de voorgaande een Mannetje is.

P. L A A T CXCI.

Fig. A. B. Marthefia. Op de onderzyde der agtervleugelen van deze Kapel, heerscht een donker groenagtigen weerschyn. De voorste pooten zyn kort en ongenageld. Wegens de essen en ongetande vleugelranden zou zy onder de bonte Danaüssen behooren. Men vindtze in Surinamen.

Fig. C. Melpomene. Deze Parnas-Kapel heeft de vleugelen, van onder, donkerbruin, met een roode vlak op de voorsten, en drie stippen aan de gewrigten der agtervleugels. De buitenranden zyn rieures. Les bords extérieurs sont bor-

Seba, Tom. IV. Tab. 29. Fig. 17.18.

Fig. E. Callycopis. Il me semble que celui-ci est le Mâle du suivant. dessous ils sont tous les deux d'un brunobscur; aux bases des aîles postérieures avec trois points rouges, & les bords extérieurs bordés de jeaune.

Fig. F. Callycopis. Le différent dessein de la tache rouge sur les aîles antérieures, fait seul la différence entre la Figure précédente, Fig. E. leur surface inférieure étant en tout entierement conforme, outre que notre Figure est une Femelle & la précédente un Mâle.

CXCI. PLANCHE

Fig. A. B. Marthesia. Il domine sur le dessous des aîles postérieures de ce Papillon, un chatoyant verdâtre. Les pattes antérieures sont courtes & sans onglets. En vertu des bords des aîles unies & non dentelées il appartiendroit aux Danaides bigarrées. On les trouve à Suriname.

Fig. C. Melpomene. Le dessous des aîles de cette Muse, est d'un brun-obscur, avec une tache rouge sur les antérieures, E trois points aux bases des aîles posté-

Zy behoort, gelyk alle geel gezoomd. de zogenaamde Parnas- of gestrekte-Kapellen, onder de vierpootigen. Zy is uit Surinamen.

Linn. Syst. Nat. pag. 758. n. 71. Pap. Helicon. Rösel, ins. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 6.

Fig. D. Egina. Van onder zyn de vleugelen van deze Parnas-Kapel niet onderscheiden van de bovenzyde, dan dat ry van witte stippen geplaatst is. Zy wordt nevens de volgende in Surinamen suivante à Suriname. gevonden.

Fig. E. Polymnia. Van deze Parnas-Kapel zyn veele verscheidenheden. Sommigen hebben aan de tippen der bovenvleugels een groote bleekgeele vlak, en op de ondervleugels ontbreekt die wederzydsche tandswyze band naast de agterranden: welke gemeenlyk by de Mannetjes zyn. Doch dit is geen bestendig kenmerk der Sexe, dewyl er van beide gevonden worden, welke gelyk zyn aan het hier afgebeelde Wyfje. De onderzyde der vleugelen is eveneens als van boven, behalven een ry witte stippen, waarmede de agterranden der ondervleugels gesierd zyn.

Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 58.

dés de jeaune. Elle appartient, avec tous les autres Papillons Muses ou à aîles oblongues, aux tétrapedes. Elle est de Suriname.


Linn. Syst. Nat. pag. 758. n. 71. Pap. Helicon. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 3. Fig. 6.

Fig. D. Egina. En-dessous les aîles de cette Muse ne different point de la surface supérieure, sinon qu'il y a aux bords aan de agterranden der ondervleugels een postérieurs des asles inférieures une raye de points blancs. On la trouve avec la

> Fig. E. Polymnia. Il y a beaucoup de variétés de cette Muse. Quelques unes ont aux pointes des aîles supérieures une grande tache d'un jeaune pâle, & il n'y a point sur les aîles inférieures cette bande dentelée sur les deux surfaces, à côté des bords postérieurs, qui se trouve ordinairement dans les Mâles; mais cela n'est pas une marque constante du Sexe, puisqu'on en apperçoit dans les deux Sexes, qui ressemblent à la Femelle de notre Figure. Le dessous des aîles est comme le dessus, à l'exception d'une raye de points blanes, dont les bords postérieurs des aîles inférieures sont ornés.

Linn. Syst. Nat. pag. 755. n. 58. Pap.

ž		
,		
ŕ		
		•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		
•		
	100	
		*



Pap. Heliconii. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. F. Charitonia. De grondkleur der vleugelen, op de onderzyde, is zwartgraauw. De geele vlakken loopen meer naar 't witte of bleekgeel. Aan de agterranden der ondervleugels is een dubbelde ry van witte stippen geplaatst. Zy worden in Zuid- en Noord-Amerika gevonden. Deze is te Nieuwjork gevangen.

Linn. Syst. Nat. pag. 757. n. 65. Pap. Helicon. Edw. av. Tab. 80.

PLAAT CXCII.

Fig. A. B. Phliasus. De voorste pooten van deze Dag-Kapel zyn kort en zonder nagels. Zy zou derhalven onder de ongeöogde Nimphen kunnen geplaatst worden. Men vindtze in Surinamen.

Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 9. 10.

Fig. C. Lectrix. De sprieten van deze Nagt-Kapel zyn draadvormig en de zuiger is gekruld. De afbeelding is naar een Wysje, want de Mannetjes hebben de sprieten met korte hairtjes bezet. Beide zyden der vleugelen zyn eveneens gekleurd. Zy is my ter afbeelding gegeven door Mevrouwe J. J. Chatelain geb. Smith, II. DEEL.

PAPILLONS EXOTIQUES. 145

Heliconii. Röfel, inf. Tom. IV. Tab. 5. Fig. 2.

Fig. F. Charitonia. Le fond des aîles, en-dessous, est d'un minime noir. Les taches jeaunes tirent plus sur le blanc ou sur le jeaune pâle. Aux bords postérieurs des aîles inférieures se trouve une double raye de points blancs. On les trouve dans l'Amérique Septentrionale & Méridionale. Celui-ci est de la Nouvelle-York.

Linn. Syst. Nat. pag. 757. n. 56. Pap. Helicon. Edw. av. Tab. 80.

PLANCHE CXCII.

Fig. A. B. Phliasus. Les pattes antérieures de ce Papillon sont courtes & sans onglets. En vertu de cela on pourroit le ranger parmi les Nymphes aveugles. Il est de Suriname.

Clerck, icon. Tab. 41. Fig. 9. 10.

Fig. C. Lectrix. Les antennes de cette Phalène sont filisormes, & la trompe est roulée. La Figure represente une Femelle; car les antennes des Mâles sont garnies d'un petit poil menu. Les deux surfaces des aîles ont la même couleur. Madame J. J. Chatelain, née Smith, me l'a prêtée pour la faire dessiner, puisin welker talryke Verzameling van zeldzaame Infecten, dezelve beruft, en onder meer anderen uit *China* was aangebragt.

Linn. Syst. Nat. pag. 834. n. 89. Phal. Noctuæ. Houttuin, Nat. Hist. I.D. XI. Stuk, pag. 598. Pl. 92. Fig. 5.

Fig. D. Egialea. Deze ongeöogde Nimph-Kapel, welke beide zyden der vleugelen eveneens gekleurd heeft, behoort onder de vierpootigen. Zy is op het Molukkische Eiland Amboina gevangen, doch word ook op de Kust van Afrika aan de Sierra Leona gevonden.

Fig. E. F. Feronia. Deze geöogde Nimph, is ten onregte door den Heer Linnæus voor eene zespootige Kapel opgegeven. Zy heeft maar vier volmaakte pooten, zynde de twee voorsten kort, stomp, en zonder nagels. Men vindtze byna in alle de kistjes met Insecten, welken ons uit Surinamen worden gezonden.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. n. 135. Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Schatk. Tom. IV. Tab. 38. Fig. 10. 11. Clerck, icon. Tab. 31. Fig. 1. 2. Drury, Tom. I. Tab. 10. Fig. 1. 2.

Einde von het Tweede DEEL.

qu'elle se trouve dans sa riche Collection, avec plusieurs autres, qu'elle a reçues de la Chine.

Linn. Syft. Nat. pag. 834. n. 89. Phal. Noctuæ. Houttuin, Hift. Nat. I. Partie, Tom. XI. pag. 598. Pl. 92. Fig. 5.

Fig. D. Egialea. Cette Nymphe aveugle, dont les deux surfaces ont la même couleur, appartient aux têtrapedes. Elle a été prise à l'Isle Molucque Amboine, mais on les trouve pareillement sur la Côte de l'Afrique, à la Sierra Leona.

Fig. E. F. Feronia. Cette Nymphe à yeux, a été indiquée à tort par Mr. Linnœus pour un Papillon sixpede. Elle n'a que quatre complettes, les deux antérieures étant courtes, obtuses & sans onglets. On les trouve prèsque dans toutes les caisses d'Insectes, qui nous viennent de Suriname.

Linn. Syst. Nat. pag. 770. n. 135. Pap. Nymph. Gemmati. Seba, Tom. IV. Tab. 38. Fig. 10. 11. Clerck, icon. Tab. 31. Fig. 1. 2. Drury, Tom. I. Tab. 10. Fig. 1. 2.

Fin de la Seconde PARTIE.

NAAMWYZER

VANDE

DAG- EN NAGT-KAPELLEN,

Welke in het Tweede Deel zyn afgebeeld, met aanwyzinge onder welke Geslachten dezelve, volgens de Rangschikkinge van den Heere LINNÆUS, behooren.

LISTE ALPHABETIQUE

DES

PAPILLONS ET DES PHALENES,

Qui sont représentés dans la Second Partie, où l'on indique les Classes dans lesquelles ils se rangent, selon le Système de Monsieur LINNÆUS.

ACESTE. ACHATES. ACIS. ACHELOUS. ACONTHEA. ACONYTA. ADMIRABILIS. AEGISTUS. AEROPUS. AENIPPE. AENIPPE.	A. Pl. Fig. 121. E. F. 182. A. B. 175. C. D. 111. A. 134. D.E.F.G. 131. A. 103. G. 106. C. D. 111. F. G. 105. C. D. 157. C. D.	Genus. Pap. Nymph. Phaler. — Eq. Trojan. — Pieb. Rural. Phal. Attac. Pap. Nymph. Phaler. Phal. Bomb. — Noct. Pap. Eq. Achiv. — Dan. Feftiv. — Dan. Cand.	AMPHICEDE. AMPHIX. AMULIA. ANAPHUS. ANCILLA. ANTILOPE. ANTONOE. ANUBUS. APASTUS. APIDANUS. ARCADIA. ARCAS. ARCHIAS.	Pl. Fig. 146. D. E. 134. C. 180. C. D. 178. F. 149. F. 183. E. F. 187. C. D. 128. C. 111. D. E. 137. F. G. 116. D. E. 179. E. F. 181. C.	Gen. Nymph.Phaler. Phal. Noct. Pap. Nymph.Gemm. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Dan. Cand. Sphinx. Legit. Pleb. Urbicol. Rural. Nymph. Gemm.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					Phal. Noct.
ACHELOUS.		Phal. Attac.	ANTILOPE.		Pap. Nymph. Phaler.
ACONTHEA.	134. D.E.F.G	. Pap. Nymph. Phaler.	ANTONOE.		
ACONYTA.			ANUBUS.	128. C.	- Sphiux. Legit.
ADMIRABILIS.	103. G.	Noct.	APASTUS.	111. D. E.	Pleb. Urbicol.
AEGISTUS.	106. C. D.	Pap. Eq. Achiv.	APIDANUS.	137. F. G.	Rural.
AEROPUS.		- Dan. Festiv.		116. D. E.	— Nymph. Gemm.
AENIPPE.	105. C.D.	— Dan. Cand.		179. E. F.	— Pleb. Rural.
	157. C. D.				
AGARISTA.	170. A. B.	Phal. Attac.	AREOS.	130. D.	Phal. Geomet.
AGATHINA.	167. E. F.	Pap. Nymph.Gemm.	ARIADNE.	180. E. F.	— Nymph. Gemm.
AGYRTUS.	123. B. C.	— Pleb. Rural.	ARINAS.	100. D.	Pap. Pleb. Urbicol.
ALCANOR.	166. A.	Eq. Trojan.	ARSINOE.	160. B. C.	— Nymph. Gemm.
ALCIPHRON.	133. E.	Phal. Attac.	ASSIMILIS.	154. A.	Phalerat.
ALCIPPUS.	127. E. F.	Pap. Dan. Festiv.	ASTUR.	120. B.	Phal. Bomb.
ALCMEONE.	141. E.	— Cand.	ASYLAS.	137. C.	- Noct.
ALECTO.	137. D.	Sphinx. Legit.	AUGE.	190. A. B.	Pap. Nymph. Phaler.
ALPHEUS.	182. E. F.	Pap. Pleb. Rural.	AULESTES.	128. G.	Pleb. rural.
ALSUS.	113. E.	Phal. Bomb.	AURELIUS.	168. A. B.	Eq. Achiv.
AMABILIS.	112. F. G.	Geomet.	AUSONIA.	140. C.	Phal. Pyral.
AMATHONTE.	116. D. E. F.	Pap. Dan. Cand. Helicon.		В.	
AMATHUSIA.		- Nymph.Gemm.		D.	
AMELIA. AMESIS.	136. B. C.	- Pleb. Rural.	BAJULARIA.	172. C.	Phal. Noct.
AMMON.	146. B.	Dan. Cand.	BASILEA.	188. D.	Pap. Nymph. Phaler.
AMMON.	140. D.	Dan. Cant.	Aa	1000	BEL-

	Pl. Fig.	Gen.		Pl. Fig.	Gen.
DETTA	109. C. D.	Phal. Tinea.	CUPIDO.	164. D.E.F.	G. — Pleb. rural.
BELLA.	112. A. B.	Pap. Eq. Achiv.	CYBILE.	188. A.	- Helicon.
BELUS. BERECYNTHIA		— Dan. Festiv.	CYMELA.	132. C. D.	- Nymph. Gemm.
BIANOR.	103. C.	— Eq. Trojan.	CYMODOCE.	99. G. H.	- Dan. Festiv.
BIBLIS.	175. A. B.	Nymph. Phaler.	CYNIRA.	152. C.	
BICOLORA.	143. A.	Phal. Attac.	CYPARISSA.	156. B.	Pap. Nymph. Phaler.
BISALTIDE.	102. C. D.	Pap. Dan. Festiv.		7.	
BITIAS.	104. E.	— Pleb. rural.	**	D.	
BRUNUS.	147. C.	Sphiny Adfeit.			
BUBASTUS.	149. E.	Legit.	DAPLIDICE.	170. C. D.	Pap. Dan. Cand.
BUTUS.	152. A.		DAUCUS.	125. D.	Sphinx. Legit.
			DAUNUS.	126. F.	Pap. Pleb. Urbicol.
	C.		DECIUS.	114. A. B.	- Eq. Achiv.
	•	•	DEIPHOBUS.	181. A. B.	Trojan.
CAFFRARIA.	147. F.	Phal. Noct.	DEMOPHON.	158. E.	Achiv.
CAICUS.	125. F.	Sphinx Legit.	DENTATUS.	125. G.	Sphinx Legit.
CAJUS.	146. F.		DIANA.	98. D. E.	Pap. Nymph. Phaler.
CALLITHEA.	190. C.	Pap. Helicon.	DIAPHANA.	113. G.	Phal. Pyral.
CALLYCOPIS.	190. E. F.		DIOMEDES.	122. A.	Pap. Eq. Achiv.
CALYPSO.	154. C.D.E.F.	Dan. Cand.	DOLON.	101. D. E. F.	
CAPENSIS.	167. C.	Phal. Noct.	DOLYLAS.	111. B. C.	Pap. Pleb. rural.
CARICÆ.	170. E.	Pap. Pleb. rural.	DRANCUS.	132. F.	Sphinx. Legit.
CARINENTA.	108. E. F.	Nymph. Phaler.	DRUSILLA.	109. C.	Pap. Dan. Cand.
CARINENTA.	128. F.	Phal. Geomet.	DYDIMAON.	134. A.	— Pleb. rural.
CASSIÆ.	105. A. B.	Pap. Dan. Festiv.		•••	
CASSIÆ.	106. A.	Distribution		E.	
CEBRENUS.	178. G.	Pleb. Urbicol.			
CECILIA.	159. D. E.	Nymph. Phaler.	ECCLIPSIS.	129. A. B.	Pap. Dan. Cand.
CECULUS.	146. G.	Sphinx. Legit.	EGIALEA.	189. D. E.	Nymph. Phaler.
CELADON.	132. E.	Phal. Attac.	EGINA.	191. D.	Helicon.
CELERIO.	125. E.	Sphinx. Legit.	ELATHEA.	99. C. D.	— Dan. Cand.
CENEUS.	156. F.	Pap. Pleb. rural. Phal. Geomet.	EMATHEON.	163. F. G.	Pleb. rural.
CENIS.	147. E.	Pap. Helicon.	ENCELADA. EPIMETHEA.	181. F.	Phal. Bomb. Attac.
CHARITONIA.	191. F. 137. E.	Sphinx. Legit.	EPIONE.	102. E. F.	Noct.
CHIRON. CHLOREA.	104. C.	Phal. Noct.	ERESIMUS.	175. G. H.	Pap. Dan. Festiv.
CHOREBUS.	113. D.	Pyral.	EROTUS.	104. B.	Sphinx. Legit.
CHRYSIPPUS.	118. B. C.	Pap. Dan. Festiv.	ERYCINIA.	177. E.	Pap. Dan. Festiv.
CIPRIS.	99. E. F.	- Dan. Cand.	ERYMANTHU	S.113. C.	— Eq. Achiv.
CLEOPATRA.	131. E.		ERYTHREA.	189. A.	Helicon.
CLUENTIUS.	126. A.	Sphinx Legit.	ERYX.	143. D.	Pleb. Rural.
CLYTEMNESTI		Pap. Nymph. Phaler.	ETHEOCLES.	119. D. E.	- Eq. Achiv
COCALUS.	134. B.	Phal. Noct.	EUBULE.	120. E.F.	Dan. Cand.
COCYTA.	101. A.B.C.	Pap. Nymph. Phaler.	EUGENIA.	133. F.	Helicon.
CODRUS.	179. A. B.	Eq. Achiv.		183. C. D.	- Nymph. Phaler.
COLLUSORIA.	172. F.	Phal. Noct.	EUMELUS.	156. E.	Pleb. Urbicol.
CONSPICILLAT	TOR.97. A.B.	Phal. Attac.	EURIMEDEA.	126. C. D.	Helicon,
CONSTANTIA.	133. A. B.	Pap. Nymph. Gemm.	EUPALEMON.		Dan. Festiv.
CORYTUS.	100. C.	Pap. Pleb. Urbicol.	EURIPILUS.	122. B. C.	— Eq. Achiv.
CRANTOR.	104. A.	Sphinx. Legit.	EURITEUS.	152. D. E.	Pleb. Rural.
CRASSUS.	112. C.	Pap. Eq. Achiv.	EUROCILIA.	178. C.	Phal. Attac.
CREPUSCULAI	CIS.159.A.	Phal. Attac.		-	
CREPUSCULAI	KIS,160:A.	Den Ea Ashire		F.	
CRESPHONTE	S.165. A. B.	Pap. Eq. Achiv.		_	
CRESPHONTE		Pap. Eq. Achiv.	FASCIATA.	104. D.	Phal. Geometr.
CRESUS.	142. C.	Phal. Noct.	FERONIA.	192. E. F.	Pap. Nymph. Gemmat.
CRISPUS.	118. D. E. F.	Pap. Pleb. rural. Nymph. Phaler.	FLEGIA.	140. D.	Phal. Pyral.,
CRITHEA.	138. C. D. 126. E.	Phal. Bomb.	FLUCTUOSA.	·	Por Plob Purel
CROCOS.	178. A.	Pap. Dan. Festiv.	FORMOSUS.	118. G.	Pap. Pleb. Rural.
CRONIS.	-7				

MOR-

	142
G.	Pl. Fig. Gen.
<u></u>	LACTICINIA. 128. E. Phal. Geomet.
Pl. Fig. Gen.	LACTINEA. 133. D. — Bomb.
GAMBRISIUS. 157. A. B. Pap. Eq. Achiv.	LAGUS. 117. F. G. Pap. Pleb. rural.
GEMINIA. 133. C. Phal. Geomet.	LAIS. 110. A. B. — Nymph. Phalerat.
GENTIUS. 179. C. Pap. Pleb. Urbicol.	LAMIA. 150. C.
GLAUCA. 107. E. Phal. Attac.	LAMPETIA. 148. D. E. Gemmat.
GLAUCIPPE. 164. A. B. C. Pap. Dan. Cand. GLAUCUS. 139. A. B. — Eq. Achiv.	LAOCOON. 117. A. B. C. Phal. Attac.
GLAUCUS. 139. A. B. — Eq. Achiv. GLICIRIA. 171. E. F. —	LAODAMIA. 130. A. Pap. Nymph. Gemmat.
GORGON. 142. E. Sphinx. Legit.	LAODICE. 157. E. F
GYGES. 102. B. Phai. Geom.	LEA. 151. C. D.
Total State October	LECTRIX. 192. C. Phal. Noct.
H.	LELEX. 197. C.
	LEODICE. 138. G. H. Pap. Nymph. Gemmat.
HALESUS. 98. B. C. Pap. Pleb. Rural.	LEPIDA. 130. E. Phal. Noct.
HARMONIA. 190. D. Helicon.	LEVIDA. 128. D Noct.
HARPALYCE. 145. D. E. — Nymph. Phalerat.	LICINIA. 153. E. F. Pap. Dan. Cand.
HECABE. 124. B. C. — Dan. Cand.	LICOMEDES. 158. D. — Eq. Achiv.
HECTOR. 141. A. — Eq. Trojan.	LOTHOS. 185. G. Phal. Geomet.
HEDYLE. 186. C. D. — Dan. Cand.	LOTRIX. 109. E. F. — Tinea.
HEGESIPPUS. 180. A. — Festiv.	LUBENTINA. 155. C. D. Pap. Nymph. Phalerat.
HELCITA. 129. C. Phal. Attac.	LUCAGUS. 176. G. — Pleb. Urbicol.
HELENA. 140. A. B. Pap. Eq. Trojan.	LUCILLE. 156. A. C. — Nymph. Phalerat.
HELENUS. 153. A. B. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	LYCABAS. 117. E. — Pleb. rural. LYCIDAS. 113. A. — Eq. Achiv.
HERMIA. 185. F. — Phal. Bomb. HERMONIA. 174. E. Phal. Noct.	LYCIMNIA. 105. E. F. — Dan. Cand. LYDIA. 148. C. D. — Nymph. Gemmat.
HERSILIA. 173. C. D. Pap. Dan. Cand.	LYNCIDA. 131. B. — Dan. Cand.
HIEROGLYPHICA.174.D. — Noct.	LYSIAS. 152. F. G. — Pleb. rural.
HIPPARCHIA. 185. D. Phal. Bomb.	LYSIDICe. 169. C. D. — Dan. Festiv.
HIPPODAMIA.126. B. — Attac.	
HYDASPUS. 118. A. Sphinx. Legit.	M_{ullet}
HYLARIA. 113. F. Phal. Geomet.	
HYLÆUS. 107. C. Sphinx. Legit.	MACAREA. 107. F. Phal. Noct.
HYPANIS. 142. D. Phal. Geomet.	MACARIA. 129. D
HYPERBIUS. 168. C.D.E.F. Pap. Dan. Fest.	MACROPS. 171. A. B. — Attac.
HYPHINOE. 154. B. Phal. Bomb.	MAJA. 98. A. ———
HYPSIPYLE. 177. C. D. Pap. Helicon.	MARCELLINA.163. A. B. C. Pap. Dan. Cand.
I.	MARCELLUS. 98. F. G. — Eq. Achiv. MARMORATA.151. F. Phal. Geomet.
1.0	MARTHESIA. 191. A. B. Pap. Nymph. Phalerat.
JAIRUS. 185. A. B. C. Pap. Nymph. Gemm.	MATERNA. 174. B. Phal. Noct.
JASON. 186. A. B. — Eq. Achiv.	MEDUSA. 150. G. Pap. Dan. Cand.
ICASIA. 181. E. Phal. Bomb.	MELANIPPUS. 127. A. B Festiv.
INAURATA. 140. E. F. Sphinx. Adscita.	MELITE. 153. C. D. —— Helicon.
INTERRUPTA.185. E. Noct.	MELPOMENE.191
JOTA. 164. C. ———	MENESTHEUS.142. A. B. — Eq. Achiv.
IPHIANASSE. 172. A. Phal. Attac.	MERIONE. 144. G. H. — Nymph. Phalerat.
IPHICLA. 188. E. F. Pap. Nymph. Phalerat.	MEROPE. 151. A. B. — Dan. Cand.
ISMARUS. 176. F. — Pleb. rural.	MESENTINA. 162. B. C. — Nymph. Gemm.
ITUS. 119. F. G. — Dan. Festiv.	METIS. 162. G. — Pleb: Urbicol.
JUGURTHA. 187. E. F. — Cand.	MICALIA. 108. C. D. — Nymph. Phalerat.
JUTURNA. 129. E. Phal. Noct.	MINEUS. 131. D. Phal. Bomb.
JUVENTA. 188. B. Pap. Nymph. Phalerat.	MISENES. 117. D. Pap. Pleb. rural. MNEME. 190. G. — Helicon.
Т	MNEME. 190. G. — Helicon. MODESTA. 115. G. Phal. Noct.
L.	MOLPHEA. 116. C. Pap. Dan. Cand.
LABDA. 181. D. Phal. Geomet.	MONUSTA. 141. F. Pap. Dan. Cand.
LABRUSCÆ. 184. A. Sphinx. Legit.	MONYCHA. 131. C. Phal. Attac.
Thumps megus	Aa 2 NOR-

Aa 2

MORPHEUS. MULCIBER. MYCERINA. MYRINA. MYGDON.	Pl. Fig. 149. D. 127. C. D. 172. B. 189. B. C. 156. G.	Gen. Sphinx. Legit. Pap. Dan. Festiv. Phal. Attac. Pap. Nymph. Phaler. Phal. Noct.	PHERECLUS. PHERIDAMAS. PHILEA. PHILOCLES. PHLIASUS.	173. E. F.	Gen. Pap. Pleb. rural. — Eq. Achiv. — Dan. Cand. — rural. — Pleb. rural.
MYGDONIA.	174. F. N.		PHOCUS. PHORCUS. PHORCUS.	162. F. 163. D. E. 156. D. 170. D.	- Urbicol rural Urbicol. Phal. Geomet.
NECHUS. NESSUS. NETRIX. NIREUS. NISUS. NOBILIS. NUMITOR.	178. B. 107. D. 151. E. 187. A. B. 150. A. B. 108. A. B.	Phal. Geomet. Pap. Eq. Achiv. Pleb. Urbicol. Eq. Achiv.	PHYLLUS. PHYNEUS. PICUS. PIRITHEA. PODALIRIUS. POLIDECTA. POLIDORUS. POLITIA.	144. E. F. 128. A. B.	Sphinx. Legit. Phal. Noct. Pap. Eq. Achiv. Nymph. Gemm. Trojan.
OCCIDUA. OCTAVIA. ODORA. ONYTES. OPHIONE. OPIS. ORCHAMUS. ORFITA. ORION. ORNATRIX. ORODES. ORSA. OSINIA. OSIRIS.	O. 173. A. B. 135. B. C. 169. A. B. 165. E. 114. E. F. 138. A. B. 155. E. F. 112. D. E. F. 155. A. B. 166. C. D. F. 129. F. 143. F. 115. F.	Phal. Attac. Pap. Nymph. Phaler. Phal. Attac. Noct. Pap. Nymph. Phaler. Pleb. Urbicol. Nymph. Gemm. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Phal. Noct. Pap. Dan. Festiv. Phal. Geomet.	POLITA. POLYCLETUS. POLYMNIA. POPPEA. PRETUS. PRETUS. PRITANIS. PRIVERNA. PROCAS. PROCUS. PROCUS. PROCUS. PROTOGENIA. PUERA. PYRENE. PYRETUS.	191. E. 110. D. 182. C. D. 175. E. F. 115. D. 166. E. 179. G. 149. G. 106. E. F.	Phal. Pyral. Geomet. Pap. Pleb. rural. Helicon. Dan. Cand. Pleb. rural. Sphinx. Adfeita. Phal. Noct. Pap. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phalerat. Phal. Noct. Pap. Dan. Cand. Pleb. rural. Phal. Noct.
	P,			R.	
PALATINUS. PALEMON. PAMMON. PANTHOUS. PANTHOUS. PAPHIA. PAPHIA. PAPHIA. PARIS.	159. B. C. 131. F. 141. B. 123. A. 124. A. 146. A. 147. A. B. 148. A. 103. A. B.	Pap. Dan. Festiv. — Pleb. Urbicol. — Eq. Trojan. Phal. Attac. — Attac. — Attac. Pap. Eq. Trojan.	REMUS. RETORTA. RHANIS. RIVULOSA. ROXELANA.	. S.	Pap. Eq. Trojano Phal. Noct. Geomet. Bomb. Pap. Nymph. Gemm.
PATROCLUS. PAULINA. PELOPS. PENELEA. PENTHEA. PENTHESILEA PERIANDER. PERIANDER. PERIPHETA. PHALARIS. PHAREUS. PHASIS. PHOETUSA.	109. A. B. 110. E. F. 170. F. 101. G. 143. E.	— Achiv. — Dan. Cand. — Pleb. rural. — Nymph. Gemm. — Dan. Feftiv. — Nymph. Phalerat. Phal. Geomet. Pap. Pleb. rural. Phal. Noct. — Bomb. Sphinx. Legit. Pap. Pleb. rural. Phal. Noct. Pap. Nymph. Phalerat.	SCOLOPAIEA. SCYTON. SIBILLA. SICHEAS. SICHEUS. SOMNICULOS. SPECIOSA. SPERCHIUS. STATIRA. STRIGILIS.	162. A. 122. D. E. 174. D. 99. B. 114. C. D. 150. E. 144. C. D.	Phal. Noct. —— Attac. Pap. Eq. Achiv. Phal. Noct. Sphinx. Adfeit. Pap. Nymph. Phalerat. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. Phal. Bomb. —— Attac. Sphinx. Adfeit. Pap. Dan. Cand. Sphinx. Legit. Phal. Noct. SUERO.

SUERO. SYMETHUS. SYPILUS. SYSIPHUS.	Pl. Fig. 97. F. 149. B. C. 99. A. 158. C.	Gen. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. Sphinx. Adfeit. Pap. Eq. Achiv.	TOLUMNIA. TORQUATUS. TRITE. TYMBER.	Pl. Fig. 130. F. G. 177. A. B. 141. C. D. 167. D.	Gen. Nymph. Gemm. Eq. Achiv. Dan. Cand. Phal. Bomb.
	T.			V.	
TAGES. TALUS. TARCHON. TEDEA. TEREA. THAROS. THEANUS. THELEBAS. THESEUS. THOAS.	97. D. 176. D. 139. G. 102. A. 138. E. F. 169. E. F. 139. F. 150. D. 180. B. 167. A. B.	Phal. Noct. Pap. Pleb. Urbicol. Phal. Noct. Pap. Pleb. rural. — Nymph. Gemm. — Phalerat. — Pleb. rural. Sphinx. Adfcit. Pap. Eq. Achiv.	UFEUS. ULISSES. ULRICA. VARANES. VENULIA. VERAGO. VESTA. VIRBIUS.	97. E. 121. A. B. 100. E. F. 160. D. E. 185. C. 162. D. E. 119. A. 143. G.	Phal. Noct. Pap. Eq. Achiv. — Dan. Festiv. Pap. Eq. Achiv. Phal. Noct. — Bomb. Pap. Helicon. — Pleb. Urbicol.
THYMETUS. TIRIDATES TIMEUS. TIRHACA.	184. G. 161. A. B. 186. E. F. 172. E.	— Pleb. rural. — Eq. Achiv. — Pleb. rural. Phal. Noct.	XANTHUS.	183. A. B.	Dan. Festiv.
TITAN. TITIA.	142. F. 121. C. D.	Sphinx. Legit. Pap. Dan. Festiv.	ZENOBIA.	115. A. B.	Phal. Attac.

EINDE.

DRUKFEILEN.

FAUTES D'IMPRESSION.

Pag. 24. reg. 2. onder aan, staat Fig. F. G., moet zyn Fig. G.	Pag. 24. ligne 2. en-dessous, se trouve Fig. F. G. lisez Fig. G.
25 8 staat Phal. Noctua, lees Phal. Pyralis.	35 8. Phal. Noctua., lifez Phal. Pyralis.
81 7. onder aan, flaat Hyroglyphica, lees	61 19. fe trouve Nymphes aveugles, lifez
Hieroglyphica.	Nymphes à yeux.
83 12. staat ongeoogde, lees geoogde Nimph.	71 10. en-dessous, Famelle, lisez Famille.
- 101 2. staat Eilanden Java en Amboina, lees	81 7. en-dessous Hyroglyphica, lifez Hie-
Kust van Guiné.	roglyphica.
Pl. CXLVIII. Letter C. C. moeten zyn C.D. en D.D.	101 I Les Isles de Java & d'Amboine, lisez
E. F.	des Côtes de Guinée.
	Planche CXLVIII. Lettre C. C. doivent être C. D. &
	DD. E. F.

BYVOEGSELEN.

- Pl. CVI. Fig. C.D. Is de Pap. Agamemnon. Zie Linn.
- Syst. Nat. pag. 748. n. 22.

 CIX. E. F. is de Phal. Tinea. Pulchella. Linn. Syft. Nat. p. 884. n. 349. Zy wordt ook in Honga-
- ryen en Rusland gevonden.
 CXV. E. Phal. Osiris is de Phal. Jatropharia. Linn. Syft. Nat. pag. 865. n. 229. Merian fur. inf. Tab. 38. Clerck. icon. Tab. 55. Fig. 5. 6.

 CXXXI. — C. Pbal. Monycha: van deze Nagt-
- Kapel hebben de Mannetjes gepluimde sprieten.
- CXXXIII. E. Insgelyks.

ADDITIONS.

- Pl. CVI. Fig. C. D. C'est le Pap. Eq. Agamemnon. Voyez Linn. Syst. Nat. pag. 748. n. 22. CIX. E. F. La Phal. Tinea Pulchella. Linn. Syst.
- Nat. pag. 884. n. 349. On la trouve pareillement en Hongrie en dans la Russie.
- CXV. E. Phal. Ofiris, est la Phal. Jatropharia. Linn. Syst. Nat. pag. 865. n. 229. Merian-surins. Tab. 38. Clerck, icon. Tab. 55. Fig. 5. 6.
 CXXXI. C. Phal. Monycha. Les Males de ces
- Phalênes ont des antennes plumacées.
- --- CXXXIII. --- E. pareillement-

ا، لاستن اکائال،

			•	
		du au No.		
•				
				_
		*		
		•		
	•			
34			~	
*				
	Ĭ.			
V		3		
3				
<i>(</i> -				
	,			
			~	
	*			
			,	
Ť				
	5 T			
N				
			* - 1	
			~	



		47-7
		14-3
All the second s	10	
		- 1
		, · · · ·
		100
		*1
*		
	*	
		W/W 15
	W .	
		1 1 1 1 1 1 1 1



